Duke University Medical Center Library
Historical Collection

DUKE
HOSPITAL

LIBRARY

DATE DUE

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/anatomiegnrale31bich_0

ANATOMIE

GÉNÉRALE.

PARIS. IMPRIMERIE DE COSSON,
RUE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS, N° 9.

ANATOMIE

GÉNÉRALE

APPLIQUÉE A LA PHYSIOLOGIE ET A LA MÉDECINE;

PAR XAVIER BICHAT.

NOUVELLE ÉDITION,

CONTENANT LES ADDITIONS PUBLIÉES PRÉCÉDEMMENT

PAR BÉCLARD,

ET AUGMENTÉE D'UN GRAND NOMBRE DE NOTES NOUVELLES

PAR F. BLANDIN,

CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUJON ET DE L'ASILE ROYAL DE LA PROVIDENCE, AGRÉGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, PROFESSEUR D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE, ETC.

AVEC PLANCHES EN TAILLE-DOUCE.

TOME TROISIÈME.

PARIS,

J. S. CHAUDÉ, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DE LA HARPE, N° 64.

A MONTPELLIER, CHEZ SÉVALLE.

A BRUXELLES, AU DÉPÔT DE LA LIBRAIRIE MÉDICALE FRANÇAISE.

1830.

ANATOMIE

GÉNÉRALE.

SYSTÈMES PARTICULIERS

A QUELQUES APPAREILS.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Les deux premiers volumes de cet ouvrage ont été consacrés à des recherches sur les systèmes communs à la structure de tous les appareils, sur les systèmes primitifs qui forment, pour ainsi dire, le parenchyme nutritif, la base de tous les organes, puisqu'il n'est presque aucun de ces organes où les artères, les veines, les exhalans, les absorbans, les nerfs et le tissu cellulaire n'entrent pour partie plus ou moins essentielle. Chacun est tissu d'abord de ces parties communes, puis d'autres parties propres qui le caractérisent spécialement.

Les systèmes qui seront examinés dans ce volume et dans le suivant ne sont point aussi généralement répandus dans l'économie animale; ils n'appartiennent qu'à quelques appareils particuliers : ainsi les systèmes ossseux, musculaire animal, cartilagineux, fibreux, sont ils spécialement destinés aux

26310

appareils de la locomotion; ainsi les systèmes séreux, muqueux, musculaire organique, etc., entrent-ils surtout dans les appareils digestif, respiratoire, circulatoire; ainsi le système glanduleux forme-t-il l'appareil des sécrétions; ainsi le système cutané entre-t-il principalement dans l'appareil sensitif externe, etc.

Tous les systèmes qu'il nous reste à examiner sont donc bien plus isolés, jouent un rôle bien moins étendu que ceux qui nous ont occupés jusqu'ici. Concentrés dans quelques appareils, ils sont étrangers aux autres, ils ont une vie indépendante de la leur; au lieu que partout les systèmes primitifs mêlent leur mode de vitalité à celui des autres organes dans la composition desquels ils entrent : la plupart ont un mode d'exister et des formes extérieures qui les distinguent de ces derniers. Les différentes parties qui composent chacun sont presque toujours isolées, ne tiennent point les unes aux autres : les os, les muscles de la vie animale et de la vie organique, les cartilages, les fibro-cartilages, les organes médullaires, les glandes, les membranes séreuses, les poils, etc., présentent cet isolement d'une manière remarquable. Chaque pièce appartenant à ces différens systèmes a toujours entre elle et les pièces du même système une foule d'organes intermédiaires qui sont de nature très-différente, et qui appartiennent par conséquent à d'autres systèmes. Il n'y a guère que les systèmes cutané, fibreux et muqueux, qui soient partout continus dans leurs diverses parties : encore ce dernier n'a-t-il point de communication entre sa portion qui se déploie sur

les appareils digestifs et respiratoires, et sa portion qui appartient aux organes urinaires et génitaux.

Nous avons vu, au contraire, les systèmes primitifs être partout continus, ne point avoir entre eux d'interruption. Le cellulaire, l'artériel, le veineux, l'absorbant, le nerveux, sont tellement disposés, que, s'il était possible d'enlever tous les organes qu'ils pénètrent, en les laissant seuls, on aurait un véritable tout diversement figuré suivant ces systèmes. Les exhalans peuvent être aussi véritablement considérés comme se tenant partout, ainsi que nous l'avons vu. Supposez au contraire que les organes intermédiaires aux os, aux cartilages, aux fibro-cartilages, etc., soient enlevés, toutes les pièces de ces systèmes tombent aussitôt, et vous n'avez point un tout continu.

L'ordre à suivre dans l'examen de ces systèmes est assez indifférent: nous les placerons les uns après les autres dans la série suivante, qui comprendra les systèmes 1° osseux, 2° médullaire, 3° cartilagineux, 4° fibreux, 5° fibro-cartilagineux, 6° musculaire animal, 7° musculaire organique, 8° muqueux, 9° séreux, 10° glanduleux, 11° cutané, 12° épidermoïde, 13° enfin le système des poils.

Remarquez que la nature ne s'astreint à aucun ordre méthodique, en distribuant ces systèmes dans les divers appareils, qu'elle n'a point égard aux grandes différences qu'elle a établies entre les fonctions. Chacun peut appartenir en même temps à des appareils de fonctions qui n'ont aucune analogie. Ainsi le fibro-cartilagineux, qui se trouve surtout dans les organes locomoteurs, dans la vie animale par

26810

conséquent, entre-t-il aussi dans l'appareil respiratoire, par la trachée-artère; ainsi le système muqueux, presque partout destiné aux organes de la vie interne, appartiènt-il à la vie externe dans la conjonctive, dans les fosses nasales, etc., à la génération dans les vésicules séminales, dans la prostate, etc.; ainsi le système glanduleux verse-t-il tour à tour des fluides sur les organes des deux vies, comme sur ceux de la génération; ainsi les surfaces séreuses se déploient-elles sur des parties que leurs fonctions ne rapprochent nullement, sur le cerveau et l'estomac, par exemple, sur les cartilages articulaires et sur les poumons, etc..... Concevons donc les systèmes simples par abstraction, si je puis parler ainsi; représentons-nous-les d'une manière isolée, comme des espèces de matériaux distincts les uns des autres, quoiqu'assemblés deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, etc., pour former les édifices partiels de nos appareils, édifices dont résulte l'édifice général de notre économie. Chacun de ces appareils est destiné à exercer une fonction déterminée, et doit se classer par conséquent comme les fonctions : c'est aussi de cette manière que nous les distribuerons dans l'*Anatomie descriptive*. Mais les systèmes simples ne tendant à un but commun qu'autant qu'ils sont réunis en appareils, on ne peut, en les considérant isolément, s'astreindre à aucune classification empruntée de leur destination.

SYSTÈME OSSEUX.

Ce système, remarquable entre tous les autres par la dureté et la résistance qui le caractérisent, reçoit de ce double attribut l'aptitude à servir à tous de base commune, sur laquelle ils reposent, et autour de laquelle ils se trouvent suspendus et fixés. L'ensemble des pièces qui le forment tiennent les unes aux autres, pour cet usage, au moyen de liens souples et résistans, qui composent de ces pièces un tout qu'on nomme le *squelette*. Ce tout osseux placé au milieu de la foule des organes qu'il soutient, partout continu dans ses diverses parties, n'a point cependant, comme les systèmes primitifs, continuité de vie propre d'une de ses extrémités à l'autre. Les liens qui assemblent ses pièces diverses, très-différens d'elles par leur nature et par leurs propriétés, y produisent un isolement de vitalité, que les différentes parties des systèmes ci-dessus ne présentent point, parce que dans leur continuité leur nature est partout la même.

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES DU SYSTÈME OSSEUX.

Considérés sous le rapport de leurs formes, les

os sont de trois sortes, longs, plats et courts. Une seule dimension domine dans les premiers, la longueur; deux s'observent en proportion à peu près égale dans les seconds, la longueur et la largeur; ces deux dernières dimensions, plus l'épaisseur, caractérisent les os courts. Examinons chacun d'une manière générale.

§ Ier. *Des Os longs.*

Les os longs appartiennent en général à l'appareil locomoteur, où ils forment des espèces de leviers qui meuvent les muscles en différentes directions. Tous sont placés dans les membres, où leur ensemble constitue une espèce de colonne centrale, et mobile en divers sens. On les y voit successivement diminuer en longueur et augmenter en nombre, en les examinant de la partie supérieure à l'inférieur du fémur ou de l'humérus, aux phalanges des orteils ou des doigts. Il résulte de cette double disposition opposée que le haut des membres est caractérisé par l'étendue des mouvemens, et le bas par la multiplicité, la variété et les bornes étroites de ces mouvemens.

Ces os ont tous une conformation analogue : épais et volumineux à leurs extrémités, ils sont plus minces et ordinairement arrondis dans leur milieu ou dans leur *corps*, comme le disent les anatomistes.

Le volume des extrémités osseuses présente le double avantage, 1° d'offrir aux articulations de larges surfaces et par conséquent plus de causes de

résistance aux divers déplacemens; 2° de concourir à la régularité des formes du membre auquel ils appartiennent. Remarquez, en effet, que les muscles et les os sont juxtaposés en sens inverse dans les membres. Le milieu des premiers, qui est leur partie la plus grosse, correspond au milieu des seconds, qui forme leur portion grêle; tandis que les extrémités de ceux-ci suppléent par leur volume à la ténuité des tendons qui terminent les autres, et qui se trouvent placés à côté d'elles. L'augmentation de volume des extrémités des os longs n'est point subite; elle commence insensiblement sur le corps. On observe sur ces extrémités diverses éminences, soit d'articulation, soit d'insertion.

Le milieu ou le corps ne présente aucune éminence : seulement on y voit des lignes saillantes, toujours destinées à des implantations aponévrotiques, et qui, lorsqu'elles sont très-marquées, ôtent à l'os sa forme cylindrique, qu'il conserve cependant à l'intérieur : ainsi le tibia est-il manifestement triangulaire au dehors, quoiqu'au dedans son canal ait la forme de celui du fémur. En général, ces lignes d'insertion, toujours séparées entre elles par des surfaces planes, sont au nombre de trois sur chaque os long, comme on le voit à l'humérus, au cubitus, au radius, au tibia, au péroné, etc. J'ignore la raison de cette loi de conformation. Une autre observation générale, c'est que le corps de presque tous les os longs est comme tordu sur lui-même; en sorte que la direction de sa partie supérieure n'est pas la même que celle de l'inférieure : en suivant de haut en bas une des lignes

dont je parlais tout-à-l'heure, on peut faire cette remarque, qui du reste est plus sensible chez l'adulte que chez le fœtus. Ce changement de direction n'a rien de général dans le sens qu'il affecte.

Les formes intérieures des os longs se distinguent très-bien en sciant ceux-ci longitudinalement. Le tissu celluleux les remplit aux extrémités; il est, comme nous le verrons, plus mince et moins abondant dans le milieu, qui offre le canal médullaire. Ce canal n'existe point dans le premier mois du fœtus et tant que l'os est cartilagineux : l'état osseux est l'époque de sa formation. Toute la gélatine du milieu de l'os est alors absorbée; l'exhalation n'y en apporte point de nouvelle, excepté dans le tissu celluleux très-rare que renferme ce canal; cette fonction, par là même qu'elle est nulle au centre, devient plus active à la circonférence de l'os. Ce surcroît d'activité des exhalans externes favorise la formation du tissu compacte, dont le développement se fait précisément en même temps que celui du canal dont il forme les parois. En sorte qu'à cette période de l'ossification, l'exhalation et l'absorption semblent être en sens inverse dans les deux parties de l'os : l'une est très-énergique à l'extérieur, pour apporter le phosphate calcaire dont s'encroûte le parenchyme déjà existant; l'autre est très-active à l'intérieur, pour enlever la gélatine, dont l'absence forme le vide d'où naît le canal médullaire.

Il n'y a de cavité médullaire bien caractérisée que dans l'humérus, le radius, le cubitus, le fémur, le tibia, le péroné et la clavicule, etc. Les côtes, les phalanges, qui par leur forme se rapprochent de

ceux-ci, ont dans leur milieu beaucoup de tissu celluleux ordinaire et presque jamais de ce tissu celluleux plus mince qui occupe le centre des os ci-dessus indiqués, et qui ne se trouve que dans la cavité médullaire.

Cette cavité ne s'étend point au-delà du corps de l'os : là où le tissu compacte commence à s'amincir, elle disparaît, remplacée par la grande quantité de tissu celluleux qui remplit l'extrémité de l'os. Sa forme est cylindrique, sa direction droite. Elle ne varie point dans sa forme suivant les aspérités ou les lignes saillantes extérieures du corps de l'os, qui prend seulement en ces endroits plus d'épaisseur. Ses parois sont plus lisses dans le milieu qu'aux extrémités, d'où se détachent déjà beaucoup de filets celluleux très-considérables. Elle est traversée, dans plusieurs sujets, par des cloisons osseuses, minces et horizontales, qui interrompent presque entièrement sa continuité en cet endroit, et semblent la diviser en deux ou trois parties très-distinctes.

Le canal médullaire sert non-seulement à loger l'organe médullaire, à le défendre, mais encore à donner plus de résistance à l'os : car on sait que, de deux cylindres égaux par la quantité de matière qui les forme, mais dont l'un sera creux, et par conséquent à plus grand diamètre que l'autre qui sera plein, le premier résistera plus que le second, parce qu'on le ploiera, et on le rompra par là même avec moins defacilité. Des cylindres pleins égaux en diamètre aux os longs eussent empêché, par leur pesanteur, les mouvemens des membres;

tandis que d'autres cylindres de même pesanteur, mais sans cavité, eussent offert trop peu de surface pour les insertions musculaires : réunir peu de pesanteur à une largeur suffisante dans le milieu des os longs, est donc un grand avantage du canal médullaire.

Ce canal disparaît dans les premiers temps de la formation du cal, au niveau des fractures, parce que tout l'organe médullaire se pénètre en cet endroit de gélatine et devient cartilagineux ; mais peu à peu cette gélatine, absorbée de nouveau, sans être remplacée, favorise le développement d'une cavité nouvelle, et la communication se rétablit entre les parties supérieure et inférieure du canal.

J'ai observé que, dans le premier âge, et tant que les extrémités de l'os sont cartilagineuses, le canal médullaire est moins long à proportion que dans l'adulte : il ne forme guère, à la naissance, que le tiers moyen de l'os, les deux tiers supérieur et inférieur étant formés d'abord par la portion cartilagineuse de chaque extrémité, puis par un tissu celluleux intermédiaire à cette portion et au canal. A mesure qu'on avance en âge, sa proportion de longueur devient plus marquée.

§ II. *Des Os plats.*

Les os plats ont, en général, peu de rapport à la locomotion, qu'ils ne favorisent guère que par les insertions des muscles, qui vont de là se rendre aux os longs. La nature les destine surtout à former les cavités, telles que celles du crâne, du bassin.

Leur conformation les rend très-propres à cet usage. Leur nombre varie suivant les cavités auxquelles ils concourent: toujours plusieurs se réunissent pour en composer une, et c'est même cette circonstance qui en assure en partie la solidité. En effet, l'effort des coups extérieurs se perdant dans leurs jointures, ils sont fracturés avec moins de facilité. Si le crâne n'était que d'une seule pièce, ses solutions de continuité seraient beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont d'après son organisation naturelle. A mesure que les sutures s'ossifient chez les vieillards, il devient plus fragile: dans les enfans, chez lesquels l'ossification n'est pas complète, où le nombre des pièces osseuses isolées est par conséquent plus considérable à la tête, au bassin, etc., la difficulté des fractures est extrême, parce que les liens mous qui unissent les parties solides cèdent, sans se rompre, aux corps extérieurs.

Les os plats sont presque tous contournés sur eux-mêmes, concaves et convexes en sens opposé: ce qui a rapport à leur destination de former des cavités. Leur courbure varie suivant l'endroit de la cavité où ils se trouvent: cette courbure est une cause de résistance très-puissante, lorsque celle indiquée ci-dessus n'a plus lieu. Ainsi, dans le premier âge, le crâne résiste en cédant; mais à mesure que les sutures deviennent plus serrées, qu'il tend à ne former qu'une pièce osseuse, c'est par le mécanisme des voûtes qu'il protége le cerveau.

Tous les os plats offrent deux surfaces et une circonférence. Suivant que les premières servent à des insertions musculaires, ou se trouvent seule-

ment recouvertes par des aponévroses, des membranes, etc., elles sont raboteuses ou lisses. Vers le milieu, l'os est plus mince; il a toujours plus d'épaisseur à la circonférence, qui est ou à articulation ou à insertion. Dans le premier cas, cet excès d'épaisseur assure la solidité des jointures, qui se font alors par de plus larges surfaces, comme on le voit au crâne; dans le second, il offre aux fibres plus de points d'origine, comme on l'observe à la crête de l'os iliaque et à la plus grande partie de sa circonférence.

Les formes intérieures des os plats présentent peu de particularités; leurs deux lames externes laissent entre elles un écartement que remplit le tissu celluleux.

§ III. *Des Os courts.*

Les os courts sont placés, en général, dans les parties où doivent se trouver réunies la mobilité et la solidité, comme dans la colonne vertébrale, le tarse, le métatarse. Toujours peu volumineux, ils se trouvent ramassés en assez grand nombre dans les régions qu'ils occupent: ce nombre supplée à leur petitesse dans la formation des portions du squelette auxquelles ils concourent. C'est aussi ce nombre qui assure à ces portions la réunion des deux attributs presque opposés dont nous parlions, savoir, la solidité, parce que les efforts extérieurs se perdent dans les liens nombreux qui les unissent; et la mobilité, parce que l'ensemble de leurs mouvemens isolés donne un mouvement général considérable.

Rien n'est constant ni uniforme dans la conformation extérieure de ces os ; elle se modifie suivant le plan général du tout dont ils sont les parties : ainsi les usages différens du carpe, du métacarpe, de la colonne vertébrale, déterminent des formes diverses dans leurs os respectifs. Ces os présentent toujours, sur leur surface externe, beaucoup de cavités et d'éminences nécessaires à leurs nombreuses articulations, à l'insertion des liens ligamenteux multipliés qui les unissent, et des muscles qui les font mouvoir.

A l'intérieur, ces os n'ont rien de particulier, que beaucoup de tissu celluleux, qui les forme presque en totalité et qui les expose à de fréquentes caries.

Il ne faut point croire du reste que la nature s'asservisse avec régularité à la division des os en longs, en plats et en courts. Ici, comme ailleurs, elle se joue de nos méthodes de description, et nous montre les os tantôt présentant et le caractère des os longs et celui des os courts, tantôt réunissant les attributs de ces derniers et des os plats. L'apophyse basilaire et la partie supérieure de l'occipital, le corps et les parties latérales du sphénoïde, mis en opposition, prouvent cette assertion. Quelquefois, par sa forme extérieure, un os appartient aux longs, et doit se classer parmi les plats d'après son organisation intérieure, comme les côtes en présentent un exemple, etc., etc.

§ IV. *Des Éminences osseuses.*

Les éminences osseuses portent en général le nom d'*apophyses;* elles sont *épiphyses* lorsque le cartilage d'ossification qui les réunit à l'os n'est point encore encroûté de substance calcaire.

On peut rapporter ces éminences à quatre grandes divisions, savoir, à celles 1° d'articulation, 2° d'insertion, 3° de réflexion, 4° d'impression.

1°. Les éminences d'articulation varient suivant que l'articulation est mobile ou immobile: je ne les considérerai point ici d'une manière générale, pour n'être point obligé de me répéter au chapitre des articulations.

2°. Les éminences d'insertion sont extrêmement multipliées dans les os; elles ne donnent jamais attache qu'à des organes fibreux, comme à des ligamens, à des tendons, à des aponévroses, à la dure-mère: tout organe différent de ceux-ci par sa structure ne s'implante aux éminences osseuses et aux os en général que par leur intermède: les muscles en sont un exemple remarquable.

Ces éminences sont, en général, beaucoup moins prononcées chez la femme que chez l'homme, chez l'enfant que chez l'adulte, chez les animaux faibles que chez les carnivores qui vivent en attaquant et en détruisant leur proie. Toujours la saillie des éminences d'insertion est un indice de la force, de la vigueur des mouvemens. Elles se développent d'autant plus que les muscles sont plus prononcés: examinez comparativement le squelette d'un homme

fort, sanguin, dont le système musculaire se dessinait avec énergie à travers les tégumens, et celui d'un homme faible, phlegmatique, dont les formes arrondies comme chez les femmes ne se prononçaient point au dehors : vous verrez la différence.

La forme de ces éminences d'insertion varie prodigieusement : tantôt les muscles s'insèrent par une foule de fibres aponévrotiques isolées; elles sont petites alors, très-multipliées, et ne forment presque que des aspérités imprimées sur une surface plus ou moins large : tantôt c'est par un seul tendon que le muscle tire son origine; alors assez ordinairement l'apophyse est très-saillante et occupe peu de place. Quelquefois une aponévrose large donne naissance aux fibres charnues : c'est alors une ligne osseuse plus ou moins saillante qui donne insertion.

En général, les éminences sont proportionnées aux muscles qui s'y fixent : par exemple, de trois muscles égaux à peu près en masse, et dont l'un s'attache par des fibres isolées, l'autre par un tendon, l'autre par une aponévrose, on remarque que la somme des aspérités qui servent à l'insertion du premier, l'apophyse isolée à laquelle s'attache le second, la ligne saillante à laquelle se fixe le troisième, sont à peu près égales par la quantité de substance osseuse qui les forme; en sorte qu'en supposant que l'apophyse fût disséminée en aspérités, ou étendue en ligne, ou bien que les aspérités fussent réunies en masse, ou que la ligne se concentrât sur elle-même pour former l'apophyse, cette quantité de substance osseuse se trouverait à peu près la même.

On conçoit tout l'avantage des éminences pour les insertions des muscles, qu'elles éloignent du centre de l'os, dont elles diminuent le parallélisme avec son axe, et qu'elles favorisent conséquemment dans leurs mouvemens d'une manière évidente.

Sont-elles produites par les tiraillemens des muscles? Cette opinion, empruntée des lois de la formation des corps mous et inorganiques, ne s'accorde nullement avec les phénomènes connus de la vitalité, avec l'existence des éminences à insertion non musculaire, et qui souvent font plus de saillie que celle-ci, avec la disproportion qui existe entre l'allongement de certaines apophyses à implantation musculaire, de la styloïde, par exemple, et la force des muscles qui s'y attachent, etc.

Les éminences à insertion ligamenteuse ont l'avantage, en éloignant un peu le ligament de l'articulation, de faciliter les mouvemens de celle-ci; ce qui est surtout remarquable pour les ligamens latéraux du coude, du genou, etc.

Quant aux autres éminences d'insertion, on ne peut guère considérer d'une manière générale leurs fonctions respectives.

3°. Les éminences de réflexion sont celles sous lesquelles passe un tendon, en se déviant de son trajet primitif : tel est le crochet de l'apophyse ptérygoïde, l'extrémité malléolaire du péroné, etc. Presque toutes ces éminences présentent, dans un sens, une échancrure ou excavation que complète en sens opposé un ligament; ce qui constitue un anneau pour le passage du tendon.

4°. Les éminences d'impression sont celles qui

naissent, dit-on, lorsque divers organes creusent sur les surfaces osseuses des enfoncemens que séparent les éminences, lesquelles ne sont autre chose que l'os qui, en cet endroit, reste à son niveau ordinaire. Les impressions cérébrales, musculaires, sont données comme des exemples de cette disposition; mais ces impressions sont-elles en effet un résultat de la compression des organes sur l'os, ou dépendent-elles des lois du développement osseux, lois qui donnent aux os des formes accommodées aux organes environnans? J'adopterais plus volontiers la seconde que la première de ces opinions, qu'on a crue très-probable, à cause de l'effet des anévrysmes sur les os qui leur sont contigus, et qu'ils usent et détruisent peu à peu. Mais remarquons que, si les muscles, le cerveau, les vaisseaux, par leurs mouvemens de pression, avoient sur les os, dans l'état naturel, un mode d'action analogue à celui de l'anévrysme, l'état des parties devrait être le même que dans ce cas : la lame compacte devrait être détruite au niveau des enfoncemens, et laisser à sa place une surface inégale, raboteuse : or, le contraire arrive, ce qui me fait penser que ce qu'on appelle communément *impression* d'organes n'est qu'un effet naturel de l'ossification. (1).

---

(1) Il n'y a rien, en effet, de comparable aux effets de l'anévrysme sur les os, dans les saillies que les organes déterminent sur certains points du squelette, en refoulant le tissu dont ses pièces se composent; mais, de ce que la comparaison a été mal choisie par les auteurs, il ne peut s'en suivre nécessairement que les organes, par leur pression, ne déterminent pas les saillies en

§ V. *Des Cavités osseuses.*

Les cavités osseuses sont très-nombreuses : celles qui se trouvent à l'extérieur des os vont seules nous occuper. On les divise, comme les éminences, en articulaires et en non-articulaires : les premières se ront examinées, comme les éminences analogues, au chapitre des articulations; parmi les secondes, il est des cavités, 1° d'insertion, 2° de réception, 3° de glissement, 4° d'impression, 5° de transmission, 6° de nutrition.

---

question ; des preuves contraires pourraient en être trouvées dans une foule de points : je me contenterai de citer les suivantes. Les os du crâne n'ont en dedans aucune éminence d'impression chez les anencéphales tout-à-fait privés de cerveau ; ces saillies manquent encore dans les premiers temps de la vie intra-utérine, lorsque le cerveau est représenté par une masse uniformément liquide ; et on les voit se former en même temps que l'encéphale prend de la consistance, et que sa surface devient ondulée ; enfin, chez l'adulte, où le cerveau a pris toute la dureté qu'il doit avoir, les éminences osseuses correspondantes sont à leur *summum* de développement.

Au reste, soutenir avec Bichat que les éminences d'impression se forment en vertu des lois naturelles de l'ossification, c'est avancer une vérité qui n'est point contraire à la théorie précédente. En effet, par le fait de la pression d'un organe sur un point d'un os, les vaisseaux correspondans sont affaissés sur eux-mêmes, et les matériaux nutritifs qu'ils devaient y apporter sont refoulés dans les vaisseaux du voisinage, d'où une hypertrophie de ces derniers points, et par suite une éminence que l'on peut appeler, avec Bichat, *d'impression.* (F. Blandin.)

1°. Les cavités d'insertion donnent attache aux aponévroses des muscles, aux ligamens, etc. Elles ont l'avantage, 1° de multiplier les implantations des fibres, sans augmenter la largeur de l'os, puisqu'une surface concave est évidemment bien plus étendue qu'une surface plane qui occuperait l'espace intercepté entre ses bords; 2° de laisser aux fibres musculaires plus d'espace, et par conséquent de leur donner plus de longueur que si elles naissaient d'une éminence, ce qui donne plus d'étendue aux mouvemens. Les cavités ptérygoïdes, digastriques, etc., offrent des exemples de cette disposition.

2°. Les cavités de réception sont celles qui servent à recevoir un organe, à le loger, à le garantir : telles sont les fosses des os du crâne, celles des os iliaques, etc. Tantôt ces cavités appartiennent à la totalité de l'os, dont la forme est concave, comme on le voit au coronal; tantôt elles se trouvent creusées sur une partie isolée, comme la dépression maxillaire de la mâchoire inférieure; toujours elles sont destinées à une partie essentielle, à une glande, à un viscère, etc.

3°. Les cavités de glissement se trouvent en général à l'extrémité des os longs. Ce sont des rainures plus ou moins profondes où glissent les tendons pour se rendre à l'endroit où ils s'insèrent. Toutes sont revêtues d'un cartilage, et complétées par un anneau ligamenteux très-fort. Les tendons, par leur frottement, creusent-ils ces cavités? C'est l'opinion commune; mais elle ne me paraît pas plus vraisemblable que la théorie des impressions musculaires, vasculaires, etc. Ces cavités devraient alors être d'au-

tant plus profondes que les muscles se sont plus exercés; elles ne devraient pas exister dans les sujets paralytiques depuis leur enfance; elle ne devraient pas exister sur les cartilages d'ossification du fœtus, dont les membres ne se meuvent presque pas : or, le contraire s'observe constamment. Envisageons donc toutes les configurations diverses des os comme une conséquence des lois de l'ossification, lois d'après lesquelles les formes osseuses, toutes primitivement arrêtées, ne font que se développer. Le volume des extrémités des os longs favorise l'existence de ces diverses cavités, qui ne sauraient, à cause de cela, nuire à la solidité osseuse.

4°. Les cavités d'impression correspondent aux éminences du même nom. J'en ai parlé plus haut.

5°. Les cavités de transmission sont spécialement destinées aux vaisseaux et aux nerfs. On en trouve beaucoup à la tête; elles affectent tantôt la forme de trous, tantôt celle de conduits, d'autres fois celle de fentes, suivant l'épaisseur ou la largeur des os que ces vaisseaux ou ces nerfs traversent pour aller d'un endroit à un autre. Le périoste les tapisse; plus ou moins de tissu cellulaire les remplit. Les nerfs et vaisseaux qu'elles transmettent sont étrangers aux os.

6°. Les cavités de nutrition, au contraire, laissent passer les vaisseaux qui apportent aux os ou à l'organe médullaire les substances qui les réparent. Elles sont de trois sortes.

Les unes forment des conduits qu'on observe exclusivement sur les os longs à cavité médullaire. Chaque os n'en a qu'un, situé toujours sur son

corps, obliquement dirigé entre les fibres du tissu compacte, pénétrant tantôt de bas en haut, tantôt de haut en bas dans la cavité de l'os, et établissant ainsi une communication entre le dehors et le dedans pour le vaisseau de l'organe médullaire. Ce trou sert en effet spécialement à l'exhalation et à la nutrition de cet organe, et n'est nourricier de l'os que secondairement (1).

La seconde espèce de cavités de nutrition appartient spécialement au tissu celluleux des os : aussi les voit-on partout où abonde ce tissu, aux extrémités des os longs, à la circonférence des os plats, sur toute la superficie des os courts. Leur diamètre est plus considérable que celui du conduit qui pénètre dans la cavité médullaire; il est moindre que celui des conduits du tissu compacte. Leur nombre est très-grand; j'en ai compté jusqu'à cent quarante sur l'extrémité tibiale du fémur, vingt sur le corps d'une vertèbre dorsale, cinquante sur le calcanéum, etc. En général, ce nombre est toujours proportionné à la quantité du tissu celluleux que renferme l'os : voilà pourquoi on en observe peu sur les os plats du crâne, pourquoi ils sont plus multi-

---

(1) Les conduits nutriciers des grands os longs ont une direction constante et fort remarquable, direction telle que, dans l'état de flexion des membres sur le tronc, comme cela arrive pendant le séjour du fœtus dans l'utérus, l'axe du canal tend vers le centre circulatoire. Le conduit nutricier de l'humérus marche de haut en bas, celui du fémur en sens inverse; le conduit correspondant du radius et du cubitus procède de bas en haut, et ceux du tibia et du péroné de haut en bas. (F. Blandin.)

pliés sur les os plats du bassin, surtout là où ce tissu devient abondant, comme à l'ischion, à la portion iliaque de la circonférence de l'os iliaque, etc. En versant du mercure dans le tissu spongieux, il sort en ruisselant de tous ces trous, et prouve ainsi leurs communications. Ils sont irrégulièrement dispersés partout où ils existent. On n'en rencontre point sur le corps des os longs, parce que ce corps ne contient pas ou presque pas de tissu celluleux.

La troisième espèce de conduits de nutrition est uniquement destinée au tissu compacte. C'est une infinité de petits pores que l'œil distingue manifestement, et par où s'introduisent de petits vaisseaux, qui s'arrêtent dans ce tissu. Une preuve manifeste qu'ils ne vont point jusqu'au tissu celluleux, c'est que, dans l'expérience précédente, le mercure ne trouve jamais en eux une voie pour s'échapper au dehors. Leur nombre est impossible à déterminer; il est prodigieux chez l'enfant. A mesure que, dans le vieillard, les os se chargent de substance calcaire, ils s'oblitèrent, et les vaisseaux qu'ils renfermaient deviennent de petits ligamens étrangers à la nutrition osseuse, qui va toujours en s'affaiblissant, et qui finirait par s'anéantir et permettre à la nécrose de s'emparer des os, si la mort générale ne prévenait cette mort partielle du système osseux (1).

---

(1) Jusqu'ici il n'a été question que de la surface extérieure des os. A l'intérieur, ces organes sont creusés de cavités, les

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME OSSEUX.

Le tissu propre au système osseux y forme la partie principale et prédominante, surtout à mesure qu'on avance en âge. Les organes communs y sont en bien moindre proportion.

§ Ier. *Tissu propre au Système osseux.*

Le tissu des os, comme celui de la plupart des autres organes, se présente sous l'aspect de fibres dont la nature est partout la même, mais qui, diversement arrangées, forment deux modifications principales : dans l'une, ces fibres, plus ou moins écartées, présentent une foule de cellules, dans l'autre, serrées les unes contre les autres ; elles composent une substance compacte, où il est diffi-

---

unes destinées à contenir la moelle (ce sont les plus remarquables), les autres servant de réceptacle à des vaisseaux veineux. Les premières, Bichat les décrit seulement à l'occasion du système médullaire ; les secondes, ignorées de Bichat, et découvertes depuis par MM. Fleury et Chaussier, trouveront leur place à l'occasion des vaisseaux osseux auxquels elles sont destinées. Les oiseaux seuls ont dans les os des cavités aériennes communiquant médiatement avec les poumons ; circonstance qui concourt à la fois à leur donner une légèreté spécifique très-grande, et à augmenter chez eux le champ de la respiration et de l'hématose. (F. Blandin.)

cile de les distinguer. De là deux subdivisions du tissu osseux, le celluleux et le compacte. Les auteurs en admettent une troisième, le réticulaire; mais il rentre dans le premier.

Tissu celluleux.

Le tissu celluleux n'existe point dans les premières périodes de l'ossification. L'époque de sa formation est celle où le phosphate calcaire s'ajoute à la gélatine du cartilage primitif, et donne à l'organe la nature osseuse. Alors, la masse solide du cartilage se creuse d'une infinité de cellules, parce que, reprise par les absorbans, la gélatine disparaît à l'endroit qu'elles occupent. Une nouvelle n'y est plus apportée par les exhalans, qui continuent à en déposer, et qui commencent à charrier du phosphate calcaire dans les traverses fibreuses dont l'entrecroisement constitue ces cellules; en sorte que le développement du tissu celluleux tient visiblement à la disproportion qui survient dans les os à une certaine époque de leur accroissement, entre les fonctions jusque là en équilibre des systèmes exhalant et absorbant. On ignore la cause de cette disproportion : elle paraît être une loi de l'ossification. C'est en vertu de cette loi, et par un mécanisme analogue, que l'ethmoïde, d'abord solide et plein tant qu'il était cartilage, se creuse à l'époque de son ossification, d'un grand nombre de cellules. C'est ainsi que les sinus sphénoïdaux, frontaux, etc., se forment et s'agrandissent.

La formation du tissu celluleux est terminée lors-

que toutes les épiphyses ont disparu. A cette époque il nous présente une infinité de fibres qui paraissent naître de la surface interne du tissu compacte, se portent dans tous les sens, se croisent, s'unissent, se séparent, se bifurquent, en un mot, affectent des directions si irrégulières, qu'il est impossible d'en suivre le trajet. Leur volume n'est pas moins variable : telle est quelquefois leur ténuité, qu'à peine peut-on les toucher sans les rompre ; leur grosseur est d'autres fois assez marquée. Souvent, au lieu de fibres, ce sont des lames plus ou moins larges, d'où naissent d'autres lames plus petites, qui semblent se ramifier, et d'où résultent, lorsqu'elles sont rapprochées, des espèces de conduits que l'on voit très-bien en sciant transversalement l'extrémité d'un os long, de manière à avoir un segment d'un demi-pouce.

Les cellules qui résultent de leur écartement ont une forme et des capacités très-inégales.

Toutes communiquent ensemble : les expériences suivantes en sont la preuve. 1°. Si on fait un trou à l'extrémité d'un os long, sur la surface d'un os court et plat, et qu'on y verse du mercure, il traverse toutes les communications, pour aller sortir par les différens trous naturels de la surface de l'os, qui s'ouvrent eux-mêmes dans les cellules. 2°. Sciez un os à l'une de ses extrémités, appliquez sur toute sa surface un enduit qui en bouche les pores, exposez-le ensuite au soleil : le suc médullaire, ne pouvant s'échapper par les pores extérieurs, viendra, en passant successivement par toutes les cellules, sortir par l'endroit scié. 3°. En vernissant un

os sec, et en l'ouvrant seulement en deux points opposés, on fait passer par ces communications, de l'une à l'autre ouverture, l'air, l'eau et toute espèce de fluide.

On peut donc concevoir l'intérieur de tout os comme formant une cavité générale que remplit une foule de fibres entrecroisées. Je n'ai point remarqué de différence sensible pour la direction de ces fibres dans les trois espèces d'os (1).

Tissu compacte.

Il n'en est pas des fibres qui forment le tissu compacte comme de celles du précédent. Ces fibres juxtaposées ne laissant entre elles aucun intervalle, donnant par leur rapprochement une densité remarquable au tissu qu'elles composent, se trouvent dirigées longitudinalement dans les os longs, en forme de rayons dans les plats, et sont entrecroisées en tous sens dans les courts. Cette triple disposition des fibres du tissu compacte paraît absolument tenir au mode d'ossification. En effet, lorsqu'on examine ses progrès sur les cartilages primitifs, on voit ces organes s'encroûter de phosphate calcaire, suivant la même direction que dans la

(1) La substance aréolaire des os présente trois variétés principales : 1° celle qui remplit les os courts et les extrémités des os longs ; 2° celle que l'on trouve dans le canal médullaire des os longs, et que l'on appelle *réticulaire ;* 3° enfin celle qui constitue le *diploë* de certains os plats, de ceux du crâne en particulier. (F. Blandin.)

suite doivent affecter les fibres : aussi ces fibres sont-elles très-apparentes dans le premier âge, sur les os du crâne en particulier. A mesure que le phosphate calcaire successivement entassé dans le parenchyme cartilagineux vient à y prédominer, tout semble se confondre dans le tissu compacte en une masse homogène. Mais alors encore, il est différentes circonstances qui nous indiquent la direction primitive des fibres : 1° lorsque, par un acide, on enlève aux os leur portion calcaire, alors la portion cartilagineuse garde, comme une espèce de moule, la forme qu'affectaient les substances qui la remplissaient, et offrent des espèces de fibres dont la direction est la même que celle indiquée dans les trois espèces d'os. Aussi, si on vient alors à déchirer les lames cartilagineuses, c'est dans cette direction qu'il est le plus facile de les enlever, 2°. Les fentes qui surviennent aux os long-temps exposés à l'air, suivent, en général, le sens naturel des fibres. 3°. Les os calcinés offrent à peu près le même phénomène.

La direction des fibres du tissu compacte change absolument dans les apophyses, où elle ne suit point celle de l'os principal. Dans celles qui par leur forme participent au caractère des os longs, comme dans la styloïde, ces fibres sont longitudinales; elles se dirigent suivant tous les sens dans celles qui, comme la mastoïde, les diverses espèces de condyles, etc., se rapprochent de la conformation des os courts.

L'assemblage des fibres forme, suivant les anatomistes, des lames qu'ils ont considérées comme

juxtaposées, et qui tiennent entre elles par des chevilles suivant les uns, par l'entrecroisement des fibres suivant les autres. Ces lames osseuses ne me paraissent point exister dans la nature. Toutes les fibres du tissu compacte se tiennent, se croisent, et forment un tout qu'on ne peut point concevoir de cette manière, laquelle d'ailleurs ne s'accorde point avec l'irrégularité de la distribution des vaisseaux. L'art sépare ici les fibres couche par couche, comme il le fait dans un muscle, dans un ligament, etc.; mais ces couches sont purement factices : présenter les os comme étant leur réunion, c'est donner une idée inexacte de leur structure. Il est plus inexact encore de considérer ces couches comme adhérentes les unes aux autres par des chevilles osseuses, par l'attraction, par une matière glutineuse. Toutes ces idées, contraires à l'inspection anatomique, suggérées par une fausse application des lois de l'adhérence des corps inorganiques à l'adhérence de fibres organisées, n'appartiennent plus qu'à l'histoire des erreurs physiologiques. Il est une circonstance qui prouve, dit-on, très-manifestement la structure laminée des os; c'est leur exfoliation. Il est vrai que souvent des lames très-distinctes se séparent de l'os vivant; mais ces lames ne sont autre chose que le produit de l'exfoliation elle-même. Alors, en effet, l'os meurt à sa surface; les vaisseaux superficiels ne reçoivent plus de sang; ce fluide s'arrête sous la portion privée de vie; l'exhalation du phosphate calcaire y trouve ses limites; toute espèce de vaisseau sanguin, exhalant, absorbant, se dé-

truit; une inflammation lente, avec suppuration, survient, et établit la ligne de démarcation; et, comme cette ligne est souvent au même niveau, tout ce qui est au-dessus d'elle devient une lame inorganique, qui tombe peu à peu et qui conserve sa solidité osseuse, parce que les absorbans mortifiés n'ont pu lui enlever le phosphate calcaire. D'ailleurs, rien de plus commun que de voir l'exfoliation ne point se faire par lame, et l'os présenter à sa suite une surface inégale, effet de l'inégalité d'épaisseur des portions exfoliées. Enfin l'exfoliation se fait souvent en sens opposé à celui que les lames sont sensées affecter : c'est ce qu'on voit dans la séparation de l'extrémité des os longs restée à l'air ou trop irritée après l'amputation, dans la chute des cornes, etc. Considérons le tissu compacte comme un assemblage de fibres rapprochées, mais nullement séparées par couches, qu'on ne peut concevoir que comme des abstractions (1).

---

(1) On a beaucoup écrit sur la structure intime des os, sur celle du tissu compacte en particulier. Malpigni admettait des lames et des fibres dans ce tissu. Gagliardi a décrit minutieusement les chevilles osseuses dont il a été parlé plus haut : il semble y avoir quelque chose de vrai dans son opinion, en ce qu'on distingue en effet dans les os des fibres qui se dirigent obliquement à travers leur épaisseur. Albinus, suivi en cela par la plupart des anatomistes modernes, a dit qu'il n'y avait que des fibres dans le tissu osseux, parallèles pour les os longs, rayonnées pour les arges. Enfin, si l'on en croit Scarpa, tout ne serait qu'aréoles dans la substance compacte des os comme dans la spongieuse. Michel Medici a déjà combattu cette idée, et pense avec les an-

Les fibres du tissu compacte diffèrent, dans leur arrangement organique, des fibres musculeuses, en ce que de fréquens prolongemens les unissent les unes aux autres, au lieu que celles-ci n'ont presque

---

ciens que c'est sous la forme de lames qu'est disposé le tissu osseux.

En se bornant à l'examen des faits allégués pour ou contre ces différentes opinions, on voit, 1° que l'existence des fibres n'est nullement démontrée par l'apparence linéaire qu'affectent les molécules osseuses lors de leur développement : en effet, cette disposition ne dure pas long-temps ; dans les os larges, par exemple, ces prétendues fibres, qui répondent alors au milieu de l'épaisseur de l'os, se changent plus tard en un tissu aréolaire. Cependant il y a des fibres dans les os, comme on le voit après les avoir dépouillés de leur matière calcaire. 2°. On s'assure de même qu'il y a des lames, en prenant un os long ramolli par un acide et en le faisant macérer dans l'eau : son tissu compacte se sépare au bout d'un certain temps en feuillets superposés, réunis par des fibres qui passent obliquement des uns aux autres. 3°. Souvent, dans cette expérience, les lames finissent par se résoudre en filamens, et en même temps tout l'os devient comme spongieux. De ce dernier fait, et de ce que, dans plusieurs maladies des os, la substance compacte devient spongieuse; de ce qu'elle prend manifestement cette apparence lorsque, comme le fit Troja, on détermine le gonflement d'un os long en introduisant un corps étranger dans sa cavité médullaire, Scarpa conclut à la structure aréolaire dont nous avons parlé. Cette conclusion n'est pas rigoureuse, puisque, outre les aréoles, la macération montre dans les os des lames et des fibres distinctes. Il est vrai que, si cette macération est trop long-temps prolongée, elle convertit s fibres elles-mêmes en une substance, pour ainsi dire, spongieuse, en une espèce de mucus.

Il semblerait donc que c'est pour n'avoir eu égard qu'à un

que l'organe cellulaire, les vaisseaux et nerfs, pour moyen d'union. Telle est l'intime juxta-position de ces fibres, qu'elles ne laissent entre elles que des pores souvent à peine sensibles à la vue simple, mais qui le deviennent cependant à la loupe, et que le suc médullaire et des vaisseaux remplissent (1). Dans le rachitisme, cette densité de tissu disparaît, et on remarque dans la partie moyenne des os longs, et sous la couche plus épaisse qu'à l'ordinaire du périoste, un tissu osseux, comme aréolaire, facile à se ployer en tous sens, formant une infinité de cellules, et remplaçant le tissu compacte qui devrait exister. Il paraît que ce changement de tissu compacte en celluleux se fait moins par l'absorption d'une partie du phosphate calcaire, que par l'exten-

---

petit nombre de faits à la fois que chaque auteur a exposé à sa manière l'arrangement des molécules osseuses, et qu'on doit admettre dans les os des lames, des fibres et des aréoles, celles-ci plus marquées dans le tissu spongieux, celles-là plus développées dans la substance compacte. (Béclard.)

(1) La substance compacte des os, comme le prouve les faits signalés par Bichat, est essentiellement semblable à la substance cellulcuse; elle ne constitue qu'une variété de forme, ou mieux de disposition des fibres osseuses, fibres toujours identiques. Cette substance, au reste, présente deux variétés, suivant sa densité plus au moins grande : 1° celle qui constitue l'extérieur de tous les os, et le centre des os longs; 2° celle qui forme les parois du labyrinthe. Plusieurs anatomistes considèrent encore l'ivoire des dents comme constituant une variété de substance compacte; mais, ainsi que je le ferai remarquer plus tard, les dents diffèrent des os sous une foule de rapports : ce sont bien des *ostéides*, mais non des os proprement dits. (F. Blandin.)

sion des fibres osseuses, qui s'écartent les unes des autres et laissent entre elles des espaces qui n'existaient pas ; ce qui donne aux corps des os longs rachitiques une épaisseur très-considérable. J'ai fait plusieurs fois cette observation (1).

Dispositions des deux Tissus osseux dans les trois espèces d'os.

Les tissus osseux, considérés dans les diverses espèces d'os, se comportent différemment. En général, le compacte forme l'extérieur, l'enveloppe de l'os, et le celluleux en occupe l'intérieur. Les cornets du nez offrent seuls une exception à cette règle, dont nous allons examiner les modifications.

1°. Dans les os longs, le tissu compacte a une épaisseur très-remarquable au centre, où il remplit le triple usage, d'abord de protéger efficacement l'organe médullaire dont il est l'enveloppe, ensuite d'assurer la solidité de l'os en cet endroit où se rapportent, plus qu'aux extrémités, les grands efforts de la locomotion, des chutes, des contrecoups, etc., et où l'os, traversé seulement par quelques fibres celluleuses très-foibles, ne peut emprunter sa ré-

---

(1) Ces pores sont en beaucoup d'endroits de véritables conduits qui renferment en effet de la moelle et des vaisseaux sanguins. Havers, Monro, et, dans ces derniers temps, Houship, les ont décrits, Ils ont $\frac{1}{400}$ de pouce de diamètre. La plupart sont parallèles et réunis entre eux par d'autres dont la direction est transversale ou oblique par rapport aux premiers. (Béclard.).

sistance que de ses parois externes, enfin de diminuer ainsi sans danger le volume de l'os à la partie moyenne du membre, dont la forme devient par là, comme nous l'avons vu, beaucoup plus régulière. A mesure qu'on s'éloigne du centre, on voit, sur un os long scié longitudinalement, le tissu compacte diminuer d'épaisseur, et ne former enfin aux extrémités qu'une couche mince analogue à celle qui revêt les os courts. Aussi la force de résistance des os longs à leur extrémité est-elle moins dans leur écorce compacte que dans la grande quantité de tissu celluleux entassé sous cette écorce : c'est elle surtout qui empêche les fractures. D'où l'on voit comment, la proportion des tissus compacte et celluleux étant inverse dans les deux parties de l'os, le mode de leur résistance est également inverse.

Le tissu celluleux, dans les os longs, diffère un peu examiné dans le canal médullaire ou aux extrémités. Dans le canal, ce sont des filamens extrêmement minces, continus et aux fibres plus grosses qui remplissent en haut et en bas les extrémités de l'os et à la portion compacte qui forme le cylindre osseux. Rares et semés comme au hasard dans le milieu du canal, ces filets se rapprochent entre eux, et forment une espèce de réseau à mesure qu'ils s'éloignent de ce milieu : de là le nom de *substance réticulaire* par lequel on l'a désigné. Mais ce n'est point un tissu distinct; c'est seulement une modification du celluleux : modification qui est caractérisée spécialement, 1° par la ténuité des fibres, 2° par l'absence constante de ces lames minces et courtes qui appartiennent fréquemment à ce tissu considéré

dans les autres parties. Au reste, l'usage manifeste de cette portion de tissu celluleux, trop faible pour concourir à la résistance de l'os, est évidemment de servir d'appui au système médullaire, et d'insertion à sa membrane. Aux extrémités des os longs, les fibres du tissu celluleux grossissent peu à peu, se rapprochent entre elles, sont parsemées de lames, et donnent à l'os, par leur ensemble et par leur nombre, une épaisseur et une résistance remarquables, sans cependant en augmenter le poids, ce qui favorise singulièrement la locomotion, vu que ce poids, placé à l'extrémité du levier, eût été très-pénible à soulever.

2°. Dans les os plats, le tissu compacte forme deux lames extérieures, dont l'épaisseur est moyenne entre celle du milieu des os longs et celle de l'extrémité de ces mêmes os, ou celle des os courts. Entre ces deux lames se trouve le tissu celluleux, semblable en général à celui de l'extrémité des os longs, un peu plus laminé cependant, plus épais ordinairement à la circonférence, souvent presque nul dans le milieu de l'os, où les deux lames compactes juxtaposées laissent alors voir une lumière qu'on place par-derrière. En général, partout où les os larges sont ainsi minces, par le défaut de tissu celluleux, des muscles très-forts se rencontrent, et suppléent par leurs couches épaisses à la solidité de l'os. On en voit des exemples dans les fosses iliaque, sous-scapulaire, occipitale inférieure, etc.

3°. Dans les os courts, le tissu celluleux prédomine toujours; l'os en est presque tout formé, une légère couche de tissu compacte forme seulement

son enveloppe, et, sous ce rapport, l'organisation de ces os est la même que celle des os longs à leurs extrémités : aussi la résistance de l'os dépend-elle de la totalité de sa masse, et aucun point ne fait-il un plus grand effort pour s'opposer aux fractures. On voit, d'après tout ce qui a été dit jusqu'ici, le mode successif de solidité des divers os. Dans le milieu des os longs, ce n'est presque qu'au tissu compacte; dans les os plats, c'est autant à ce tissu qu'au celluleux; dans les extrémités des os longs et dans les os courts, ce n'est presque qu'à ce dernier qu'est dué cette solidité.

4°. Dans les éminences osseuses, le tissu compacte est, en général, plus abondant qu'ailleurs, surtout dans celles d'insertion, comme dans les lignes saillantes des os longs, qui en sont toutes formées, dans les aspérités des surfaces osseuses, dans leurs angles. Si l'éminence est un peu considérable, il y entre aussi plus ou moins de tissu celluleux, comme on le voit dans les apophyses épineuses et transverses des vertèbres, coracoïde, mastoïde, etc. Les éminences des articulations mobiles sont, en général, moins pourvues de tissu compacte, le cartilage articulaire y suppléant pour la solidité de l'os. Celles des articulations immobiles, au contraire, moins grosses en général, comme, par exemple, les dentelures des os du crâne, etc., sont à proportion plus compactes que celluleuses.

5°. Dans les cavités osseuses, toutes celles qui servent aux articulations mobiles ne sont pourvues que d'une lame compacte très-légère. Elle est plus épaisse lorsque l'immobilité est le caractère des ar-

ticulations. En général, tous les trous, cavités et conduits qui transmettent des vaisseaux, des nerfs ou d'autres organes d'une région à l'autre sont partout tapissés d'une couche compacte qui les garantit de l'impression de ces parties. Les trous de la base du crâne, les conduits dentaires, vidiens, etc., sont un exemple de cette disposition.

De la Composition du Tissu osseux.

Quelles que soient les modifications sous lesquelles il se présente, le tissu osseux a partout la même nature ; les mêmes élémens le forment : or, ces élémens sont spécialement une substance saline calcaire, et une substance gélatineuse.

L'existence de la substance saline dans les os est prouvée de différentes manières. 1°. La combustion, en détruisant la portion gélatineuse, laisse un corps friable, cassant, de forme analogue à celle de l'os, et qui n'est autre chose que cette substance saline, laquelle ressemble, pour ainsi dire, à un corps moulé qui garde la forme du moule après que celui-ci a été enlevé. Si la combustion est poussée très-loin, et qu'on fasse rougir les os calcinés, ils éprouvent une demi-fusion qui les rapproche de l'état de porcelaine; ils ont alors un grain serré, fin, demi-vitreux, une demi-transparence, et cet aspect qui appartient aux terres vitrifiées. 2°. L'exposition des os à l'air, très-long-temps continuée, produit un effet à peu près analogue à celui du premier degré de combustion, quoique cependant la gélatine se trouve rarement alors exactement enlevée, et la

portion saline si parfaitement à nu que par l'action du feu. Au reste, il faut un temps très-long pour produire cet effet, surtout sur les os épais ; les os minces sont plus facilement altérés : j'ai souvent fait cette observation. Après dix ans d'exposition à l'air et à la pluie, j'ai observé que des clavicules prises au cimetière de Clamart présentaient, par l'action des acides, un parenchyme cartilagineux presque égal à celui d'un os séché depuis quelque temps. Mais enfin ce parenchyme disparaît, et l'os finit par tomber en poussière lorsqu'il n'est plus soutenu par lui, et que les molécules de la substance calcaire restante ont été désunies par le temps. 3°. Dans toutes les maladies cancéreuses portées au dernier période, les os prennent une friabilité qu'ils ne doivent qu'à la proportion plus grande de cette dernière substance, proportion née elle-même du peu de gélatine qui s'exhale alors dans les os. 4°. Lorsqu'un os a été exposé pendant quelque temps à l'action d'un acide, de l'acide nitrique, par exemple, une portion de sa substance lui est enlevée par cet acide, et cette portion est manifestement un sel calcaire, comme on le voit en mêlant à la dissolution un alcali, qui, s'unissant aussitôt à l'acide, met à découvert ce sel, en le faisant précipiter. 5°. La machine de Papin, en dissolvant par l'action de l'eau réduite en vapeurs la portion gélatineuse, met également en évidence cette partie saline calcaire.

Schéele a trouvé que cette portion est un sel neutre à base terreuse de phosphate de chaux. Souvent le phosphore, immédiatement à nu sur les os

frais, leur donne une apparence lumineuse qui se fait distinguer de très-loin pendant la nuit. C'est tantôt la totalité de l'os, tantôt quelques points seulement qui deviennent lumineux. Toujours j'ai remarqué dans les endroits éclairés une exsudation huileuse, soit qu'elle provînt du suc médullaire, soit qu'elle fût formée par la graisse des parties molles voisines de l'os.

Différens faits aussi évidens que les précédens constatent d'une manière non moins irrévocable l'existence dans les os d'une substance gélatineuse. 1°. Lorsque, dans la dissolution des os par les acides, le phosphate de chaux les a abandonnés, il reste un corps cartilagineux, flexible, élastique, jaunâtre lorsqu'on a employé l'acide nitrique, de même forme que l'os : or, on sait que la gélatine nourrit spécialement les cartilages. 2°. Si en soumet d'ailleurs ce résidu cartilagineux à l'ébullition, on en extrait une très-grande quantité de gélatine, qui se dissout dans l'eau, et que le tan précipite ensuite. Cette substance peut être même enlevée aux os sans l'extraction préliminaire du phosphate calcaire : c'est ainsi qu'avec des os dépouillés de tout organe environnant et réduits en fragmens très-petits, et même en poudre par l'action de la râpe, on parvient à faire des bouillons très-nourrissans, des gelées fortifiantes. Ce n'est pas sans raison que, dans la préparation du bouilli, on laisse l'os attaché à la viande : outre les organes blancs qui l'entourent, et l'huile médullaire qu'il contient, il fournit au bouillon une substance qui lui est propre. 3°. La combustion des os, et surtout

de leur résidu cartilagineux, donne une odeur exactement semblable à celle de la combustion des différentes colles animales, que la gélatine forme spécialement, comme on sait. 4°. Dans les différentes affections où les os se ramollisent, la substance terreuse diminue plus ou moins sensiblement, et la gélatineuse reste plus abondante en proportion que de coutume.

Ces deux substances, gélatineuse et saline, qui entrent essentiellement dans la composition des os, leur impriment des caractères très-différens. Le phosphate calcaire, presque étranger à la vie, n'est destiné qu'à donner aux os la solidité et la résistance qui les caractérisent. La substance gélatineuse, au contraire, porte spécialement le caractère animal: aussi l'activité vitale est-elle en raison inverse de l'une, et directe de l'autre, comme nous le verrons. Privés de la seconde, les os ne sont plus susceptibles d'être digérés, ils n'offrent point de prise aux sucs gastriques; ceux-ci ne sauraient en extraire de matière nutritive, parce qu'ils agissent à peu près sur eux comme l'eau qui dissout la substance gélatineuse et l'extrait de la portion saline. Divers animaux qui avalent les os frais pour s'en nourrir mourraient à côté d'un os calciné: aussi plus les os contiennent de cette substance, plus ils sont nourrissans; ceux des jeunes animaux sont sous ce rapport plus propres à faire des bouillons gélatineux; à être digérés tout crus par l'estomac de certaines espèces, etc. Si on expose un os à l'action d'un acide, de manière à n'avoir que son parenchyme cartilagineux, et qu'on fasse ensuite ramol-

lir ce parenchyme dans l'eau bouillante, il devient un aliment qu'on peut manger.

Outre le phosphate calcaire et la gélatine, les os contiennent encore quelques principes salins, comme le sulfate et le carbonate de soude, etc.; mais leur proportion est trop petite pour nous occuper ici : je renvoie sur ce point aux traités des chimistes, au grand ouvrage de Fourcroy en particulier (1).

---

(1) Les os humains contiennent, suivant M. Berzélius, sur cent parties, 32,17 de gélatine et 1,13 de vaisseaux sanguins; 51,04 de posphate de chaux; 11,30 de carbonate de chaux, 2,00 de fluate de chaux; 1,16 de phosphate de magnésie; 1,20 de soude, d'hydrochlorate de soude et d'eau.

Cette analyse, la plus complète jusqu'à ce jour, ne s'accorde pas entièrement avec celle des autres chimistes. Ainsi, Fourcroy et M. Vauquelin ont reconnu l'existence des oxydes de fer et de manganèse, de la silice, de l'alumine, dans les os; au contaire, ils n'y ont point trouvé d'acide fluorique, etc. Au reste, la composition chimique des os offre une foule de différences, non-seulement suivant l'âge, le sexe, les individus, mais même dans les différentes parties du corps. L'analyse de M. Berzélius a été faite sur le fémur d'un adulte. Mais les dents contiennent manifestement beaucoup plus de substance terreuse; il paraît qu'il en est de même du rocher. Divers autres exemples de ce genre sont consignés dans l'Anatomie de Monro, d'après de nouvelles recherches de J. Davy.

Sous le rapport anatomique, les os se composent essentiellement d'un tissu fibreux particulier, dans les aréoles duquel se trouve déposée la matière calcaire. C'est ce tissu que l'on obtient en traitant un os par les acides. Le résidu de cette opération n'est point un cartilage, il n'en a ni la blancheur, ni la consistance, ni la composition; flexible comme les ligamens, il ressemble en

§ II. *Parties communes qui entrent dans l'organisation du Système osseux.*

Les anciens rangeaient les os parmi les parties blanches, parmi les tendons, les cartilages, etc. Cependant il suffit d'en examiner l'intérieur pour voir, par la rougeur qui les distingue, que beaucoup de sang y aborde. Ce sang y pénètre par trois ordres de vaisseaux: les uns appartiennent à la cavité médullaire des os longs, les autres au tissu celluleux, les autres au tissu compacte. Ces deux derniers ordres se distribuent dans le tissu osseux, et paraissent spécialement destinés à y déposer le phosphate calcaire: car, dans les cartilages d'ossification, les vaisseaux blancs apportent seuls la gélatine; dans les autres cartilages, il en est de même; en sorte que je pense que cette espèce de

---

tout aux organes fibreux, dont il ne diffère qu'en ce que l'ébullition le transforme plus aisément en gélatine, et que la macération le ramollit plus promptement. Ce tissu renferme tous les élémens organiques de l'os. On ne peut donc pas simplement le considérer comme de la gélatine, et dire que les os ne sont qu'un mélange de cette substance et de matière calcaire, ainsi que l'ont fait quelques auteurs. Cette expression convient d'autant moins, que la gélatine n'existe pas, à ce qu'il paraît, toute formée dans les os, pas plus que dans les autres matières animales, puisqu'il faut toujours le secours de l'ébullition pour l'obtenir. D'ailleurs, si l'on fait bouillir de la colle et de la matière calcaire, il n'en résulte qu'un composé inorganique, cassant, bien différent du tissu osseux. (Béclard.)

vaisseaux est aussi destinée, dans les os formés, à nourrir leur parenchyme cartilagineux, tandis que les vaisseaux rouges appartiennent plus à leur portion calcaire.

Chaque cavité médullaire n'a qu'un vaisseau unique, comme un seul trou de nutrition. Ce vaisseau a un diamètre proportionné à celui de l'os, qu'il pénètre sans laisser de ramification au tissu compacte, et où il se divise sur-le-champ en deux rameaux. Ceux-ci se portent en sens opposé aux deux extrémités de l'os, se ramifiant à l'infini dans l'organe médullaire, et vont perdre leurs derniers rameaux dans le commencement du tissu celluleux, où ils s'anastomosent avec les vaisseaux de ce tissu: celui qui occupe la cavité médullaire sous le nom de *réticulaire*, et la surface interne du tissu compacte, en reçoivent aussi quelques branches. Une veine accompagne partout l'artère, et en suit les distributions diverses.

Les vaisseaux du second ordre appartiennent au tissu celluleux des os longs, plats et courts; ils sont en nombre égal aux trous de ce tissu, et se ramifient sur les cellules; ils communiquent avec ceux de la moelle et du tissu compacte. A la mort, les petites artères restent en général pleines de sang rouge, qui indique leur trajet que leur ténuité déroberait, et que les injections peuvent rarement démontrer avec exactitude. Les veines compagnes de ces artères ne peuvent guère se voir (1).

---

(1) Les veines des os sont aujourd'hui bien mieux connues : on



Dessiné par Chazal. Mme Marcha

(Tom III, pag. 43).

Planche F.

Canaux veineux des os.

Fig. 1. Canaux veineux du front.

Fig. 2. Quelques-uns des canaux veineux de l'occiput.

Fig. 3. Coupe horizontale d'une vertèbre, pour montrer les canaux veineux de ces os.

Fig. 4. Coupe perpendiculaire et antéro-postérieure d'une vertèbre faite dans le même but.

Les vaisseaux sanguins du troisième ordre ne sont que les dernières ramifications des artères environnant les os, ramifications qui pénètrent en foule le tissu compacte et s'y arrêtent. L'existence de ces petits vaisseaux peut se constater de diverses manières : 1°. En détachant la dure-mère de la surface interne du crâne, une foule de gouttelettes sanguines annoncent leur rupture. 2°. En enlevant le périoste sur un sujet d'âge moyen, on fait une observation ana-

---

les trouve logées dans des canaux particuliers, découverts par M. Fleury, et tapissés par une lame de substance compacte ; elles ont des parois très-fines, qui paraissent constituées seulement par la membrane interne de tout le système veineux ; elles sont plus volumineuses que les artères auxquelles elles correspondent ; et, après avoir parcouru dans l'os un trajet plus ou moins long, d'autant plus long que l'os est formé d'une proportion plus grande de substance compacte, elles paraissent se terminer dans des cellules communiquant entre elles, et auxquelles aboutissent les artères capillaires, disposition à peu près semblable à celle des tissus appelés érectiles. Ces notions sur les veines des os sont fort importantes, et peuvent servir à l'interprétation de divers phénomènes morbides, par exemple, de la fréquence de la phlébite, et des accidens formidables qui en sont trop souvent la conséquence dans les fractures compliquées, suivant M. Dance. C'est l'inflammation des veines des os du crâne, dans les fractures des parois de cette cavité, qui est le principe des abcès du foie observés par plusieurs auteurs dans ces circonstances; abcès, au reste, moins communs qu'on le pense *généralement*. De mon côté je ne suis pas éloigné de croire, et ailleurs (*Dict. de Méd. et de Chir. prat.*, art. Amputation) j'ai émis cette opinion, que la phlegmasie des veines aréolaires des os à la suite des amputations dans la coutinuité de ceux-ci, apporte souvent des obstacles particuliers au succès de ces opérations. (F. Blandin.)

logue. J'ai remarqué que ces expériences réussissaient spécialement sur les submergés, ou sur les animaux qu'on asphyxie exprès, à cause de la grande quantité de sang que contiennent leurs vaisseaux. 3°. Si on fracture un os long dans le milieu, la portion compacte qui forme le canal médullaire présente de petites stries rougeâtres qui ne sont que ces petits vaisseaux encore pleins de sang, et dont on découvre ainsi un nombre plus ou moins considérable, suivant le mode dont le sang s'est arrêté dans le système capillaire à l'instant de la mort. 4°. La sciure du tissu compacte dans les animaux vivans est rouge, quoique moins manifestement que celle du celluleux ; preuve qu'on a divisé des vaisseaux.

Les vaisseaux des os sont extrêmement multipliés dans les enfans, ils diminuent chez l'adulte, deviennent rares chez le vieillard. La facilité de la formation du cal suit la même proportion dans les divers âges de la vie. Souvent, dans les affections du parenchyme osseux, ils prennent un développement remarquable, et tel, qu'il excède de beaucoup le diamètre naturel : les ostéo-sarcômes, les spina-ventosa, etc., présentent cette disposition, laquelle est plus souvent observée dans les tumeurs cancéreuses que dans toute autre.

Ces vaisseaux communiquent tous ensemble par des anastomoses multipliées : c'est ce qu'on voit surtout dans les os longs, entre ceux de l'organe médullaire et ceux du tissu celluleux. Par ces communications, ils se suppléent mutuellement dans leurs fonctions. J'ai vu le trou nourricier du tibia complétement oblitéré dans un cadavre que j'injectais :

une espèce de cartilage remplissait ce trou; l'artère ne formait plus qu'un véritable ligament : cependant sa bifurcation dans le canal médullaire se trouva très-bien injectée, et d'ailleurs aucune altération ne se manifestait dans la nutrition de l'organe médullaire, qui avait probablement reçu autant de sang qu'à l'ordinaire. Je ne trouvai rien aux environs du trou qui indiquât la cause de cette oblitération, qu'une exostose, une affection du périoste, une inflammation, peuvent très-bien produire.

D'un autre côté, on sait que des lames osseuses très-considérables sont souvent enlevées sur l'extrémité des os longs par la carie, qui détruit par conséquent tous les vaisseaux correspondant à ces lames, et que cependant l'os vit au-dessous, principalement aux dépens du sang qu'il reçoit par les extrémités de l'artère de l'organe médullaire. C'est aussi à peu près ce qui arrive aux os longs dans le premier âge, où les extrémités cartilagineuses n'offrent point de vaisseaux du second ordre, où presque tout le sang vient par conséquent de cette même artère de l'organe médullaire : aussi est-elle bien plus grosse à proportion, et le trou qui la reçoit est-il bien plus prononcé.

Rien n'est encore connu sur les systèmes des vaisseaux absorbans et exhalans des os, et nous ne pouvons raisonner sur ce point que par analogie. Du reste le travail nutritif les y suppose incontestablement.

Quant à leur tissu cellulaire, il paraît être presque nul; on peut même dire qu'en quelque en-

droit que l'on rompe les fibres celluleuses ou compactes, jamais ses filamens n'y sont distincts; mais c'est leur texture dense et serrée qui nous les dérobe. En effet, 1° quand cette texture se ramollit, que l'os se carnifie, comme on dit, le tissu cellulaire y devient très-apparent. 2°. Les bourgeons charnus nés sur les endroits fracturés ou mis à découvert ne sont que l'extension de ce tissu cellulaire, qui se trouve pénétré d'une trop grande quantité de substance calcaire pour être aperçu dans l'état naturel. 3°. Après avoir enlevé à un os frais toute cette substance par un acide, j'ai remarqué quelquefois des filamens cellulaires, en séparant les fibres cartilagineuses qui forment le parenchyme restant. 4°. Lorsqu'on fait bouillir ce parenchyme cartilagineux pour en extraire la gélatine, il reste des portions de membranes qui sont manifestement celluleuses.

On ne peut suivre les nerfs dans les os, tant sont ténus les filets qui y pénètrent : je ne sache pas que l'anatomie ait sur ce point aucune donnée positive (1).

---

(1) Klint, dans une thèse soutenue sous la présidence de Wrisberg, dit avoir vu pénétrer des filets nerveux par le trou qui donne passage à l'artère principale de ce canal. Walter en a figuré qui semblaient se porter vers le périoste, mais aucun anatomiste n'en a suivi jusque dans le tissu osseux. (Béclard.)

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME OSSEUX.

§ Ier. *Propriétés physiques.*

Les os ont des propriétés physiques très-caractérisées. La solidité, la dureté sont leur apanage particulier : or, ils empruntent cette double propriété du phosphate calcaire qui les pénètre : aussi va-t-elle toujours en croissant avec l'âge, parce que cette substance y devient de plus en plus prédominante. L'élasticité est une autre propriété physique des os qui se trouve combinée avec les deux précédentes, mais qui est en ordre inverse : comme c'est dans la substance gélatineuse, dans la portion cartilagineuse de l'os qu'elle réside, elle est d'autant plus marquée, comme cette portion, qu'on est plus près de l'enfance. Chez le vieillard, les os perdent entièrement et leur souplesse et leur élasticité; ils se rompent plus facilement. L'élasticité est plus sensible dans les os longs et grêles que dans ceux qui ont plus de volume : le péroné se courbe et revient très-manifestement sur lui-même, ce que le tibia ne fait qu'avec difficulté. Ce n'est pas que l'un soit plus élastique que l'autre, mais c'est que sa conformation est plus favorable au développement de cette propriété.

§ II. *Propriétés de tissu.*

Quoique la dureté et la solidité du tissu osseux semblent s'opposer à toute espèce d'extension et de contraction, cependant ces deux phénomènes y sont souvent très-apparens, et les propriétés de tissu dont ils dérivent sont très-sensibles.

L'extensibilité des fibres osseuses est prouvée par l'observation d'une foule de maladies, par le spina-ventosa, par le pédarthrocace, par le gonflement du sinus maxillaire lorsqu'il contient un polype, par l'élargissement des os du crâne dans l'hydrocéphale, etc. Je remarque, au sujet de ces diverses extensions, que souvent, par l'influence de causes analogues, les os qui prêtent et se distendent dans les cas ci-dessus sont brisés, usés, détruits dans d'autres. Un polype du nez perce la cloison naso-palatine sans l'avoir préliminairement distendue; l'anévrysme de l'aorte ne fait point ployer le sternum en devant, fléchir les vertèbres; mais il perce, il détruit ces os. A quoi tient cette différence d'effet, sous l'influence de causes à peu près identiques? cela n'est pas facile à déterminer. La contractilité de tissu est très-manifeste dans les os, dès que la cause qui en distendait les fibres est enlevée: on voit l'alvéole se resserrer, et même s'effacer, quand la dent en a été arrachée. La diminution d'épaisseur de la mâchoire après la pousse des dents ne vient que du resserrement de ses fibres, que ces os ne distendent plus autant, parce que la racine a

moins de largeur que la couronne, qui se trouvait jusque là totalement dans l'os. Le sinus maxillaire se rétrécit quand on a enlevé le fongus, ou donné issue au pus de l'os carié, etc., etc. Si la mort n'était pas trop promptement le résultat de la ponction à la tête des hydrocéphales, je suis persuadé qu'on verrait peu à peu les os revenir sur eux-mêmes, et rendre à la cavité du crâne ses dimensions naturelles. Lorsqu'on a enlevé le séquestre d'un os long nécrosé, l'os nouveau, formé à l'extérieur aux dépens du périoste, se resserre et revient sur lui-même d'une manière manifeste. Dans l'atrophie du nerf optique, le trou du même nom devient plus étroit. L'orbite se resserre quand l'œil cancéreux en a été extirpé. J'ai disséqué le conduit carotidien dans un chien dont j'avais lié une carotide : il n'y avait aucun resserrement, parce que le sang venant des anastomoses dilatait l'artère comme à l'ordinaire.

Ce retour des os sur eux-mêmes, en vertu de la contractilité de tissu, n'est point aussi prompt que celui des muscles, de la peau, etc., lorsqu'ils cessent d'être distendus par une tumeur, par une collection aqueuse, etc. Cela tient à la différence du tissu organique, à la rigidité des fibres osseuses par la substance calcaire qui les surcharge, etc. Aussi la sensibilité organique y est-elle moins prononcée.

§ III. *Propriétés vitales.*

Les os n'ont presque pas de propriétés animales

dans l'état naturel. La sensibilité y est nulle : la scie, le maillet, le ciseau, altèrent presque impunément leur tissu; le sentiment obscur du tact est le seul résultat de l'action de ces instrumens; le feu les attaque même sans faire souffrir beaucoup l'animal. Mais dans l'état pathologique, cette sensibilité s'y développe au plus haut degré : on connaît les douleurs atroces qui accompagnent le spina-ventosa, le pédarthrocace, celles non moins vives que la carie détermine en certains cas, etc. Si un os est enflammé, comme, par exemple, l'extrémité scié du moignon dans une amputation, cet os qui, dans l'état naturel, avait supporté l'action de la scie sans transmettre une impression pénible, devient pour ainsi dire un organe sensitif nouveau, où le moindre contact est douloureux. La contractilité animale est nulle dans le système osseux.

Les propriétés organiques animent ce système comme tous les autres. La sensibilité de cette espèce y existe certainement : les os sentent les fluides qui les pénètrent; ils s'approprient, en vertu de ce sentiment, ceux qui conviennent à leur nutrition. Mais réagissent-ils sur ces fluides ? ont-ils ces oscillations insensibles qui composent la contractilité organique insensible? Leur dureté semble s'y refuser. Mais cependant la circulation s'y opère; il se fait en eux un travail continuel, une décomposition et une composition habituelles qui ne peuvent guère se concevoir sans réaction de leur part. Au reste, cette réaction est plus lente, plus difficile, à cause de leur structure; et de là sans doute la lenteur dont nous allons parler dans les phénomènes vitaux du

système osseux. La contractilité organique sensible lui est étrangère.

Caractères des Propriétés vitales.

La vie propre des os ne se compose donc que de deux propriétés vitales, la sensibilité organique et la contractilité organique insensible. De ces deux propriétés dérivent tous les phénomènes vitaux que nous présentent ces organes, les inflammations, la formation des tumeurs, la cicatrisation de leurs solutions de continuité, etc. Cette vie propre est remarquable, en général, comme je viens de l'observer, entre les vies propres des autres organes, par sa lenteur particulière, par l'enchaînement tardif de ses phénomènes. Toutes choses égales du côté des âges, des proportions diverses de substance terreuse et cartilagineuse, l'inflammation y est plus lente que dans les autres parties. Le cal est remarquable entre les autres cicatrices par la durée de sa formation : comparez une exostose, dans son origine, ses progrès et son développement, à une tumeur des parties molles, à un phlegmon, par exemple, et vous verrez la différence. Qui ne sait que, tandis que la suppuration n'exige souvent que quelques jours dans les autres organes, elle reste des mois entiers à se former au milieu des os? Voyez la différence qu'il y a entre une gangrène des parties molles, où la mort succède à la vie dans un court espace, et la carie, la nécrose des os, où de longs intervalles sont nécessaires pour le passage du premier au second de ces états. En général, on peut dire que par là même

qu'elle existe dans un os, l'inflammation y est chronique (1).

Sympathies.

Ce caractère des propriétés vitales en imprime un analogue aux rapports sympathiques du système osseux avec les autres systèmes. D'abord, la contractilité animale et la contractilité organique sensible ne sauraient être mises en jeu dans ces rapports, puisqu'elles n'existent pas dans les os. La sensibilité animale ne s'y développant qu'avec peine et avec lenteur par les maladies qui les affectent essentiellement, les sympathies ne sauraient l'y mettre en jeu que d'une manière obscure. Ces sympathies doivent donc essentiellement porter sur la sensibilité organique et sur la contractilité organique insensible; et, comme ces deux propriétés ne se développent qu'avec lenteur, les sympathies di-

---

(1) Cette chronicité des inflammations osseuses n'est réelle que relativement à l'inflammation des autres systèmes d'organes dont la vitalité est plus grande; mais il ne faudrait point induire de ce passage de Bichat, comme je l'ai entendu faire par quelques personnes, et contre l'opinion de ce célèbre physiologiste, que, considérée exclusivement dans les os, cette maladie ne présente aussi un état aigu dans certaines circonstances. En effet, la distinction générale des phlegmasies en aiguës et chroniques, suivant la rapidité plus ou moins grande de leur marche, est toujours relative au degré de vitalité des organes dans lesquels on les observe; cette vérité, au reste, ressort d'une foule de passages de l'*Anatomie générale*. (F. Blandin.)

verses doivent être étrangères aux affections aiguës des autres organes : c'est ce que l'observation prouve évidemment. En effet, remarquez que, pendant que divers autres systèmes répondent avec une extrême promptitude aux maladies aiguës d'un organe, celui-ci, ainsi que les systèmes cartilagineux, fibro-cartilagineux, etc., restent presque toujours alors dans l'inaction. Que l'estomac, le poumon, le cerveau, etc., soient le siége d'une maladie un peu grave qui porte ce caractère aigu, vous voyez aussitôt une foule de phénomènes sympathiques naître dans les systèmes nerveux, vasculaires, musculaires, glanduleux, cutané, muqueux, etc., etc. : tous semblent ressentir le mal de l'organe affecté; chacun, suivant les forces vitales qui y dominent, présente différens phénomènes, qui ne sont que des aberrations, des développemens irrréguliers de ces forces : dans le système musculaire animal, c'est la contractilité animale qui est surtout exaltée, de là les spasmes, les convulsions; dans le glanduleux, le séreux, le cutané, le muqueux, etc., ce sont la contractilité organique insensible, la sensibilité organique, qui éprouvent principalement des altérations, de là les troubles divers et sympathiques des sécrétions, de la sueur, des exhalations; dans le nerveux, c'est la sensibilité animale qui est surtout mise en jeu sympathiquement, de là les douleurs vagues ou fixes en diverses parties; dans le musculaire organique, c'est la contractilité organique qui est exaspérée, de là les mouvemens irréguliers du cœur, de l'estomac, des intestins. Dans toutes les maladies ai-

guës d'un organe, il y a toujours deux ordres de symptômes, les uns relatifs à l'organe affecté, comme sont la toux, le point de côté, le crachement de sang, la difficulté de respirer, etc., dans les péripneumonies ; les autres purement sympathiques, et dérivant des rapports qui lient la vitalité de cet organe à celle de tous les autres : or, ceux-ci sont souvent bien plus nombreux que les autres.

Considérez les os au milieu de tout ce trouble sympathique général des systèmes où la vie est très-active : ils n'éprouvent aucune altération ; leur vie plus lente que celle des autres systèmes, ne se prête point à ces phénomènes qui portent le caractère aigu; il en est de même des cartilages, des fibro-cartilages, des poils, des cheveux, des aponévroses, etc. Tous ces systèmes, remarquables par le même caractère de vitalité, ne répondent point aux affections aiguës des autres systèmes; ils ne sont point sympathiquement affectés pendant ces affections, d'une manière sensible au moins. Voyez toutes les fièvres aiguës ; leurs nombreux phénomènes ne portent que sur les systèmes où la vie est très-active : tous ceux où elle est marquée par un caractère opposé restent constamment étrangers à ces phénomènes : ils sont, pour ainsi dire, calmes et tranquilles au milieu des orages qui agitent les autres. Prenons pour exemple les éruptions diverses qui ont lieu dans les fièvres : c'est sur la peau, sur les surfaces muqueuses, etc., qu'elles arrivent ; nées pendant la fièvre, elles s'en vont avec elle : or, les os, les cartilages, etc., ne pourraient point se prêter, par leur mode de vie, à

cette origine soudaine et à cette disparition rapide (1).

C'est donc dans les affections lentes et chroniques qu'il faut chercher des exemples de sympathies des systèmes osseux, cartilagineux, etc. Dans les premiers temps de l'invasion de la maladie vénérienne, où elle s'annonce par des symptômes aigus, ou du moins dont la marche n'est pas très-lente, comme par des bubons, des inflammations de l'urètre, etc., elle ne porte point son influence sur le système osseux; ce n'est que quand elle est ancienne, qu'elle a pour ainsi dire dégénéré, qu'elle est devenue chronique, que les os deviennent par elle le siége de douleurs, de tumeurs diverses, etc. Du reste, je ne sache pas qu'on ait encore bien analysé les

---

(1) De ce que nous ne pouvons point reconnaître d'altérations dans le système osseux des individus qui succombent dans le cours d'une maladie aiguë, faut-il en conclure que ce système alors ne sympathise pas avec les autres? Je ne le pense pas. La preuve de mon opinion peut être déduite rigoureusement de ce que Bichat rapporte plus loin des altérations des os dans les maladies chroniques. Quoi! dans les maladies lentes, pendant lesquelles les sympathies générales sont à peine mises en jeu, celles des os apparaîtraient dans tout leur développement, tandis que le contraire arriverait dans les maladies aiguës, qui ont sur les sympathies générales une action inverse. La chose serait par trop surprenante. Convenons donc plutôt, qu'en raison de la lenteur de leur mouvement nutritif, les os n'ont pas le temps de subir, dans les maladies aiguës, des modifications organiques assez profondes pour devenir bien sensibles; mais que ces modifications, bien que légères, n'en sont pas moins réelles, que celles, plus frappantes à la vérité, que présentent les os du malheureux depuis long-temps en proie à une maladie chronique. (F. Blandin.)

sympathies osseuses. J'ai montré seulement leur caractère général : on les appréciera mieux lorsqu'on aura fixé plus d'attention sur le rapport qu'il y a, dans les maladies, entre l'affection de chaque organe et son mode de vitalité.

Siége des Propriétés vitales.

Pénétrés des substances salines qui tendent sans cesse à obéir aux lois d'affinité, d'attraction, et à faire dominer ces lois sur celles de la sensibilité et de la mobilité organique, les os semblent tenir le milieu, dans les corps vivans, entre ces corps eux-mêmes et les corps bruts. Il n'y a vraiment qu'une partie de leur tissu osseux qui participe aux phénomènes vitaux, savoir, leur substance cartilagineuse ; l'autre partie, ou la substance calcaire, y est étrangère : aussi la proportion de chacune de ces substances mesure-t-elle dans les os leur degré de vie. Chez l'enfant, où la première prédomine, dans les premiers temps de la formation du cal, où elle se rencontre exclusivement, dans le ramollissement des os, où elle reste presque seule, tous les phénomènes vitaux deviennent plus marqués, plus énergiques. Au contraire, à mesure que l'âge entasse dans les os la substance saline, à mesure que, dans certains animaux, cette accumulation a lieu par les lois naturelles de l'ossification dans quelques portions extérieures du système à base calcaire, comme dans les cornes des cerfs, dans les enveloppes des crustacés, etc., la vie est, pour

ainsi dire, successivement détruite dans les os : elle finit par être nulle quand cette portion calcaire vient à prédominer considérablement ; c'est ce qui arrive dans la nécrose qui détermine la chute des cornes, des enveloppes des crustacés, etc.

D'ailleurs, ce qui mesure l'énergie vitale dans un organe, c'est la rapidité avec laquelle l'inflammation y parcourt ses périodes, et la fréquence de cette affection, etc. Or, dans les os, les inflammations sont d'autant plus rapides qu'elles ont lieu lorsqu'ils contiennent plus de tissu cartilagineux : considérez les périodes de la formation du cal aux différens âges, périodes qui sont mesurées par la durée de l'inflammation nécessaire à cette formation, vous verrez que, chez l'enfant, elles sont courtes et rapprochées ; qu'elles sont beaucoup plus longues chez le vieillard, et que souvent même la consolidation ne peut se faire, tandis qu'elle s'opère avec facilité dans toutes les autres parties molles. Sans doute l'affaiblissement général qui porte sur toutes les forces vitales par l'effet de l'âge est une cause de cette lenteur et de cette rapidité du cal aux deux extrémités de la vie; mais les proportions diverses des substances gélatineuse et calcaire y entrent aussi pour beaucoup : car, qu'on compare d'autres cicatrices à celle-ci, les cicatrices cutanées, par exemple, l'âge y établit une différence infiniment moins sensible, sous le rapport de cette rapidité ou de cette lenteur de la réunion, que dans le système osseux. Déjà les os ne vivent plus assez pour s'enflammer et se réunir, que la peau, les muscles présentent encore ce phénomène

d'une manière très-marquée. J'ai vu un vieillard dont le col du fémur fracturé était resté depuis long temps sans réunion, et chez lequel une plaie de la face fut agglutinée par première intention avec beaucoup de promptitude (1).

Enfin, voici une expérience simple, que j'ai faite souvent, et qui prouve bien, comme les faits précédens, que c'est dans le cartilage de l'os qu'est vraiment sa partie animale. On sait qu'un des grands attributs des corps animalisés, c'est de brûler en se racornissant, en se resserrant: or, tant que l'os est pénétré de son sel terreux, il n'a point ce mode de combustion; privez-l'en par un acide, le parenchyme cartilagineux qui reste brûle de cette manière. L'os plat, chez l'enfant, où ce parenchyme prédomine, offre aussi ce phénomène en brûlant; il force la portion calcaire, qui est en petite quantité, à obéir à l'impulsion qu'il lui donne en se con-

---

(1) L'exemple rapporté par Bichat, *d'un vieillard dont le col du fémur fracturé était resté long-temps sans réunion*, ne prouve pas qu'à un âge avancé de la vie, les os ne sont plus susceptibles de s'enflammer et de se réunir, alors que les parties molles, la peau et les muscles, jouissent encore de cette précieuse propriété. En effet, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, ce défaut de réunion de la fracture du col du fémur, a été plutôt un effet de la privation de vaisseaux du fragment supérieur, qui est presque réduit à l'état d'un corps étranger, qu'à l'âge de l'individu; car un semblable résultat a été souvent observé chez des sujets encore jeunes. Au reste, on sait très-bien, d'autre part, que les fractures, chez les vieillards valides, se cicatrisent bien en général, quoique plus lentement que dans les premiers âges de la vie.

(F. Blandin.)

tournant en différens sens; mais, dans l'adulte, où cette portion calcaire devient excédente, l'os reste immobile pendant que le feu le pénètre, et tout son cartilage lui est enlevé sans que ses fibres puissent obéir à leur tendance au racornissement que leur imprime la combustion.

ARTICLE IV.

DES ARTICULATIONS DU SYSTÈME OSSEUX.

Tous les os sont unis entre eux: leur assemblage forme le *squelette*. Le mode de leur union varie; mais, quel qu'il soit, on le désigne sous le nom général d'*articulations*.

§ Ier. *Division des Articulations.*

Toutes les articulations se rapportent à deux classes générales: la mobilité est le caractère de la première, l'immobilité (1) celui de la seconde.

L'une appartient à tous les os qui servent à la lo-

---

(1) En prenant ce terme dans son acception la plus rigoureuse, il n'y a pas d'articulations complétement *immobiles;* les unes seulement ont des mouvemens très-évidens, les autres, au contraire, n'en présentent que de très-obscurs: les sutures du crâne ou de la face sont de ce dernier genre. Au reste, ces dernières varient singulièrement suivant les âges, sous le rapport de la mobilité, jusqu'au moment où on les voit disparaître chez le vieillard par la soudure des os qui entrent dans leur composition.

(F. Blandin.)

comotion, à quelques-uns de ceux destinés aux fonctions intérieures, comme aux côtes, à la mâchoire inférieure, etc. L'autre se rencontre spécialement dans les os dont l'ensemble forme des cavités destinées à garantir les organes, comme on le voit à la tête, au bassin, etc.

1°. *Articulations mobiles.—Considérations sur leurs mouvemens.*

Je divise les articulations mobiles en quatre genres, dont les caractères sont empruntés des mouvemens divers qu'ils exécutent. Pour concevoir cette division, il faut donc préliminairement connaître les mouvemens articulaires en général. Ces mouvemens peuvent se rapporter à quatre espèces, qui sont, 1° l'opposition, 2° la circulation, 3° la rotation, 4° le glissement.

1°. Le mouvement d'opposition est celui qui se fait en deux sens opposés, par exemple, de la flexion à l'extension, de l'adduction à l'abduction, et réciproquement. Ce mouvement est vague ou borné; vague, lorsqu'il se fait dans tous les sens, d'abord dans les quatre énoncés ci-dessus, puis dans tous ceux qui leur sont intermédiaires; borné, lorsqu'il n'a lieu que de la flexion à l'extension, de l'adduction à l'abduction, etc. Le fémur, dans son articulation pelvienne, jouit d'un mouvement vague d'opposition. Le tibia, dans son articulation fémorale, a un mouvement borné d'opposition.

2°. La circumduction est le mouvement dans lequel l'os décrit une espèce de cône, dont le som-

met est dans son articulation supérieure et la base dans l'inférieure, en sorte qu'il se trouve successivement en flexion, en adduction, en extension et en abduction, ou bien en abduction, en extension, en adduction et en flexion, suivant le mouvement par lequel il commence, et que de plus il parcourt tous les sens intermédiaires à ceux-ci. D'où l'on voit que la circumduction est un mouvement qui est composé de tous ceux d'opposition, et dans lequel l'os, au lieu de se mouvoir d'un sens au sens opposé, comme dans le cas précédent, se meut d'un sens au sens le plus voisin, en décrivant ainsi par son extrémité un cercle qui est la base du cône dont j'ai parlé, et qui est d'autant plus grand que l'os est lui-même plus long. On comprend facilement que, parmi les os, ceux seuls dont le mouvement d'opposition est vague jouissent de la circumduction.

3°. La rotation est toute différente du mouvement précédent. Dans celui-là, il y avait locomotion, passage de l'os d'une place à une autre; ici il reste toujours au même lieu; il ne tourne que sur son axe. L'humérus, le fémur jouissent de ce mouvement, qui est simple.

4°. Le glissement appartient à toutes les articulations. C'est un mouvement obscur par lequel deux surfaces se portent en sens opposé, en glissant pour ainsi dire l'une sur l'autre. Dans tous les autres mouvemens, celui-ci se rencontre; mais souvent il existe sans eux.

Il est facile de concevoir, d'après ces notions sur les mouvemens articulaires, la division en

genres de la classe des articulations mobiles. En effet, il est des articulations où tous les mouvemens se trouvent réunis; dans d'autres, il y a de moins la rotation; dans plusieurs, la rotation et la circumduction manquent, et l'opposition n'existe qu'en un sens; quelques-unes n'ont que la rotation. Enfin il en est où la rotation, la circumduction et l'opposition sont nulles, le glissement restant seul.

D'où l'on voit que la nature marche ici comme ailleurs, par gradation; que, des articulations les plus mobiles à celles qui le sont moins, il est divers degrés de décroissement; que la nature descend peu à peu aux articulations immobiles, qu'elle y arrive enfin réduite au seul mouvement du glissement, tel que celui qui existe au carpe, au tarse, etc. Il est même encore un intermédiaire au glissement et à l'immobilité; c'est l'articulation de la symphyse pubienne, qui peut être considérée avec celle de l'humérus comme formant les deux extrêmes de la série des articulations mobiles.

Toutes les articulations dont je viens de parler sont à surfaces contiguës; c'est le caractère général de celles qui sont mobiles. Cependant il y a une exception à cette règle: c'est l'articulation du corps des vertèbres, où il y a continuité et mobilité. La symphyse pubienne est aussi en partie continue dans ses surfaces, et a cependant quelquefois des mouvemens obscurs. De là naît une division des articulations mobiles, en celles à surfaces continues, et en celles à surfaces contiguës.

2°. *Articulations immobiles.*

Les articulations immobiles sont tantôt à surfaces engrenées, comme celles des os du crâne, où une foule d'aspérités et d'enfoncemens se reçoivent d'une manière réciproque; tantôt à surfaces juxtaposées, comme dans l'articulation du temporal avec le pariétal, des deux os maxillaires supérieurs entre eux; tantôt à surfaces implantées, comme dans les dents.

Toutes les différentes divisions que je viens d'énoncer se concevront facilement par le tableau suivant : il n'est pas le même que celui que j'ai donné dans mon *Traité des Membranes;* je crois qu'il présente une classification un peu plus utile, en ce qu'il offre pour caractère les deux choses essentielles à connaître dans toute espèce d'articulation mobile, savoir, 1° le rapport des surfaces articulaires, qui caractérise les ordres, 2° le nombre des mouvemens de chacune, qui distingue les genres. Il n'y a que des ordres dans les articulations immobiles; parce que, outre le rapport des surfaces, les articulations ne présentent pas assez de différence pour les subdiviser.

Tableau des Articulations.

	CLASSES.	ORDRES.	GENRES.
ARTICULATIONS	Ier. Mobiles	Ier. à surfaces contiguës.	Ier. Opposition vague, Circumduction et Rotation.
			IIe. Opposition vague, et Circumduction.
			IIIe. Opposition bornée.
			IVe. Rotation.
			Ve. Glissement.
		IIe. à Surfaces continues.	
	IIe. Immobiles	Ier. à Surfaces juxtaposées.	
		IIe. à Surfaces engrenées.	
		IIIe. à Surfaces implantées.	

Après avoir ainsi divisé les articulations, présentons sur chaque classe quelques considérations générales. Mais remarquons auparavant que le tableau précédent, considéré dans les articulations mobiles à surfaces contiguës, indique parfaitement la disposition de ces articulations aux luxations, qui sont d'autant plus fréquentes que les mouvemens

sont plus étendus. Le premier genre y est le plus exposé; le dernier en est le moins fréquemment affecté; les autres y sont d'autant plus ou d'autant moins sujets, qu'ils sont plus voisins de l'un ou de l'autre, dans l'ordre indiqué.

§ II. *Considérations sur les Articulations mobiles.*

La classe des articulations mobiles est la plus importante à considérer, parce que le mécanisme de celles-ci est le plus compliqué des deux ordres composant cette classe, comme nous l'avons vu. Le dernier, ou celui des articulations à surfaces continues, ne nous occupera pas dans ces considérations générales : comme il ne comprend qu'une espèce de mouvement, celui des vertèbres, ce mouvement sera traité dans l'examen de l'épine.

L'ordre des articulations mobiles à surfaces contiguës renferme, comme nous l'avons dit, cinq genres caractérisés par leurs mouvemens respectifs.

Premier Genre.

L'opposition vague, la circumduction et la rotation caractérisent ce genre, le premier par l'étendue et le nombre des mouvemens. Les articulations scapulo-humérale et ilio-fémorale en sont des exemples: elles le composent même exclusivement.

On conçoit pourquoi c'est à la partie supérieure des membres que la nature a placé ce genre. Un double avantage résulte de cette situation. D'un

côté, très-éloigné de la partie du membre immédiatement en butte à l'action des corps extérieurs, il échappe plus facilement aux luxations auxquelles le dispose son peu de solidité. D'un autre côté, il peut, par cette situation, imprimer au membre des mouvemens de totalité qui suppléent à ceux des articulations inférieures, dont la solidité exclut la mobilité en tous sens. Par exemple, les deux articulations dont je viens de parler sont non-seulement les articulations des os qui les forment, de l'humérus et du fémur, mais encore les articulations de tout le membre, qu'elles dirigent en divers sens : aussi l'ankylose de ces articulations rend-elle le membre complétement inutile, tandis que celle des articulations inférieures en annule seulement les mouvemens partiels.

Le mode de mobilité de ce genre d'articulations nécessite une forme arrondie dans ses surfaces articulaires, soit qu'étant concaves elles reçoivent, soit qu'étant convexes elles soient reçues. Cette forme est en effet la seule qui puisse se prêter à l'opposition vague, à la rotation et à la circumduction réunies; aussi est-ce celle des parties supérieures de l'humérus avec l'omoplate, et du fémur avec l'os innominé : l'os qui se meut est à surface convexe, celui qui sert d'appui est à surface concave. Il y a dans les animaux des exemples d'une disposition inverse, c'est-à-dire qu'une concavité se meut en tous sens sur une convexité; mais l'homme ne présente point cette disposition.

Quoique les deux membres aient entre eux la plus grande analogie par leurs mouvemens, cepen-

dant il y a quelques différences relatives surtout à leurs usages respectifs, qui sont pour l'un de servir à saisir, à repousser les corps, pour l'autre d'être destiné à la locomotion. La principale de ces différences, c'est que la rotation et la circumduction s'y trouvent en raison exactement inverse. La raison mécanique et les avantages de cette disposition sont faciles à saisir.

Au fémur, la longueur du col, qui est le levier de rotation, détermine beaucoup d'étendue dans ce mouvement, lequel supplée à la pronation et à la supination qui manquent à la jambe, en sorte que toute rotation du pied est un mouvement de totalité du membre. A l'humérus, au contraire, le col très-court, rapprochant de l'axe de l'os le centre du mouvement, borne la rotation, qui est moins nécessaire, à cause de celle de l'avant-bras : le mouvement de la main en dehors ou en dedans n'est donc jamais communiqué que par une partie du membre.

Quant à la circumduction ou au mouvement en fronde, la longueur du col du fémur y est un obstacle. En effet, remarquons que ce mouvement est en général d'autant plus facile, qu'il est exécuté par un levier rectiligne, parce qu'alors l'axe du mouvement est l'axe même du levier; qu'au contraire, si le levier est angulaire, le mouvement devient d'autant plus difficile, parce que l'axe du mouvement n'est pas celui du levier, et, en général, on peut dire que la difficulté du mouvement est en raison directe de la distance de ces deux axes.

Cela posé, observons que l'axe du mouvement

de circumduction du fémur est évidemment une ligne droite, obliquement dirigée de la tête aux condyles, et éloignée par conséquent, en haut, de l'axe de l'os par tout le col. Or, d'après ce qui vient d'être dit, il est évident que la difficulté de la circumduction sera en raison directe de la longueur du col, et par conséquent assez grande. A l'humérus, au contraire, le col étant très-court, l'axe de l'os et celui du mouvement sont presque confondus : de là la facilité et l'étendue de la circumduction. On pourrait fixer rigoureusement le rapport de ces mouvemens par cette proportion : la circumduction de l'humérus est à celle du fémur comme la longueur du col de l'humérus est à la longueur du col du fémur; ce qui nous mène à déterminer de combien la circumduction du fémur est plus difficile que celle de l'humérus. Il suffit en effet, pour le savoir, de connaître l'excès de longueur du col du premier sur la longueur du col du second.

Il est facile de sentir les avantages de cette étendue très-grande dans la circumduction des membres supérieurs destinés à la préhension, et des bornes mises par la nature à celle des membres inférieurs destinés à la station et à la locomotion. On comprend aussi pourquoi les luxations sont plus faciles dans les premiers que dans les seconds. Le déplacement a presque toujours lieu, en effet, dans un des mouvemens simples dont la succession forme le mouvement composé de circumduction, par exemple, dans l'élévation ou l'abaissement, dans l'adduction ou l'abduction, etc. Or, tous ces mouvemens étant portés bien plus loin à l'humérus qu'au fé-

mur, les surfaces doivent plus facilement s'abandonner.

Second Genre.

Ce genre diffère du premier par l'absence du mouvement de rotation. L'opposition et la circumduction s'y rencontrent seules. On en trouve des exemples dans les articulations temporo-maxillaire, sterno-claviculaire, radio-carpienne, métacarpo-phalangienne, carpo-métacarpienne du pouce, etc.

Le défaut de rotation suppose évidemment, d'après ce qui a été dit plus haut, l'absence d'une tête osseuse dont l'axe fasse, comme dans le genre précédent, un angle avec l'axe du corps de l'os. Aussi, dans tous les os des articulations que je viens d'indiquer, la surface articulaire est à l'extrémité même de l'os, et non sur le côté; l'axe est le même pour tous deux. Ils forment un levier rectiligne, au lieu d'en représenter un angulaire.

Les surfaces articulaires sont en général, comme dans le cas précédent, uniformes, sans éminences et enfoncemens réciproques; ce qui gênerait, empêcherait même la circumduction. Pour l'os qui sert d'appui, c'est une concavité plus ou moins profonde; pour l'os qui se meut, c'est une convexité analogue. Les surfaces correspondantes du temporal et de l'os maxillaire inférieur, des os du métacarpe et des premières phalanges (1), etc., sont des exemples de cette disposition.

---

(1) C'est par mégarde que Bichat cite ici les articulations

Ce mode articulaire est le plus favorablement disposé pour la circumduction, qui est, comme nous l'avons vu constamment, en raison inverse de la rotation, et qui par conséquent offre la plus grande facilité possible quand le levier est rectiligne, circonstance où la rotation devient nulle. Cependant, dans plusieurs articulations de ce genre, la circumduction est manifestement moins étendue qu'à l'humérus et au fémur; mais cela tient à la disposition des puissances motrices, qui, en beaucoup plus grand nombre dans les articulations de ces deux os, suppléent à la disposition désavantageuse pour la circumduction des surfaces articulaires.

Dans le genre d'articulations qui nous occupe, il y a toujours un sens où le mouvement d'opposition est plus facile que dans les autres; par exemple, c'est l'élévation et l'abaissement dans la mâchoire, la flexion et l'extension dans les premières phalanges, dans le poignet, etc. En général, il y a deux ligamens latéraux et la capsule dans le sens où les mouvemens sont plus bornés, la capsule seulement dans celui où ils sont plus étendus.

---

métacarpo-phalangiennes comme exemple d'une tête appartenant à l'os mobile, et d'une cavité située sur l'os qui sert principalement de point d'appui; ces jointures sont au contraire le modèle d'une disposition inverse. (F. Blandin.)

Troisième Genre.

A mesure que vous avançons dans l'examen des genres articulaires, l'étendue de leur mouvement diminue. Celui-ci a de moins que le précédent l'opposition en plusieurs sens et la circumduction, qui suppose toujours une opposition vague. Ici cette opposition est toujours bornée à un sens unique, à celui de la flexion et de l'extension, par exemple.

On rencontre spécialement ce genre articulaire dans le milieu des membres, comme au coude, au genou, au milieu des doigts, dans les articulations des phalanges. Quoique l'os qui les compose inférieurement ne se meuve par lui-même qu'en un sens, cependant il emprunte des mouvemens vagues de l'articulation supérieure du membre, et peut par là se diriger de tous côtés.

Les surfaces articulaires se trouvent ici, comme dans le genre précédent, à l'extrémité de l'os, ayant le même axe que lui; mais elles diffèrent, 1° en ce qu'il y a plusieurs éminences et cavités qui se reçoivent réciproquement, disposition qui, en permettant le mouvement dans un sens, l'empêche dans les autres. Assez ordinairement ce sont deux espèces de saillies arrondies, nommées *condyles*, qui roulent d'avant en arrière, ou de dehors en dedans, etc., sur deux cavités analogues, et que sépare une éminence, laquelle est reçue dans l'écartement des condyles, comme on le voit aux articulations fémoro-tibiale, phalangiennes, etc. 2°. La largeur des surfaces distingue aussi ce genre du pré-

cédent; cette largeur assure sa solidité, et prévient les luxations, qui, du reste, sont plus à craindre quand elles arrivent ici, où plus de ligamens sont rompus dans cette circonstance.

Il y a toujours dans ce genre plus d'étendue de mouvement d'un côté, que de celui qui est opposé. En général, toujours la flexion a des limites plus reculées que l'extension : voyez en effet les condyles du fémur, des phalanges, etc., ils s'étendent beaucoup plus loin dans la première que dans la seconde direction : pourquoi? parce que tous nos mouvemens principaux sont de flexion, et que les mouvemens d'extension ne sont, pour ainsi dire, que les modérateurs des premiers, et n'ont pour but que de ramener le membre dans une position d'où il puisse partir pour se fléchir de nouveau (1). Voilà pourquoi le nombre et la force des fibres sont plus grands dans les fléchisseurs que dans les extenseurs; pourquoi les gros troncs vasculaires et nerveux sont toujours du côté de la flexion, comme

---

(1) Tout ceci démontre sans réplique la nécessité de grands mouvemens de flexion dans les articulations ginglymoïdales, mais ne peut être considéré comme la preuve que le champ de l'extension y est plus borné que celui de la flexion. Cette preuve, cette raison, est toute anatomique, et Bichat ne la fournit que très-incomplétement plus bas pour les articulations du coude et du genou. M. Dupuytren, dans sa thèse inaugurale, a résolu cette question. Il a établi, en effet, que les *ligamens latéraux, placés plus près du sens de la flexion que de celui de l'extension, et plus courts que les sphéroïdes osseux auxquels ils sont annexés,* sont la cause de ce phénomène remarquable. (F. Blandin.)

on le voit à la cuisse, à la jambe, à l'avant-bras, aux phalanges, etc. Il y a toujours quelque chose qui borne le mouvement du côté de l'extension, comme l'olécrâne à l'articulation huméro-cubitale, les ligamens croisés dans l'articulation fémoro-tibiale, etc.

Quoique, dans le genre qui nous occupe, il n'y ait point de mouvement de circumduction caractérisé, cependant lorsque la jambe ou l'avant-bras sont en flexion, ils peuvent se mouvoir latéralement et même en forme de cône, mais d'une manière peu sensible. Dans l'extension cela est impossible, parce que les ligamens latéraux, très-tendus, ne prêtent point assez pour laisser l'os s'incliner d'un côté ou de l'autre (1).

---

(1) Les ligamens latéraux des articulations ginglymoïdales sont, en effet, tendus dans les mouvemens d'extension, et relâchés dans ceux de flexion : ces faits, qui ressortent de l'explication donnée par M. Dupuytren de la disposition de ces ligamens, explication rapportée dans la note précédente, avaient, comme on le voit, été reconnus par Bichat; ils interprètent merveilleusement l'attitude particulière qu'affectent exclusivement les membres dont quelques articulations sont le siége d'une vive phlegmasie : ces membres se fléchissent d'une manière proportionnée à l'étendue de la lésion. Voyez, en effet, ce qui arrive au genou, au coude, etc., lorsqu'ils sont le siége de tumeurs blanches. Dans cette flexion, les ligamens latéraux, relâchés, laissent plus d'écartement entre les surfaces osseuses correspondantes; les parties malades sont soumises à une moindre pression, et les douleurs sont d'autant diminuées. Cherchez, dans cet état de choses, à replacer le membre dans des conditions inverses; il devient le siége des plus vives douleurs, auxquelles concourt cer-

Quatrième Genre.

Toute espèce d'opposition et de circumduction disparaît dans ce genre, qui ne nous offre plus que la rotation isolée, comme on le voit dans les articulations cubito-radiale, atloïdo-axoïdienne. Tantôt c'est une surface concave roulant sur une convexe, comme au bas du radius, à l'apophyse odontoïde; tantôt c'est une surface convexe se mouvant sur une concave, comme au haut du radius : toujours il y a une espèce de ligament qui complète la surface concave, et qui forme ainsi un anneau tournant sur l'os, ou dans lequel l'os tourne.

Les luxations sont ici très-difficiles, parce que, la rotation se faisant sur l'axe de l'os, les ligamens ne sont guère plus distendus d'un côté que de l'autre, et se rompent par là même difficilement, quelle que soit l'étendue du mouvement. La partie inférieure du radius fait un peu exception à cette règle, parce que c'est sur le cubitus, et non précisément sur son axe, que l'os tourne en cet endroit.

La rotation ne se trouve point à la jambe comme à l'avant-bras, parce que, comme nous l'avons vu, celle du fémur, qui est très-étendue, y supplée, ce que l'humérus ne ferait que difficilement par rapport à l'avant-bras, comme on le voit dans les ankyloses de celui-ci.

---

tainement pour une grande part la pression des surfaces osseuses es unes sur les autres. (F. Blandin.)

Cinquième Genre.

Toute espèce de rotation, d'opposition et de circumduction est nulle dans ce genre, qui est le plus nombreux, et qui renferme les articulations du carpe, du métacarpe, du tarse, du métatarse, des vertèbres entre elles par leurs apophyses articulaires, de l'atlas avec l'occipital, des extrémités humérale de la clavicule, sternale des côtes, supérieure du péroné. Il n'y a qu'une espèce de glissement plus ou moins obscur, et dans lequel les surfaces osseuses ne s'abandonnent presque pas. Ces surfaces sont presque toutes planes, très-serrées les unes contre les autres, unies par un nombre considérable de ligamens, et tellement fortifiées dans leurs rapports, que les luxations n'y arrivent presque jamais. Une autre raison les rend d'ailleurs difficiles; c'est que tout ce genre d'articulations appartient presque à des os courts : or, on sait que le mouvement imprimé à un os a une efficacité d'action qui est en raison directe de sa longueur, et inverse de sa petitesse; par exemple, la même puissance, appliquée à l'extrémité tibiale du fémur, luxera bien plus facilement son extrémité ischiatique, que si elle agit sur le milieu de cet os.

Comme le mouvement isolé de chacune des articulations du cinquième genre est presque nul, la nature en réunit ordinairement plusieurs dans le même endroit, afin de produire un mouvement général sensible, comme on le voit au carpe, au

tarse, aux vertèbres, etc. : c'est encore là une raison de la difficulté des luxations de ce genre articulaire. En effet, quelque violens que soient les mouvemens généraux, deux os pris isolément se meuvent peu l'un sur l'autre; or, ce n'est que l'étendue du mouvement des deux os isolés qui peut en produire le déplacement.

§ III. *Considérations sur les Articulations immobiles.*

Nous n'avons indiqué que des ordres dans cette classe, parce que ses variétés ne sont pas assez grandes pour y assigner des genres.

1°. L'ordre des articulations immobiles à surfaces juxta-posées se rencontre là où le seul mécanisme de la partie suffit presque pour assurer la solidité des os, qui se trouvent seulement placés l'un à côté de l'autre, sans tenir par aucune engrenure, et n'ayant entre eux qu'une lame cartilagineuse légère : ainsi les os maxillaires, enclavés entre les pommettes, les unguis, l'ethmoïde, les palatins, le vomer, le coronal, etc., sont soutenus plus par le mécanisme général de la face, que par les liens articulaires qui les unissent l'un à l'autre : ainsi la portion écailleuse du temporal soutient-elle le pariétal, plus par le mécanisme des arcs-boutans, que par le mode d'union de leurs surfaces respectives. Otez ce mécanisme général de la partie, vous verrez bientôt toutes les articulations tomber comme d'elles-mêmes.

2°. L'ordre des articulations immobiles à surfaces engrenées doit aussi en partie sa solidité au mécanisme général de la région; mais ce mécanisme serait insuffisant pour assurer cette solidité : aussi les os, au lieu de présenter des surfaces presque planes, offrent-ils des aspérités et des enfoncemens très-sensibles qui s'engrènent les uns dans les autres, comme on le voit dans les articulations des pariétaux entre eux, avec le sphénoïde, l'occipital, le coronal, etc. : c'est ce qu'on appelle *les sutures*. Cet ordre articulaire se rapproche tantôt du précédent, comme dans l'union du pariétal et du coronal, qui, appuyant réciproquement l'un sur l'autre, se soutiennent par ce mécanisme plus encore que par leurs engrenures; tantôt il a plus de rapport avec l'ordre suivant, comme dans l'articulation pariéto-occipitale, où des engrenures très-profondes assurent presque seules la solidité de l'union. Cet ordre ne s'observe jamais que sur les bords des os plats; l'engrenure de ces bords supplée à leur peu de largeur, en multipliant les points de contact. Les éminences et enfoncemens composant l'engrenure ont toujours une grandeur et une forme irrégulières : ils sont exactement moulés les uns sur les autres, et ne se ressemblent point dans deux os de même espèce, et tirés de deux sujets différens; en sorte qu'on ne peut point unir à un pariétal gauche détaché le pariétal droit d'un autre individu. On a beaucoup disputé sur la formation des sutures : elles sont un effet isolé des lois de l'ossification, effet dont nous ne pouvons pas plus rendre raison que de tous les autres, et que des phénomènes généraux

de l'accroissement : nous verrons la marche qu'elles suivent dans cette formation. Cet ordre articulaire s'efface peu à peu avec l'âge, et les os se réunissent par l'ossification du léger cartilage intermédiaire. Il est plus rare que l'ordre précédent disparaisse. J'ai vu cependant, dans l'extrême vieillesse, diverses articulations de cet ordre cesser d'être sensibles, celle des os maxillaires entre eux spécialement.

3°. L'ordre des articulations à surfaces implantées n'emprunte nullement sa solidité du mécanisme de la partie; il la doit entièrement au rapport des surfaces, qui sont tellement unies et embrassées les unes par les autres que tout déplacement est impossible. Il n'y a qu'un exemple de cet ordre articulaire : c'est l'articulation des dents avec les mâchoires.

L'âge n'efface point ici l'articulation (1), et ne confond point par là même les deux os comme dans les ordres précédens, parce que le moyen d'union est la membrane palatine, qui appartient au système muqueux, et qui, par cette organisation, n'a

---

(1) Par la raison que les dents ne sont point, à proprement parler, des os, ainsi que j'ai eu occasion de le dire plus haut, leur jonction avec les os maxillaires diffère tout-à-fait de celle des os entre eux : ce ne sont pas là enfin des articulations, dans le sens ordinairement attaché à ce terme. Néanmoins, on doit convenir, contre le sentiment de Bichat, que les cas dans lesquels on observe la soudure des dents et de leurs alvéoles ne sont point rares, quoiqu'il ne faille pas considérer comme tels tous ceux rapportés par les auteurs. (F. Blandin.)

jamais de tendance à l'ossification; au lieu que, dans les cas précédens, le cartilage intermédiaire a une disposition naturelle à s'encroûter de phosphate calcaire.

§ IV. *Des Moyens d'union entre les surfaces articulaires.*

Les surfaces articulaires s'abandonneraient bientôt si divers organes ne les retenaient en place. Ces organes sont, pour les articulations immobiles, les cartilages et les membranes; pour les articulations mobiles, les ligamens et les muscles.

Union des Articulations immobiles.

Les deux premiers ordres des articulations immobiles, celles à surfaces engrenées et celles à surfaces juxtaposées, ont des cartilages intermédiaires aux surfaces osseuses, cartilages dont la largeur et l'épaisseur sont d'autant plus grandes qu'on les examine dans un âge plus voisin de l'enfance. Presque tous les os de la tête tiennent entre eux de cette manière, qui leur permet de céder un peu dans les efforts qu'ils essuient, et qui, par conséquent, prévient leurs fractures.

Dans les articulations pelviennes, il y a, outre les cartilages, des ligamens : mais comme ces articulations exécutent, en certains cas, de légers glissemens, on peut les considérer comme intermédiaires aux articulations mobiles et aux immobiles; c'est pour cela qu'elles réunissent les deux

genres d'organes spécialement destinés à affermir les surfaces articulaires de chacune de ces classes, savoir, les cartilages et les ligamens.

Les articulations immobiles à surfaces implantées, ordre qui ne comprend que les dents, n'ont pour moyen d'union entre les surfaces qu'une membrane muqueuse, la palatine. Voilà pourquoi, dans les engorgemens de cette membrane, dans les affections scorbutiques, à la suite de l'usage du mercure, etc., les dents deviennent vacillantes, etc.

Union des Articulations mobiles.

Les articulations mobiles à surfaces contiguës ont spécialement pour moyen d'union les *ligamens*, que l'on rencontre dans les cinq genres, mais sous des formes différentes, qui seront par la suite examinées. Ce genre d'organes réunit à beaucoup de souplesse une grande résistance, double attribut qu'il doit à sa texture particulière, et qui le rend très-propre à cette fonction. Remarquons cependant que ces deux propriétés sont en raison inverse dans les deux âges extrêmes de la vie, que la souplesse est l'apanage de l'enfant, que la raideur, la résistance sont le caractère des ligamens des vieillards. De là en partie la multiplicité des mouvemens dans un âge, leur lenteur et leur difficulté dans l'autre.

Les cartilages ne sont point dans cet ordre articulaire, comme dans les précédens, moyens d'union, mais moyens de mouvemens par leurs surfaces lisses et polies.

Quant à la membrane synoviale, qui se rencontre exclusivement dans cet ordre, telle est son extrême ténuité, qu'elle peut à peine être considérée comme unissant les surfaces, et que son usage paraît être borné à l'exhalation de la synovie.

Il n'en est pas de même des muscles : ils peuvent être en même temps considérés, autour des articulations mobiles, comme des puissances pour la totalité de l'os, et comme des résistances pour ses extrémités, qu'ils empêchent de se déplacer, en formant autour d'elles des appuis dont l'efficacité est proportionnée aux efforts que font ces extrémités pour se déplacer. En effet, c'est dans les grands mouvemens que ces efforts sont le plus considérables; or, alors les muscles voisins de l'articulation, fortement contractés, durs dans leurs contractions, bornent puissamment la tendance de l'extrémité osseuse à abandonner celle qui lui correspond. Dans le repos, où les muscles relâchés offrent peu de résistance, l'effort à soutenir est nul. Un membre paralysé se luxerait bien plus facilement qu'un autre par l'influence des violences extérieures.

L'ordre des articulations mobiles à surfaces contiguës a pour moyen d'union une substance dont la nature est moyenne à celle des ligamens et à celle des cartilages.

ARTICLE V.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME OSSEUX.

Il n'est point de système dont les anatomistes

aient suivi d'une manière plus rigoureuse les états divers, aux divers âges de la vie. La remarquable différence d'un os considéré dans les premiers mois, où la gélatine seule le compose presque, d'avec un os examiné chez l'adulte, où la substance calcaire est prédominante, a spécialement fixé leur attention sur ce point.

Examinons les phénomènes de l'ossification dans tous les âges. Ces phénomènes peuvent être considérés pendant et après l'accroissement. En général, tant qu'il dure, il y a quelques portions non ossifiées dans le système osseux, comme le col du fémur par exemple : l'ossification n'est bien complète, les os ne sont bien développés que vers l'âge de seize à dix-huit ans, quelquefois même plus tard.

§ Ier. *État du Système osseux pendant l'accroissement.*

On distingue communément trois états dans le développement des os, savoir, l'état muqueux, l'état cartilagineux et l'état osseux (1).

1°. *État muqueux.*

L'état muqueux peut se concevoir à deux époques : 1° dans les premiers jours du développement de

(1) Cette évolution des os peut être regardée comme un des faits les plus beaux que l'on puisse citer en faveur de la loi de métamorphose des organes. Les pièces du squelette, en effet, par-

l'embryon, époque à laquelle la totalité de ses organes ne forme qu'une masse homogène et muqueuse, où il n'est possible de distinguer aucune ligne de démarcation, et où les parenchymes de nutrition existent seuls. Tous les organes sont de même nature alors : l'os est en effet *muqueux* comme tous les autres organes, si par ce mot on entend un état où le tissu cellulaire, existant seul avec les vaisseaux et les nerfs, est pénétré d'une si grande quantité de sucs qu'il a la forme d'un mucilage et en donne l'apparence à l'embryon. 2°. On peut entendre par *état muqueux* cette époque plus avancée de la nutrition osseuse, où les os se distinguent déjà, où ils se dessinent à travers la transparence que

---

courent visiblement, avant d'arriver à l'état de complet développement, une suite de phases qui, transitoires chez l'homme, sont des états permanens, au contraire, dans certains degrés inférieurs de l'échelle des êtres. A l'état muqueux, le squelette de l'embryon humain rappelle celui de certaines lamproies ; à l'état cartilagineux, il est l'analogue de celui d'une classe nombreuse de poissons ; enfin, à l'état calcaire, il a atteint le degré qui caractérise cette partie de l'organisme dans les animaux qui occupent le faîte de la grande échelle des êtres. Ces états se succèdent avec plus ou moins de rapidité : Dans quelques os, l'état cartilagineux dure peu, de façon que l'on croirait au premier abord qu'il a manqué, et qu'il y a eu passage sans intermédiaire de l'état muqueux à l'état calcaire ; mais avec un peu de soin, on peut constater encore ici que les trois états se sont montrés successivement. C'est à tort, à mon avis, que Béclard a signalé les os du crâne et le centre des os longs, comme ne présentant pas de période cartilagineuse dans leur développement.

(F. Blandin.)

conservent les autres parties du membre, où ils ont déjà une consistance bien supérieure à celle de ce qui les entoure. Or, cet état n'est que le commencement de celui de *cartilage;* car le parenchyme de nutrition prend le caractère cartilagineux dès qu'il commence à se pénétrer de gélatine, et il se pénètre en effet de cette substance dès qu'il prend plus de consistance, puisque c'est elle qui lui donne cette consistance, et par là même une existence distincte des parties environnantes. Si, dans les premiers temps, ce cartilage est plus mou, s'il s'affaisse sous les doigts qui le compriment, si même il a une apparence en partie muqueuse, c'est que la gélatine n'y est pas encore en assez grande proportion, et que le parenchyme nutritif la domine encore : à mesure qu'on avance, sa quantité augmente ; et par là même la nature cartilagineuse se développe plus évidemment.

Il suit de là que les os ont trois périodes dans leur développement : l'une leur est commune avec tous les autres organes : c'est la période muqueuse ; les deux autres les caractérisent spécialement : ce sont les périodes cartilagineuse et osseuse. Examinons-en les phénomènes.

2°. *État cartilagineux.*

Tous les os sont cartilagineux avant de prendre leur dernière forme. Cet état de cartilage commence à une époque qu'il est difficile de déterminer : c'est lorsque, d'une part, le système circulatoire commence à charrier de la gélatine et à la présenter aux

organes, et que, d'une autre part, la sensibilité organique du parenchyme de nutrition des os s'est mise en rapport avec cette substance. Alors la consistance de l'os va toujours en croissant, parce que la gélatine va en s'y accumulant: or, elle s'y accumule dans le même sens que dans la suite doit affecter le phosphate calcaire; c'est-à-dire que dans les os longs c'est au milieu du corps, que dans les os plats c'est au centre, et que dans les os courts c'est au centre aussi que s'exhale d'abord cette substance, laquelle se porte ensuite successivement et de proche en proche aux extrémités des premiers, à la circonférence des seconds, et à la surface des troisièmes. J'observe cependant que l'on ne voit point, pendant la formation des os cartilagineux, ces stries longitudinales dans les os longs, rayonnées dans les plats, irrégulièrement entrecroisées dans les courts, qui distinguent l'état osseux dans sa formation, et qui semblent indiquer à l'œil le trajet du phosphate calcaire.

L'état cartilagineux présente une particularité qui le distingue de l'état osseux: c'est que tous les os unis par la suite au moyen des cartilages, tels que ceux du crâne, de la face, de la colonne vertébrale, du bassin, ne font qu'une seule et même pièce (1); tandis que tous ceux qui ne doivent tenir

---

(1) Sans doute, à l'aide des cartilages des sutures, les cartilages d'origine des pièces du crâne sont continus les uns aux autres; sans doute, à l'aide des substances inter-vertébrales, la même disposition existe pour les cartilages d'origine des corps vertébraux; mais est-il bien démontré que ces cartilages, qui servent

que par des ligamens, dont l'articulation est mobile par conséquent, se trouvent très-distincts, comme le fémur, le tibia, la clavicule, etc., etc.

Les os larges, ceux du crâne spécialement, n'offrent pas d'une manière aussi distincte l'état cartilagineux : leur apparence, à cette période de l'ossification, est même plutôt membraneuse. Voici à quoi cela tient : comme ils se trouvent interposés entre le périoste et la dure-mère, et que leur té-

---

de moules aux os, ne soient pas eux-mêmes formés, dans les premiers temps, de plusieurs pièces aussi distinctes que le sont les divers noyaux primitifs d'ossification? Je ne le pense pas. Il me paraît probable, au contraire (et c'était l'opinion particulière de Béclard), que l'état cartilagineux commence par des parties d'abord isolées, mais promptement réunies, et dont la disposition est le plus ordinairement, mais non d'une manière nécessaire, analogue à celle des premiers linéamens d'ossification. Ce fait cadre parfaitement, au reste, avec tout ce que l'on sait de l'évolution des organes, et même de celle de l'organisme tout entier, travail dans lequel la nature procède par des formations circonscrites dans des points très-limités, qui constituent autant de centres, desquels s'irradie en quelque sorte la matière organique, jusqu'à ce que, la fusion s'étant opérée, l'organe ou tout le système ne forme plus qu'une seule pièce. S'il est établi que l'état cartilagineux commence par des points isolés, on peut rapporter aisément à un simple arrêt de développement, ce que l'on voit arriver chez certains fœtus monstrueux, dont le sternum est bifide dans toute son étendue. Cet état doit avoir une origine plus éloignée que l'état calcaire de l'os indiqué, car les pièces les plus élevées qui forment celui-ci s'ossifient par des points médians et impairs. Toutefois, pour que la question fût tout-à-fait résolue, il faudrait montrer que l'état cartilagineux commence dans le sternum par des points latéraux. (F. Blandin.)

nuité est extrême, on ne peut que difficilement les distinguer à l'intérieur de ces deux membranes, mais lorsqu'on dissèque les parties avec attention, on peut distinguer de cette double enveloppe l'os encore mou.

L'état cartilagineux paraît dans la clavicule, l'omoplate, les côtes, avant d'être distinct dans les autres os, où il se manifeste ensuite. Lorsqu'on examine les os en cet état, on les trouve de consistance et de solidité différentes : là où l'exhalation de la gélatine a commencé, ils sont incomplétement cartilagineux ; à mesure qu'on s'éloigne de ce point, ils participent encore plus ou moins à l'état muqueux. L'os cartilagineux n'a point de cavité interne, point de système médullaire, etc. (1).

3°. *État osseux.*

Lorsque tout l'os est cartilagineux, et même que quelques points y paraissent encore muqueux, l'exhalation de la substance calcaire commence, et par là même l'état osseux se manifeste. Voici comment : l'os devient alors plus dense, puis d'une couleur plus foncée, enfin d'un jaune très-sensible dans

---

(1) L'état cartilagineux lui-même offre des degrés : d'abord, le cartilage est mou, il devient ensuite ferme, et présente une couleur d'un blanc nacré resplendissant ; plus tard, enfin, il prend successivement les teintes *blanc mat* et *jaunâtre ;* dès cette dernière époque, on commence à voir s'y développer des vaisseaux et des cavités, et bientôt aussi commence l'état osseux.

(F. Blandin.)

son milieu, c'est-à-dire là où doit commencer l'ossification : peu à peu un point rougeâtre s'y développe; ce sont les vaisseaux qui commencent à recevoir la portion rouge du sang et non à s'y développer, comme le prétendent certains anatomistes, à y être creusés, suivant leur expression, par la force d'impulsion du cœur. Ils préexistent toujours : les sucs blancs les pénétraient seuls auparavant; alors les globules rouges y sont aussi admis. En même temps les parties voisines s'encroûtent de substance calcaire. Cette période est donc remarquable par deux choses, savoir, par l'abord du sang dans les os cartilagineux, et par l'exhalation du phosphate de chaux. En général, ces deux phénomènes sont toujours inséparables; dès qu'il y a rougeur dans une partie des cartilages, il y a aussi des points osseux : cela s'observe non-seulement dans l'ossification ordinaire, mais encore dans celles qui ne sont pas dans les lois communes, telles que les ossifications des cartilages du larynx, des côtes, etc. Lorsqu'on examine les progrès de l'exhalation de la substance terreuse, on voit toujours dans les os, soit longs, soit plats, soit courts, une couche vasculaire très-rouge, intermédiaire au cartilage et à la portion des os ossifiée. Cette couche semble servir de précurseur à l'état osseux. Pourquoi les vaisseaux des os, qui jusque là n'admettaient que des sucs blancs, reçoivent-ils alors des globules rouges? Ce n'est pas, comme Boerhaave l'aurait dit, s'il se fût occupé de l'ossification, parce que leur calibre augmente, mais bien parce que la somme de leur sensibilité organique s'accrois-

sant, ils se trouvent alors en rapport avec la portion rouge, qui jusque là leur était étrangère. Leur calibre serait triple, quadruple du diamètre des globules rouges, que ceux-ci ne s'y engageraient pas si le mode de sensibilité organique les repoussait, comme le larynx se soulève contre un corps qui tente de s'y engager, quoique ce corps soit infiniment moindre que la glotte. C'est par un accroissement de sensibilité organique, qu'il faut aussi expliquer comment l'os, jusque là étranger à la substance calcaire, ne se trouvant en rapport qu'avec la gélatine, s'approprie aussi la première de ces substances, et s'en pénètre avec facilité.

J'observerai seulement qu'il y a cette différence entre l'exhalation de l'une et de l'autre, que la première vient toujours immédiatement de la portion rouge du sang, puisque, partout où elle se dépose, il y a, comme je l'ai dit, des vaisseaux sanguins; tandis que la seconde paraît immédiatement provenir des fluides blancs, puisque les vaisseaux des tendons, des cartilages, et des autres parties qui s'en nourrissent, ne reçoivent sensiblement dans leur état naturel aucun globule rouge, et que tout ce qui y circule paraît blanc.

L'état osseux commence avec la fin du premier mois, pour la clavicule, les côtes, etc.; il est un peu plus tardif dans les autres os : on ignore du reste son époque précise. Voici sa marche dans les trois espèces d'os (1).

---

(1) Duhamel, J. Hunter, Nesbith, Reichel, Senff, et beau-

Progrès de l'état osseux dans les os longs.

On distingue d'abord au milieu de ces os un petit cylindre osseux, très-mince dans son centre, s'élargissant en s'avançant vers les extrémités, creux dans son intérieur pour les rudimens du système

---

coup d'autres, ont fait connaître une foule de faits intéressans qui doivent trouvêr ici leur place. Il ne sera question que du développement naturel des os : l'accidentel rentre dans l'anatomie pathologique.

L'état osseux commence à peu près vers l'époque qu'indique Bichat. Senff en a trouvé les premiers rudimens à quarante jours. Des embryons de trente jours ou environ m'ont déjà offert quelques points osseux. La clavicule, les mâchoires, se montrent en premier lieu; puis successivement et à quelques jours d'intervalle, l'humérus et le fémur, les os de la jambe et ceux de l'avant-bras, les côtes, les vertèbres, les os du crâne, etc. Le sternum, les os wormiens, la rotule, les os du carpe, sont les derniers à s'ossifier. Cet ordre n'est, comme on le voit, assujetti à aucune règle : aussi toutes celles qu'on a voulu établir sont-elles fausses, pour la plupart, dans leur application. La seule qui ait quelque fondement réel, c'est que les os longs précèdent en général les larges dans leur développement, encore y a-t-il des exceptions. Mais quant à l'influence que certains auteurs ont accordée sous ce rapport au voisinage du cœur et à celui du système nerveux, quant à ce que d'autres disent du développement plus ou moins précoce des os suivant le degré d'importance de leurs fonctions chez l'homme, ou, comme le pensent quelques-uns, suivant leur liaison plus ou moins intime avec les phénomènes de la vie dans les différentes classes d'animaux, rien de tout cela n'est fondé sur l'observation.

Il se passe de grands changemens dans un cartilage qui se convertit en os. Des conduits vasculaires, qu'on ne pouvait y aper-

médullaire, percé du trou nourricier, dont la proportion de grandeur est alors très-manifeste, recevant aussi un très-gros vaisseau. Ce cylindre osseux, d'abord très-mince en comparaison des extré-

---

cevoir avant, s'y développent. Incolores dans le principe, et irrégulièrement disposés, ils sont plus tard ramifiés à la manière des artères, et traversés par le sang. La couleur de ce fluide s'y manifeste par degrés : ces conduits ne paraissent point pourtant le contenir directement ; les vaisseaux du cartilage injectés semblent plutôt tapisser simplement leurs parois, cette sorte de membrane vasculaire qui les revêt a même été regardée comme propre à sécréter la substance osseuse. On voit très-bien ces conduits dans les os courts et aux extrémités des os longs. Le point osseux, dont le développement suit de près celui des vaisseaux, n'est d'abord qu'une réunion de filamens d'une extrême ténuité, qu'il est facile d'isoler en faisant brûler le cartilage : on obtient alors une espèce de flocon formé par la matière calcaire. A mesure que l'ossification fait des progrès, les canaux vasculaires s'effacent : on n'en trouve plus de traces aussitôt que les épiphyses sont soudées.

L'action des vaisseaux sanguins est donc augmentée dans l'ossification des cartilages. Mais ces derniers n'éprouvent-ils d'autre changement dans leur tissu que celui qui résulte de la déposition d'une substance terreuse? ou bien la matière organique est-elle aussi renouvelée, comme quelques auteurs l'ont pensé? Il faut en effet que le cartilage subisse une transmutation bien grande, s'il ne disparaît pas entièrement, pour devenir os; car il ne contient presque, comme nous le verrons plus tard, que de l'eau, du tissu cellulaire et de l'albumine, tandis que les os sont formés d'un tissu fibreux joint à une matière saline. Il y a donc une très-grande différence entre la composition du premier et celle des seconds, et on ne peut pas dire que les os soient simplement des cartilages, plus de la matière calcaire. Quels que soient les matériaux de l'ossification, ce sont les ar-

mités cartilagineuses de l'os, offre avec elles une disproportion manifeste sous ce rapport, est formé de fibres très-déliées, grossit et s'allonge peu à peu, s'avance enfin jusque près des extrémités, où il est parvenu à l'époque de la naissance; alors la plupart de ces extrémités ne sont point encore osseuses. Quelque temps après, et à une époque qui varie pour les différens os, il se développe dans ces extrémités un point osseux, qui commence au centre et qui est toujours précédé par le passage du sang dans les vaisseaux. Ces germes nouveaux croissent aux dépens du cartilage, qui se rétrécit peu à peu entre le corps de l'os et l'extrémité : au bout d'un certain temps, il ne reste plus qu'une cloison légère que l'ossification envahit aussi; en sorte qu'alors l'os est tout osseux, d'une extrémité à l'autre. Les points secondaires qui se sont développés dans les diverses apophyses se réunissent également; en sorte que sa substance est partout homogène. Ce

---

tères qui les apportent et qui les versent, soit par des extrémités exhalantes, comme le veut Bichat, soit par des porosités latérales, suivant l'opinion de Walter. Ces vaisseaux ne jouent point le rôle que leur attribuaient Nesbith, Reichel, W. Hunter, de donner lieu par leur ossification à celle du cartilage. Les lignes régulières que présentent les os dans leur développement, et qui en ont imposé à ces anatomistes, ne suivent nullement le trajet des vaisseaux sanguins. On sera encore moins tenté d'admettre l'hypothèse de Mascagni, qui, regardant les cartilages comme entièrement formés de vaisseaux lymphatiques, suppose que dans leur ossification ces vaisseaux ne font que s'emplir de matière calcaire. (Béclard.)

n'est guère qu'à l'époque de seize à dix-huit ans que la nature a complétement achevé ce travail (1).

Progrès de l'état osseux dans les os larges.

Le mode d'origine de l'ossification varie dans cette espèce d'os. Ceux qui sont symétriques ont toujours deux points, ou davantage, qui se correspondent sur chaque côté de la ligne médiane; en quelques circonstances un d'eux se trouve sur cette ligne. Toujours, lorsque ces points d'ossification sont en nombre pair, ils se trouvent sur les côtés : l'un d'eux est sur la ligne, s'ils sont en nombre impair.

Les os irréguliers n'en ont quelquefois qu'un, comme les pariétaux; d'autres fois plusieurs y paraissent, comme dans les temporaux; mais jamais

---

(1) Dans les os longs, le premier point osseux se manifeste du quarantième au soixantième jour, un peu plus tôt pour la clavicule. Le petit cylindre qu'il représente est alors la seule partie solide de l'os ; tout le reste est encore muqueux. Ce n'est que du soixantième au soixante-dixième jour que naissent les cartilages des extrémités. Quand ces derniers s'ossifient, ce qui n'arrive que beaucoup plus tard, il se forme entre elles et le corps de l'os des conduits vasculaires semblables à ceux qui occupent leur intérieur. Il y a donc cette remarquable différence entre le corps des os longs et les extrémités de ces mêmes os, qu'on ne distingue point de cartilage pour le premier comme pour les secondes. Au milieu, le tissu osseux semble formé de toutes pièces à la face interne du périoste ; ce tissu est manifestement cartilagineux dans le principe, à chaque extrémité. (Béclard.)

ils n'affectent alors de disposition parallèle entre eux : seulement ils correspondent à ceux de l'os opposé.

Là où le premier point d'ossification survient dans un os large, on aperçoit d'abord des points rougeâtres, puis on voit le phosphate calcaire se répandre en rayonnant du centre à la circonférence de l'os. Les rayons osseux sont très-sensibles sur les os du crâne. Des portions non ossifiées remplissent d'abord leurs intervalles, que complètent ensuite de nouveaux rayons. Tous se terminent d'une manière inégale, sans se toucher, de manière qu'en isolant alors de la portion membraneuse à laquelle elle tient, une portion ossifiée d'un os large, sa circonférence paraît découpée comme l'extrémité d'un peigne : de là, comme nous le verrons, l'origine des sutures.

La ténuité de ces os est extrême dans les premiers temps ; ils n'ont point encore de tissu celluleux. A la naissance, peu de centres osseux s'y sont encore réunis ; des espaces cartilagineux et membraneux les séparent : ces espaces sont plus grands au niveau des angles qu'au niveau des bords, et, en général, dans les points les plus éloignés des centres osseux primitifs. Les os à plusieurs points d'ossification sont formés de pièces isolées, plus ou moins distantes les unes des autres : ceux à un seul point n'en ont qu'une.

Après la naissance, ces os s'étendent de plus en plus ; leur épaisseur et leur dureté augmentent ; ils se divisent en deux lames compactes, dont le tissu celluleux remplit le milieu ; peu à peu ils se tou-

chent par leurs bords, et alors les sutures se forment au crâne; car il y a cette différence entre leur ossification et celle des os longs, qu'elle se fait toujours du centre à la circonférence, et que de nouveaux points osseux ne se développent pas dans celle-ci pour venir à la rencontre des premiers. Quand cela arrive, alors la réunion ne se fait point comme aux os longs, mais des sutures se forment; et c'est ce qui constitue les os wormiens, qui sont d'autant plus larges que le point osseux s'est plus tôt développé, parce qu'il a eu le temps de s'étendre davantage avant de rencontrer l'ossification générale de l'os.

Lorsqu'un os plat se développe par plusieurs points, et que sur sa surface existe une surface articulaire, elle est ordinairement le centre où tous les points viennent se réunir à l'époque où l'ossification se termine; on le voit dans la cavité cotyloïde, dans le condyle de l'occipital, etc.

Souvent il est, dans les os plats, deux périodes bien marquées pour leur ossification: c'est dans ceux qui, comme le sacrum, le sternum, se développent par un grand nombre de points. Ces points commencent d'abord à se réunir en trois ou quatre pièces principales qui divisent l'os: c'est la première période; puis, à une époque beaucoup plus avancée, la réunion de ces pièces entre elles s'opère: c'est la seconde période (1).

---

(1) L'ossification des os larges du crâne commence vers deux mois et demi. Les points osseux sont d'abord disséminés dans

Progrès de l'état osseux dans les os courts.

Les os courts restent, en général, plus longtemps cartilagineux que les autres. Souvent, à la naissance, plusieurs le sont encore, ceux du tarse et du carpe en particulier. Le corps des vertèbres s'ossifie plus tôt : un point se développe au centre, et s'étend à toute la surface.

Ces phénomènes sont à peu près analogues à ceux de l'ossification des extrémités des os longs, auxquelles les os courts ressemblent si fort. Après la naissance, toute la portion cartilagineuse est, pour ainsi dire, envahie par la substance calcaire qui se mêle à elle, et il ne reste enfin que les cartilages articulaires.

Il est des os qui, comme l'occipital, le sphénoïde, participent au caractère des os larges et des os courts; leur ossification est mixte, et suit le mode des uns ou des autres, suivant la partie de l'os où on l'examine.

---

la substance muqueuse épaissie qui représente l'os à cette époque. Ils se réunissent ensuite et prennent la forme de réseaux irréguliers : ce n'est que plus tard qu'ils ont celle de rayons osseux encore recouverts de substance muqueuse par leurs deux surfaces. Ces rayons disparaissent quand les deux lames compactes se produisent ; ils se transforment en tissu celluleux. (Béclard.)

§ II. *État du Système osseux après son accroissement.*

Les os, devenus complètement osseux, continuent à éprouver divers phénomènes que les anatomistes ont trop négligés. L'accroissement général en hauteur est fini lorsque l'ossification est achevée; et même il paraît que le terme de tous deux est à peu près le même (1). Mais celui en épaisseur continue encore long-temps : comparez le corps

---

(1) L'accroissement en longueur des os longs se fait près de leurs extrémités; leur partie moyenne n'y est pour rien. Une expérience le prouve; elle est due à J. Hunter : si l'on perfore un de ces os dans son corps en deux endroits différens, et qu'on tue l'animal quelque temps après, les deux ouvertures sont encore à la même distance l'une de l'autre, quoique l'os ait augmenté de longueur. Elles devraient, au contraire, s'éloigner si l'accroissement se faisait dans toute l'étendue de ce dernier. Un autre fait confirme celui-ci : dans les expériences avec la garance, la coloration n'a lieu, sur les jeunes animaux, que dans l'intervalle qui sépare chaque extrémité du corps de l'os; le reste n'est rouge qu'à la surface, à moins que l'animal n'ait été nourri pendant très-long-temps avec cette substance. Tant qu'une lame cartilagineuse subsiste entre le corps et l'extrémité, on conçoit que l'accroissement doit se faire aux dépens de ce cartilage. Mais lorsqu'une fois il est envahi, il faut admettre une déposition de substance osseuse dans cet endroit, précédée tout au plus de l'état muqueux. L'accroissement en longueur ne cesse que quand les épiphyses sont soudées au corps de l'os, ce qui arrive vers l'époque de vingt-un ans. Une lame mince de substance compacte est d'abord interposée entre le corps et l'extrémité; elle s'efface à la longue, et la continuité devient parfaite. (Béclard.)

grêle et mince d'un jeune homme de dix-huit ans, au corps épais et bien proportionné d'un homme de quarante, et vous verrez la différence. Les os suivent la loi générale : leur nutrition se prolonge suivant l'épaisseur, lorsque celle suivant le sens longitudinal ne se fait plus (1). Il paraît qu'alors les vaisseaux qui pénètrent par les trous du premier et du second ordres ne fournissent guère plus à

(1) Les trois espèces d'os croissent en épaisseur bien au-delà du terme de l'accroissement en longueur, comme il a déjà été dit. De nouvelles couches s'ajoutent sans cesse à leur surface, comme le montre la coloration de cette surface par l'usage, même peu prolongé, de la garance. Si l'ingestion de cette substance a été cessée et reprise alternativement, les couches extérieures de l'os sont alternativement rouges et blanches ; d'où il faut conclure qu'elles s'étaient formées pendant le temps même qu'a duré l'expérience. La substance osseuse se produit là comme dans le cas précédent, sans cartilage préexistant, et peut-être en passant par l'état muqueux : mais il n'y a pas de déposition interstitielle, comme dans la nutrition ordinaire ; c'est plutôt une sorte de juxta-position. Cela n'empêche pas que la nutrition ne s'exerce dans les os de même que dans les autres parties. L'usage assez long-temps continué de la garance, de manière à obtenir l'effet indiqué par Bichat, en est la preuve. Il est aussi des cas d'accroissement accidentel, soit en longueur, soit en épaisseur, qui paraissent tenir à un véritable excès de nutrition.

En même temps que les os croissent à l'extérieur, leurs cavités intérieures s'agrandissent ; ce qui fait que, dans les os longs, les parois du canal médullaire restent, à peu de chose près, dans la même proportion d'épaisseur, tant que leur accroissement en dehors et leur amincissement en dedans se font mutuellement équilibre : l'os gagne d'un côté ce qu'il perd de l'autre. Il n'en pas de même chez le vieillard ; l'accroissement en épaisseur

cette nutrition, qui puise spécialement ses matériaux dans ceux du troisième: or, comme on sait que ces vaisseaux, très-superficiels, s'arrêtent dans les fibres extérieures de l'os, et ne pénètrent point au-dedans, on conçoit, 1° comment, l'accroissement se faisant en dehors, l'os augmente en épaisseur; 2° comment cette augmentation porte spécialement sur le tissu compacte, dont l'épaisseur proportionnelle est en raison directe de l'âge, comme il est facile de s'en assurer par l'inspection comparée des différens os d'enfant, d'adulte et de vieillard.

Cet accroissement extérieur a fait croire que le périoste y concourait spécialement par l'ossification de ses lames; mais nous verrons à l'article de cette membrane ce qu'on doit penser sur ce point.

C'est principalement à cette époque, où le travail de la nutrition semble disséminé à la surface osseuse, que les éminences diverses dont cette surface est parsemée se prononcent davantage: alors surtout toutes les apophyses d'insertion deviennent plus saillantes. Il y a, sous le rapport de ces éminences, une différence remarquable entre le squelette de l'enfant et celui de l'homme fait. Dans le fœtus, à peine existent-elles, comme on le voit spécialement par les apophyses diverses des ver-

---

ne se faisant plus, la dilatation intérieure continue; il en résulte un amincissement extrême dans les parois de la cavité médullaire. Cette cause est une de celles qui rendent les os des vieillards si fragiles. (BÉCLARD.)

tèbres, par les épineuses en particulier. Comme ces éminences sont, en général, les parties les plus éloignées des centres osseux primitifs, il paraît que c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer la lenteur de leur formation, puisque l'ossification se fait toujours des points où elle a commencé aux points les plus éloignés.

Lorsque l'os a toutes ses dimensions, il continue toujours à être le siége d'une nutrition très-active: sans cesse l'exhalation y apporte les substances gélatineuse et calcaire, que reprend ensuite l'absorption; en sorte qu'il est sans cesse composé et recomposé. L'expérience de la garance prouve cette assertion d'une manière manifeste: si l'on nourrit quelque temps un animal avec cette plante, tous ses os rougissent d'autant plus facilement qu'il est plus jeune; en sorte qu'en lui amputant un membre au bout de quelque temps, ses os ont une apparence toute différente de celle qui leur est naturelle: si, après cette amputation, on discontinue l'usage de la garance pendant un certain temps, et qu'on ampute ensuite un autre membre, les os ont entièrement repris leur couleur habituelle: or, on sait que la substance calcaire est le véhicule de la substance colorante, puisque, tant que les os ne sont que cartilagineux, l'effet de la garance est absolument nul sur eux. La substance calcaire est donc alternativement fournie et enlevée aux os. D'ailleurs, la formation et la résolution des exostoses, le ramollissement et la friabilité des os, les phénomènes de la production du cal, etc., ne sont-ils pas aussi la preuve sensible de cette succession

d'exhalation et d'absorption de ce principe? Il paraît manifeste que le système urinaire est la voie par laquelle la nature se débarrasse de la substance calcaire, et même de la gélatineuse. Il serait curieux de bien analyser l'urine des rachitiques, et celle des malades attaqués du cancer: il est probable que la première de ces substances domine dans l'urine des premiers, et la seconde dans celle des autres : je ne connais là-dessus rien de bien positif en expériences.

Peut-on, en donnant aux malades ou de la gélatine ou du phosphate calcaire, rendre à leurs os ou la souplesse ou la solidité qu'ils ont perdue? Non, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'introduire ces substances dans l'économie, mais encore de rendre aux os le mode de sensibilité organique qu'ils n'ont plus, et qui, les mettant en rapport avec elles, fait qu'ils se les approprient pour s'en nourrir. Le sang serait surchargé de principes terreux et gélatineux, que les os repousseront ces principes, tant que leur mode de sensibilité ne sera pas en rapport avec eux.

Le double mouvement de nutrition continue toujours dans les os, à mesure qu'on avance en âge; mais ses proportions changent: la gélatine va toujours en y diminuant, et la substance calcaire en y augmentant. Enfin, dans l'extrême vieillesse, cette dernière y domine tellement, qu'elle y étoufferait la vie, si la mort générale ne prévenait celle des os.

C'est à cela qu'il faut attribuer la couleur grisâtre que prennent alors ces organes; de là encore

leur pesanteur toujours croissante; de là, par conséquent, la difficulté des mouvemens des membres, puisqu'en même temps que la force des puissances musculaires diminue par l'âge, la résistance osseuse qu'elles ont à vaincre augmente (1).

A cette époque de la vie, la substance calcaire domine tellement dans l'économie, qu'elle se jette sur différens organes, tels que les artères, les cartilages, les tendons, qui alors prennent le caractère osseux. On dirait qu'en accumulant dans nos parties cette substance étrangère à la vie, la nature veut insensiblement les préparer à la mort.

En général, ce sont les organes dont la substance nutritive habituelle est la gélatine qui ont le plus

---

(1) Il se fait encore, chez le vieillard, quelques changemens importans dans le système osseux. Les os larges diminuent en général d'épaisseur. Leur tissu celluleux disparaît et les deux lames de substance compacte qu'il tenait écartées s'adossent : c'est ce qu'on voit souvent aux bosses pariétales, où cela est d'autant plus frappant que la saillie de ces bosses est alors remplacée par une dépression. Quelquefois les os larges semblent avoir augmenté de volume, parce que leur tissu est, pour ainsi dire, raréfié; des lames minces qui le traversent lui donnent cette apparence. Dans les os courts la substance compacte extérieure diminue; les aréoles du tissu spongieux sont au contraire plus marquées. Les os longs, outre qu'ils perdent de leur épaisseur, semblent aussi éprouver un raccourcissement réel. Enfin, le changement de composition qui arrive dans le tissu osseux lui ôte beaucoup de son élasticité. Les os des jeunes sujets sont flexibles jusqu'à un certain point : on voit à cet âge les os longs se plier, les os larges s'enfoncer dans diverses circonstances. Les mêmes causes produiraient fracture chez un adulte, et, à plus forte raison, chez le vieillard. (Béclard.)

de tendance à se mettre en rapport avec la substance calcaire, et par conséquent à s'en encroûter. Voilà pourquoi les cartilages s'ossifient plus particulièrement; pourquoi, ceux des sutures disparaissant, les os du crâne deviennent continus; pourquoi le larynx est enfin tout osseux; pourquoi les cartilages des côtes sont souvent aussi solides que les côtes elles-mêmes; pourquoi souvent plusieurs vertèbres unies entre elles forment alors une masse continue plus ou moins considérable. Je remarque cependant que les artères, qui ont tant de tendance à l'ossification, ne sont pas si manifestement gélatineuses que bien d'autres substances qui s'ossifient beaucoup moins facilement, que les tendons, par exemple.

§ III. *Phénomènes particuliers du développement du Cal.*

Rien de plus facile, d'après ce qui a été dit jusqu'ici sur la nutrition osseuse, que de concevoir la formation du cal. On sait qu'elle présente trois périodes : 1° le développement des bourgeons charnus, 2° leur transformation en cartilage, 3° le changement de ce cartilage en os. Ce triple phénomène se passe dans un espace de temps qui varie suivant l'âge, le mode de fracture, l'espèce d'os, etc., mais qui, en général, est plus long que celui des autres cicatrices (1).

---

(1) Dans la formation du cal, véritable cicatrice osseuse, il y a production d'une portion de tissu osseux qui forme le

Le développement des bourgeons charnus est un phénomène commun à toute espèce d'organe qui a éprouvé une solution de continuité, et dont les bords de la division ne sont pas en contact immédiat. Ici ces bourgeons naissent de toutes les parties de la surface divisée, du périoste, des tissus compacte et celluleux, de celui-ci spécialement. Ceux d'un côté s'unissent à celui du côté opposé. Jusque là la cicatrice osseuse ne diffère nullement de celle des autres parties. Cet état correspond à l'état muqueux de l'ossification naturelle. Comme les bourgeons charnus ne sont que l'extension du parenchyme nutritif, ils en ont les forces vitales; leur sensibilité organique suit les mêmes lois que dans la nutrition ordinaire; elle commence d'abord à se mettre en rapport avec la gélatine; celle-ci y est donc exhalée : alors commence l'état cartilagineux; alors la cicatrice osseuse prend un caractère

---

moyen d'union des deux parties séparées; cet os accidentel passe réellement par toutes les phases que parcourent les os dans leur formation régulière, depuis l'état muqueux jusqu'à l'état osseux complet. Sans entrer ici dans les détails propres à montrer l'inexactitude de la théorie du cal proposée par Bichat, et sans m'arrêter à établir, d'une part, que les bourgeons charnus ne naissent sur l'extrémité des fragmens d'un os fracturé que lorsque la solution de continuité est partagée par les chairs extérieures, et, d'autre part, que les bourgeons charnus ne s'ossifient point eux-mêmes, tandis que cela arrive seulement à la matière qu'ils sécrètent, qu'il me suffise de faire remarquer que tout ce travail s'accompagne d'une série de phénomènes fort intéressans, pour les détails desquels je renvoie à la note de Béclard placée plus bas, à l'article *Anatomie pathologique*. (F. Blandin.)

propre, et qui la distingue de celle des autres organes.

Au bout d'un temps plus long, la sensibilité organique s'accroît dans le parenchyme de cicatrisation que forment les bourgeons charnus : alors ceux-ci se trouvent en rapport avec la substance calcaire, qui arrive à l'os, et que jusque là ils repoussaient; ils l'admettent donc, ainsi que la portion rouge du sang, qui la précède toujours dans toute espèce d'ossification.

On voit par là que le cal est cellulaire et vasculaire dans la première période; que, dans la seconde, il contient du tissu cellulaire et des vaisseaux, plus de la gélatine; que, dans la troisième, il présente du tissu cellulaire, des vaisseaux, de la gélatine, plus de la substance calcaire.

Il n'a point les formes régulières de l'os sain, parce que, le parenchyme de cicatrisation naissant irrégulièrement sur les surfaces osseuses, l'exhalation et l'absorption de la gélatine ne peuvent se faire d'une manière précise et uniforme. Le cal est d'autant plus gros que les bouts ont resté plus écartés, parce que les bourgeons charnus, ayant eu plus d'espace à parcourir pour se rencontrer, se sont plus étendus, et par conséquent ont absorbé plus de substance nutritive.

Si le mouvement continuel des pièces fracturées empêche de l'un et l'autre côtés les bourgeons, ou, ce qui est la même chose, les deux parenchymes de cicatrisation de se réunir, alors, malgré l'exhalation des substances nutritives dans chacun d'eux,

l'os reste désuni; et de là les articulations contre nature.

Le cal est difficile quand les bouts divisés et mis à nu viennent à suppurer avec les parties voisines, comme il arrive dans les fractures compliquées, parce que la formation du pus dépense les substances nutritives destinées à réparer la fracture. Les considérations ultérieures sur cette production singulière appartiennent à la pathologie.

Je n'ai point exposé, dans ce chapitre, les idées des anciens, qui croyaient que les os se formaient par l'endurcissement d'un suc osseux dont rien ne démontre l'existence; celles de Haller, qui voyait le cœur se creusant des routes artérielles dans la substance osseuse, par voie d'impulsion, et durcissant cette substance par le battement des artères; celle de Duhamel, qui faisait tout dépendre du périoste. Je renvoie aux ouvrages divers qui ont mille fois exposé ces opinions.

Sans en réfuter aucune en particulier, je remarque qu'elles ont toutes un vice fondamental, celui de considérer la nutrition osseuse d'une manière isolée, de ne pas la présenter comme une division de la nutrition générale, d'admettre pour l'expliquer des raisonnemens uniquement applicables aux os, et qui ne dérivent point comme conséquences de ceux qui servent à établir la nutrition de tous les organes. Ne perdons jamais de vue ce principe essentiel et sur lequel reposent tous les phénomènes de l'économie, savoir, qu'à une multitude d'effets préside un très-petit nombre de causes. Défiez-vous de toute explication qui est partielle, tronquée, qui

circonscrit les ressources de la nature suivant les bornes de notre faible intelligence.

§ IV. *Phénomènes particuliers du développement des Dents* (1).

Les dents, différentes en partie par leur tissu des autres os, ont aussi un mode particulier de nutrition que nous allons examiner. Mais comme sa connaissance suppose celle de la structure générale des dents, il est bon d'exposer ici cette structure, en renvoyant leur description à l'examen des os de la face.

Organisation des Dents.

Les dents sont formées par deux substances, l'une extérieure, d'une nature particulière, et qu'on appelle l'*émail;* l'autre intérieure, qui en est comme la base, et dont la texture est la même que celle des autres os. De plus, elles ont une cavité moyenne qui renferme une substance spongieuse encore peu connue.

---

(1) J'ai déjà dit précédemment que les dents ne sont point des os, mais des productions muqueuses analogues aux ongles, aux poils, etc., et différentes des os par leur position à l'extérieur du corps, leurs connexions, leurs formes, leur structure, leur développement et leurs usages : cependant, comme Bichat les a examinées à l'occasion du système osseux, je placerai ici, et successivement, quelques notes qui me paraissent nécessaires.

(F. Blandin.)

Portion dure de la Dent.

L'émail de la dent ne se voit qu'autour de la couronne : plusieurs anatomistes prétendent qu'il se propage aussi un peu sur la racine, fondés sans doute sur l'extrême blancheur qu'a souvent cette racine dans certaines dents détachées, et qui fait qu'on ne distingue aucune ligne de démarcation. Mais alors une expérience très-simple établit cette démarcation : elle consiste à faire macérer la dent dans l'acide nitrique affaibli par une certaine quantité d'eau. Cet acide attaque aussitôt et la racine et la couronne, qu'il ramollit; mais l'une jaunit comme presque toutes les substances animales traitées par lui, tandis que l'autre garde sa couleur, devient même plus blanche. Cette expérience prouve aussi que leurs natures respectives diffèrent essentiellement.

L'émail, épais à la partie libre de la couronne, s'amincit à mesure qu'il s'approche de la racine, disposition que nécessite son usage, qui est de garantir la dent, et de supporter principalement les efforts de la mastication, lesquels se passent spécialement sur la partie libre de la couronne.

Cette substance, dure, compacte, surtout quand elle a resté long-temps à l'air, ne cédant qu'avec peine à l'action de la lime, est composée de fibres très-rapprochées, dont on ne peut suivre la direction. L'huile médullaire ne paraît pas la pénétrer; elle ne brûle point, mais s'éclate par l'action du feu, et se sépare ainsi de l'autre substance, qui,

exposée à la chaleur, noircit d'abord, puis brûle comme les autres os, et en répandant la même odeur.

L'émail est-il organisé, ou n'est-il qu'un suc qui, suintant d'abord de la surface externe de la dent, s'y endurcit ensuite et s'y concrète? Cette question ne me paraît pas facile à résoudre. L'émail a en effet des attributs qui semblent également favorables à ces deux opinions. D'un côté, il est sensible comme tout ce qui est organique; il nous donne bien plus manifestement que les cheveux et les ongles la sensation des corps qui le heurtent. Les acides affaiblis, ceux tirés des végétaux spécialement, exaltent tellement sa sensibilité, que le moindre contact devient très-douloureux long-temps après leur usage : les dents sont alors, comme on le dit, agacées. D'un autre côté, l'émail a une foule de caractères qui semblent y dénoter une absence d'organisation. 1°. Il ne s'enflamme point, ne devient le siége d'aucune tumeur, d'aucune altération qui ramollisse son tissu; il n'éprouve aucune altération qui, y exaltant la vie, la rende plus sensible que dans l'état naturel, comme il arrive par exemple aux cheveux, qui, ordinairement inertes, prennent une activité vitale très-énergique dans la plique polonaise. Souvent, en effet, nous jugeons de la vitalité des organes plus par leurs altérations morbifiques que par leur état naturel. 2°. Il paraît qu'il ne se fait point dans l'émail d'exhalation et d'absorption alternatives des matières nutritives, ou du moins sensiblement. Le frottement use cette substance sans qu'elle se répare de nouveau; cela est remarquable dans les vieillards,

dans les gens qui grincent souvent les dents. On sait qu'on lime l'émail comme un corps inorganique, et qu'il ne se reproduit point, tandis que les cheveux, les ongles croissent manifestement lorsqu'ils sont coupés. Limez l'extrémité sciée d'un os long dans une amputation; bientôt les bourgeons charnus naîtront de la surface limée; l'action de l'instrument sera un aiguillon qui y développera les phénomènes vitaux.

La portion osseuse de la dent en compose toute la racine et le dedans de la couronne; elle n'est formée que par du tissu compacte, très-dense, très-analogne à celui du rocher. Le tissu celluleux lui est étranger. Les fibres, très-serrées les unes contre les autres, ont des directions variées, difficiles à saisir, mais qui, en général, suivent le même sens que les racines; il faut, pour bien voir cette direction, faire ramollir les dents dans un acide.

Chaque dent présente une cavité située dans la couronne, de même forme qu'elle, diminuant toujours de diamètre à mesure que l'on avance en âge, communiquant en dehors par de petits conduits dont le nombre égale celui des racines distinctes de la dent, et qui s'ouvrent au sommet de ces racines. Cette cavité est tapissée d'une membrane très-mince où se ramifient les vaisseaux, et qui par sa face opposée revêt la pulpe.

Portion molle de la Dent.

Celle-ci est une substance spongieuse, qui paraît formée par l'entrelacement des vaisseaux et des nerfs propres à chaque dent, mais dont la nature n'est point encore bien connue : seulement on sait qu'elle jouit d'une sensibilité animale très-prononcée, égale au moins à celle de l'organe médullaire. Cela est prouvé, 1° par les douleurs des dents cariées où la pulpe est à nu, douleurs qui sont, comme on le sait, extrêmement vives; 2° par l'introduction d'un stylet dans l'ouverture de la carie, introduction qui, insensible d'abord, devient cruelle lorsque l'instrument arrive à la pulpe; 3° par l'ouverture d'une alvéole dans un très-jeune animal dont la pousse des dents est encore éloignée. A cet âge la pulpe est très-considérable, et la dent, petite à proportion, est facile à enlever de dessus sans l'intéresser, parce qu'elle n'a point encore de racine, et que l'ouverture de la base de la couronne est très-large. Si on enlève donc la dent, et que la pulpe, ainsi mise à découvert, soit irritée d'une manière quelconque, l'animal donne les marques de la plus vive douleur. J'ai fait plusieurs fois cette expérience, toujours très-facile à cause du peu d'épaisseur des lames osseuses qui forment alors les alvéoles.

Les dents ont des sympathies remarquables, et qui portent non sur leur portion solide, mais sur la pulpe. Comme celle-ci est beaucoup plus grosse

proportionnellement dans le premier âge; qu'elle est presque la partie dominante dans la dent, ces sympathies sont alors et plus nombreuses et plus marquées. Dans ces sympathies, tantôt ce sont les propriétés animales, tantôt les organiques, qui sont mises en jeu.

Les sympathies de sensibilité animale se manifestent dans les douleurs dont les dents deviennent le siége par l'action du froid ou de l'humidité sur le système cutané; dans celles produites à la face, à la tête, par la carie d'une dent. Fauchart cite l'exemple d'une migraine rebelle depuis long-temps, et que l'extraction d'une dent fit disparaître sur-le-champ. La sensibilité de l'oreille, des yeux, est altérée dans certaines odontalgies violentes, etc. La contractilité animale est aussi mise en jeu dans les sympathies dentaires; rien de plus fréquent, dans la dentition, que les convulsions des muscles volontaires. Tissot parle d'un spasme des muscles de la mâchoire qui fut guéri par l'extraction de deux dents cariées, et d'une convulsion aux muscles de la gorge qui occasiona la mort, et dont la source primitive était dans une dent gâtée, etc., etc.

Les sympathies organiques ne sont pas moins souvent déterminées par les affections des dents. Les vomissemens spasmodiques, les diarrhées, la fréquence du pouls, souvent les évacuations involontaires de l'urine, phénomènes auxquels préside la contractilité organique sensible de l'estomac, des intestins, du cœur, de la vessie, sont les fréquens effets des dentitions, de la première surtout, des douleurs violentes des dents, etc. La contractilité

organique insensible, la sensibilité organique sont mises sympathiquement en activité dans les engorgemens de la parotide, dans le gonflement général de la face, dans la sécrétion augmentée de la salive, quelquefois dans les érysipèles qui se manifestent par une affection aiguë des dents.

Souvent les sympathies dentaires ont lieu entre les dents correspondantes de la même rangée ou des deux rangées. J'ai la première grosse molaire supérieure du côté gauche un peu cariée; de temps à autre elle me fait beaucoup souffrir : or, toujours alors la première molaire du côté droit devient aussi douloureuse, quoique intacte. Il est d'autres cas où, une dent souffrant en bas, des douleurs sympathiques se manifestent dans celle qui est au-dessus, et réciproquement.

La structure des dents étant exposée, voyons comment leurs diverses substances se développent. Ce point de la nutrition osseuse me paraît avoir été exposé peu clairement par tous les auteurs : je vais tâcher de mieux le développer. Il y a deux dentitions : l'une est provisoire et se borne au premier âge, l'autre appartient à toute la vie; chacune doit être considérée avant, pendant et après l'éruption.

Première Dentition considérée avant l'éruption.

Les phénomènes de la dentition sont ceux-ci, avant l'époque de l'éruption : les mâchoires du fœtus sont fermées tout le long de leur bord libre; elles paraissent homogènes au premier coup d'œil;

mais examinées dans leur intérieur, elles présentent une rangée de petits follicules membraneux, séparés par de minces cloisons, logés dans des alvéoles, arrangés comme les dents auxquelles ils doivent servir de germe, et ayant la disposition suivante :

La membrane qui sert d'enveloppe au follicule forme un sac sans ouverture (1) qui tapisse d'abord toutes les parois de l'alvéole, auxquelles il tient par des prolongemens. Arrivé à l'endroit où pénètrent les vaisseaux et les nerfs, ce sac abandonne l'alvéole, devient libre, se replie, forme un canal qui accompagne le paquet vasculaire et nerveux, et

---

(1) Après l'éruption des dents, il est évident que le follicule de ces *ostéides* offre beaucoup d'analogie avec celui des poils; en effet, il se continue, près de son goulot, avec la membrane tégumentaire buccale, dont il peut être considéré comme une simple dépression. Avant l'éruption des dents, au contraire, l'analogie existe déjà réellement, mais elle n'est pas aussi claire, et, comme on le voit, elle a été méconnue par Bichat, qui représente la membrane propre du follicule comme formant un sac sans ouverture. Aujourd'hui, et spécialement depuis les travaux sur ce sujet de M. Delabarre, il est reconnu que le follicule dentaire, du côté du rebord gengival, est uni à la muqueuse par un prolongement canaliculé qui établit réellement une continuité d'une part entre la cavité buccale et celle du follicule, et de l'autre entre la muqueuse gengivale et la membrane dentaire. Ce canal, fermé par la contiguité de ses parois dans les premiers temps, et dilaté plus tard par la dent qui le parcourt pour se porter au-dehors, représente réellement le goulot, mais le goulot très-allongé de ce follicule particulier.

(F. Blandin.)

apparente ; la canine *c* et les deux petites molaires *d*, *e*, sont encore au-dessous des dents qu'elles doivent remplacer ; la première grande molaire persistante est sortie ; la deuxième *g* est encore dans son follicule ; la troisième *h* est encore loin de sortir ; l'artère dentaire *i* se distribue aux dents de l'une et de l'autre dentitions.

Fig. 11 et suiv. Phénomènes et progrès de la destruction des dents de la première dentition à mesure que celles de la deuxième prennent de l'accroissement. — A. La dent temporaire *a* est encore intacte ; la dent de deuxième dentition *b* est encore enveloppée dans le follicule, qui se prolonge jusqu'à la gencive. — B. La racine de la dent temporaire *a* est en partie détruite ; le sommet de la dent de remplacement pointe déjà hors de l'*iter dentis*. — C. La racine de la dent temporaire est presque entièrement usée ; la couronne de la dent de remplacement est hors de l'alvéole. — Aa, Bb, Cc, phénomènes de la destruction progressive des cloisons alvéolaires dans les cas précédens. — D, E, F, G, les mêmes phénomènes de destruction des racines des dents temporaires considérés relativement aux dents molaires. — *a*, *a*, *a*, *a* ; dents molaires de remplacement se développant entre les racines de la dent temporaire correspondante, et finissant par chasser la couronne.

Planche G.

Fig. 1. Dent incisive coupée suivant sa longueur, pour faire voir la cavité papillaire *a*.

Fig. 2. Dent canine coupée suivant sa longueur dans le même but.

Fig. 3. Dent molaire coupée transversalement et dans le même but. *a* La cavité, *b* l'émail.

Fig. 4. La même coupée perpendiculairement.

Fig. 5. Germe d'une dent molaire renfermée dans son follicule qu'on a distendu, et présentant les premiers noyaux osseux.

Fig. 6. Coupe d'une dent molaire pour faire voir la structure du follicule dentaire, et la manière dont la membrane extérieure s'introduit dans la cavité, d'après Bichat.

Fig. 7. Coupe verticale d'une dent canine avec la disposition de ses membranes, d'après M. Delabarre.

Fig. 8. Dent molaire sciée verticalement, pour montrer la pulpe qui remplit sa cavité et la distribution de ses vaisseaux et nerfs.

Fig. 9. Mâchoire inférieure d'un enfant chez lequel la première dentition est complète. On voit derrière le bord alvéolaire des trous (*iter dentis*) qui communiquent avec les alvéoles de la deuxième dentition.

Fig. 10. Moitié de la mâchoire inférieure d'un enfant de sept ans. La dent incisive moyenne de la deuxième dentition est entièrement sortie; l'incisive latérale *b* est déjà très-



par Chazal.

A. H. Lefevre sculp.

s'épanouit ensuite sur la pulpe de la dent qui termine le paquet.

Il résulte de là que cette membrane a la conformation générale des membranes séreuses, celle, comme on le dit, de ces espèces de bonnets dont on s'enveloppe la tête pendant la nuit. Elle a deux portions, l'une adhérente et tapissant l'alvéole, l'autre libre et recouvrant la pulpe, comme, par exemple, la plèvre a une portion costale et une pulmonaire (1). La pulpe et les vaisseaux, quoique

---

(1) Le follieule dentaire se eompose de deux choses : 1° de la membrane qui forme ses parois ; 2° de la pulpe, ou mieux de la *papille*, sur laquelle est formée la dent. La membrane du follicule est elle-même formée par la superposition de deux feuillets, l'un, extérieur, fibreux, doit adhérer plus tard à l'alvéole, c'est le périoste *alvéolo-dentaire* et le derme de la membrane muqueuse buccale déprimée en follicule au niveau des dents ; l'autre, intérieur, villeux et vasculaire, forme immédiatement la cavité du follicule. Ces deux feuillets associés s'étendent jusqu'à la base de la papille, vers le point par lequel celle-ci reçoit les vaisseaux et les nerfs qui forment son pédicule ; mais ni l'un ni l'autre ne se réfléchissent réellement sur la papille, comme Bichat le suppose ici. Ce qui a pu abuser ce physiologiste, c'est que le tissu de la papille est continu avec celui du feuillet interne du follicule. La *papille* ou *pulpe dentaire*, partie essentiellement nerveuse et vaseulaire, est une expansion qui naît du fond du follieule ; c'est une papille analogue à celles que l'on trouve dans tous les points des membranes tégumentaires, mais seulement plus développée, en raison des attributions spéciales qu'elle a reçues ; elle est analogue à la papille des poils et des plumes. Le sommet de la papille dentaire présente autant de bourgeons que la dent doit avoir de *cuspides* ou d'éminenees de la couronne.

(F. Blandin.)

renfermés dans sa duplicature, se trouvent donc vraiment hors de la cavité, qu'une simple rosée lubrifie. J'ai trouvé que cette rosée était, comme celle des membranes séreuses, de nature essentiellement albumineuse (1); l'action de l'acide nitrique, celle de l'alcool, celle du feu, le prouvent incontestablement. Soumise à l'action d'un de ces agens, surtout du premier, la membrane blanchit tout à coup; la couche d'albumine qui la recouvre devient concrète et coagulée, comme quand on fait une semblable expérience sur une surface séreuse.

La pulpe, très-grosse à cet âge, se trouve suspendue, comme une grappe de raisin, à l'extrémité des vaisseaux et des nerfs.

C'est sur la portion pulpeuse de la membrane du follicule, et à la surface de son extrémité flottante, que se développe le premier point osseux; il s'étend bientôt, et prend exactement la forme du sommet de la couronne que par la suite il doit former, c'est-à-dire qu'il est quadrilatère sur les molaires, pointu sur les canines, taillé en biseau sur les incisives (2). Développé d'abord du côté des gencives, il

---

(1) Le liquide de la cavité du follicule diffère, à beaucoup d'égards, de celui des membranes séreuses: il a plus de consistance et de viscosité; sa couleur est d'un jaune plus foncé; mais surtout il jouit de propriétés acides tout-à-fait spéciales, propriétés qu'il paraît devoir à la présence de l'acide lactique de Berzélius. (F. Blandin.)

(2) Dès le moment où la partie osseuse de la dent se forme sur le sommet de la papille, elle présente la même figure partout; c'est toujours un petit chapiteau conique, et creux du

s'étend ensuite du côté du pédicule vasculaire et nerveux; il se moule sur lui en s'avançant vers l'endroit de l'alvéole où il pénétre; en sorte qu'il présente de ce côté une surface concave qui embrasse la portion pulpeuse de la membrane, et y tient par divers prolongemens vasculaires (1); et, comme cette portion est flottante, le premier rudiment de la dent flotte aussi dans la cavité de la membrane, comme on le voit très-bien en incisant la portion alvéolaire de cette membrane, après avoir détruit la paroi correspondante de l'alvéole.

Les conséquences suivantes résultent de ce mode de développement : 1° la couronne est la première formée, et la racine n'est produite qu'à mesure que l'ossification suivant la longueur s'avance sur la

---

côté de la papille qu'il embrasse. Les dents varient seulement à cette époque sous le rapport du nombre de ces noyaux élémentaires : les unes, les canines, n'en ont qu'un; d'autres, les petites molaires, en ont deux, tandis que les incisives en présentent trois, et les grosses molaires quatre ou cinq; en un mot, il y a autant de points premiers de formation que la pulpe présente de bourgeons, et que la dent doit avoir par la suite de *cuspides* ou d'éminences terminales de la couronne. La dent, qui se forme par plusieurs noyaux, voit bientôt ceux-ci se réunir par leur base, et, pour le reste, la formation ne présente plus rien de spécial; mais c'est alors seulement que l'on peut dire, avec Bichat, que le sommet de la dent est devenue *quadrilatère sur les molaires, pointu sur les canines, et taillé en biseau sur les incisives*. (F. Blandin.)

(1) L'adhérence des rudimens de la partie osseuse de la dent sur le sommet de la papille est très-faible, mais surtout elle n'est pas vasculaire, comme Bichat le dit ici : c'est une simple juxta-position. (F. Blandin.)

portion de membrane tapissant le paquet vasculaire et nerveux. 2°. Comme tous les vaisseaux qui arrivent à la dent pénètrent par sa surface interne, puisque l'externe est entièrement libre dans la cavité de la membrane, l'ossification suivant l'épaisseur se fait spécialement aux dépens de la cavité interne, qui va toujours en se rétrécissant, ainsi que la pulpe, disposition inverse de celle des autres os, dont l'ossification commence par un point placé au centre du cartilage, et qui, d'abord solides au milieu, deviennent ensuite creux pour les cavités celluleuses et médullaire, qui vont toujours en s'agrandissant (1). 3°. Après l'ossification de la dent,

---

(1) Bichat argumente ici dans l'hypothèse que les dents sont de véritables os; il les représente seulement comme le résultat de l'ossification de la papille, ossification qui se ferait de la périphérie vers le centre, tandis que les os ordinaires se forment de l'intérieur à l'extérieur dans les cartilages qu'ils remplacent. Mais il règne, dans cette manière de concevoir la formation de la partie osseuse de la dent, une erreur qui a besoin d'être signalée. Il n'y a pas, entre la papille dentaire et la dent, le rapport qui existe entre le cartilage primitif du corps d'une vertèbre et le corps osseux de cette pièce du rachis; ce n'est pas la papille qui s'ossifie pour former la dent, pas plus que ce n'est la papille du poil ou de la plume qui se densifie pour former le poil où la plume: la dent est sécrétée par la surface externe de la papille, sur laquelle elle reste appliquée, et dont elle prend exactement la forme; elle s'accroît en longueur et en épaisseur, comme les poils, les plumes et les ongles, c'est-à-dire par l'addition successive de couches à l'intérieur des premières sécrétées. En raison de la forme particulière de la papille, qui est celle d'un cône dont la pointe regarde le fond de l'alvéole, la dent se prolonge

la portion de la membrane du follicule qui tapissait l'alvéole reste la même, tandis que sa portion correspondant à la pulpe, libre primitivement de l'autre côté, devient de ce côté adhérente à toute la cavité dentaire qu'elle tapisse, dont elle forme la membrane indiquée plus haut à l'article de la structure des dents, et qui se trouve ainsi intermédiaire à la pulpe et à la substance osseuse. 4°. La pulpe de la dent est la première partie formée, et la plus considérable dans les premiers temps. Il paraît que c'est la substance osseuse qui se forme la seconde, et que l'émail naît ensuite à l'extérieur de celle-ci. Je n'ai point pu encore rendre sensible le mode de son origine (1).

également en pointe de ce côté, et la papille se trouve bientôt emprisonnée par les couches calcaires qu'elle a sécrétées à sa surface; toutefois d'abord la papille, peu comprimée, continue sa sécrétion, d'où il suit que la cavité dentaire se trouve de plus en plus rétrécie, et la papille de plus en plus serrée, au point que, plus tard, celle-ci subit ainsi une véritable atrophie. On conçoit encore de la sorte, ainsi que l'a très-bien fait remarquer M. Oudet, comment les dents de l'homme ne peuvent s'accroître d'une manière indéfinie, tandis que les défenses de l'éléphant et du sanglier, qui sont bien aussi des dents, peuvent s'allonger pendant toute la durée de la vie, à mesure qu'elles sont détruites à l'extrémité par les frottemens: ces dernières sont munies d'une papille qui représente un cône dont la base répond au fond de l'alvéole. (F. Blandin.)

(1) Suivant M. Cuvier, l'émail est le produit de la sécrétion immédiate de la lame interne du follicule; suivant Hunter, il reste quelque temps en dissolution dans le fluide du follicule et se cristallise ensuite sur l'ivoire de la dent, à mesure que son

L'époque à laquelle le follicule membraneux se forme est difficile à saisir; celle de la première ossification paraît être du quatrième au cinquième mois. Au terme de la naissance, on trouve les vingt dents de la première dentition déjà avancées, toute la couronne en est formée; le commencement de la racine se présente aussi sous la forme d'un tuyau large, à parois extrêmement minces, et qui va toujours en s'allongeant et en épaississant. Lorsqu'il est arrivé au fond de l'alvéole, celle-ci est trop étroite pour contenir la dent qui se fait jour au dehors.

---

menstrue est repris par les vaisseaux absorbans du follicule; enfin quelques personnes ont soutenu que l'émail est, comme l'ivoire, sécrété par la papille, et qu'il traverse les pores de l'ivoire pour arriver à la surface de la dent. On doit avouer qu'il règne encore une assez grande obscurité relativement à la formation de l'émail; car il est difficile de concevoir, dans ces différentes hypothèses, pourquoi la racine de la dent, qui se forme comme la couronne, sur la papille, dans la cavité et au milieu du liquide du follicule, ne se couvre pas d'émail comme elle. M. Delabarre seul a été embarrassé par cette difficulté, et s'est occupé d'y répondre : il croit que l'émail est sécrété par le feuillet interne du follicule; mais que ce feuillet ne descend pas jusque vers le pédicule de la papille, qu'il s'insère sur le milieu du contour de celle-ci, et que la couronne de la dent seule se trouve formée dans sa cavité. Mais cette opinion, sur l'anatomie du follicule, ne me paraît pas suffisamment établie pour que l'on puisse en faire la base d'une explication physiologique; l'analogie ne lui est point favorable, et tout me porte à la considérer comme une hypothèse anatomico-physiologique, mais une hypothèse si jolie, qu'on regrette de ne point la trouver confirmée par la sévère observation. (F. Blandin.)

Le nombre des dents, moindre dans la première que dans la seconde dentition, donne une forme particulière aux mâchoires du fœtus et de l'enfant, surtout à l'inférieure, qui est moins allongée en devant, et par conséquent plus large proportionnellement que chez l'adulte, où, pour recevoir toutes les dents, le rebord alvéolaire doit être nécessairement plus étendu. Cette disposition de la mâchoire inférieure influe beaucoup sur l'expression de la physionomie.

Première Dentition considérée à l'époque de l'éruption.

On observe les phénomènes suivans à l'époque du sixième ou septième mois de la naissance, très-rarement avant, plus rarement encore pendant la grossesse, ce qui n'est pas cependant sans exemple, comme l'histoire de Louis XIV en est la preuve : on voit d'abord paraître, tantôt simultanément, tantôt isolément, les deux petites incisives de la mâchoire inférieure; bientôt après, les incisives correspondantes de la mâchoire supérieure se font jour; un mois ou deux après, les quatre autres incisives sortent; à la fin de la première année paraissent ordinairement les quatre canines (1); à la fin de la seconde, ou souvent plus tard, on voit sortir,

---

(1) Les premières molaires sortent presque toujours avant les canines. MM. Serres et Meckel pensent même que cela a lieu constamment. (Béclard.)

à chaque mâchoire, deux molaires que deux autres suivent bientôt. C'est presque toujours par la mâchoire inférieure que commence chaque éruption. A l'âge de quatre ans, quatre ans et demi, quelquefois de cinq ou six ans, toujours à une époque assez variable, se manifestent en bas, puis en haut, deux autres molaires qui complètent le nombre de vingt-quatre dents formant la première dentition : toutes en effet tombent, et sont remplacées par de nouvelles (1).

Le mécanisme de cette première dentition est celui-ci : l'ossification faisant toujours des progrès vers la racine, la dent ne peut plus être contenue dans l'alvéole; elle perce et la portion alvéolaire de la membrane, et la membrane muqueuse de la bouche, et un tissu pulpeux intermédiaire qui les sépare, avec d'autant plus de facilité, que cette triple couche s'amincit peu à peu à mesure que l'éruption approche. Ce phénomène est-il dû uniquement à la pression mécanique de la dent? Je crois qu'il y a une autre cause; car observez qu'ici les membranes sont très-peu soulevées avant de se rompre, tandis que dans les polypes et autres tumeurs qui naissent quelquefois sous la membrane gengivale, elle est infiniment plus tiraillée, et cependant alors elle ne se déchire pas, mais se sou-

---

(1) Ici existe une erreur qu'il importe de signaler : parmi les vingt-quatre dents que Bichat considère comme appartenant à la première dentition, il en est quatre, celles qui sortent à l'âge de quatre ou cinq ans, qui ne tombent point; elles doivent constituer plus tard les premières grosses molaires. (F. Blandin.)

lève seulement. Ce mécanisme de l'ouverture des gencives n'est pas plus connu que le principe des accidens terribles qui se manifestent quelquefois alors (1). Le sac que formait la membrane primitive du follicule se trouvant ainsi ouvert, sa portion qui tapisse l'alvéole s'unit à la membrane de la bouche, lui devient continue, se colle en même temps au collet d'une manière très-intime; et comme, pendant le développement de la racine, la face interne de cette portion membraneuse, libre d'abord, ainsi que nous avons vu, a peu à peu contracté des adhé-

---

(1) Sans résoudre la question du mécanisme de l'éruption des dents, Bichat avait cependant reconnu, comme on le voit, qu'il devait y avoirlà quelque chose de plus qu'un simple soulèvement de la gencive : mais ce quelque chose lui avait échappé; c'était pour lui une *inconnue*, qu'il invitait chacun à chercher. Ce problème est aujourd'hui entièrement résolu, grâce aux notions récemment acquises sur l'anatomie du follicule dentaire. Dans leur sortie des alvéoles, les dents soulèvent d'abord la membrane gengivale; puis celle-ci est détruite par pression dans quelques points, surtout lorsque la couronne de la dent qui lui est opposée présente une large surface à son sommet, comme cela a lieu pour les molaires; mais, en outre, l'ouverture naturelle du follicule, son goulot, le *ductus dentis* enfin, est dilaté, et la dent le parcourt plus ou moins complétement. Ainsi les poils et les plumes, parties analogues aux dents, sortent-ils de leur bulbe lors de leur complète formation; ainsi la matière sécrétée par les follicules simples s'échappe-t-elle par le goulot de ces dépressions des membranes tégumentaires, lorsqu'en raison de sa quantité elle cesse de pouvoir y rester contenue. Quant à la raison de l'apparition des dents au-dehors, je viens de la donner: c'est le développement lui-même de la dent, et un accroissement tel, que celle-ci cesse de pouvoir être contenue dans la

rences avec elle, il s'ensuit que cette racine se trouve enchâssée entre la portion alvéolaire qui tapisse son extérieur, et la portion pulpeuse qui revêt son intérieur : c'est ce qui assure sa solidité. A mesure que les adhérences de la membrane augmentent, on peut moins facilement la distinguer. Il est rare que, dans cette première dentition, la formation de la racine s'achève aussi complètement que dans la seconde; sa cavité interne reste aussi très-large, et la pulpe est plus développée (1).

---

capacité de son follicule. La chose est évidente pour les poils et les plumes, auxquels il faut toujours revenir en semblable cas, et que l'on doit prendre pour point de départ, à cause de leur condition d'analogie avec les dents, et de leur remarquable simplicité. L'explication différente, proposée par M. Delabarre, est jolie sans doute; mais, à mon avis, c'est son unique mérite : elle est fondée sur une erreur anatomique, l'insertion de la membrane interne du follicule sur les parties latérales de la papille, là où devra se former le collet de la dent. Les accidens si communs pendant la dentition me paraissent enfin tenir à la même cause, le développement de la dent; cet os, en effet, pour s'échapper, fait effort contre la gencive; celle-ci résiste, et de là résulte : 1° une irritation de la muqueuse de la bouche; 2° un refoulement de la dent vers le pédicule nervoso-vasculaire du follicule. Que si ces accidens ne sont pas constans, bien que la cause ne manque jamais, cela tient seulement à la différence d'irritabilité nerveuse des différens enfans, et à la résistance variable du tissu gengival. (F. Blandin.)

(1) Les dents de la première dentition ne diffèrent pas seulement de celles de la seconde par leur durée moindre; elles s'en distinguent en outre par leur remarquable blancheur, et par la forme arrondie et souvent globuleuse de la couronne; cette partie, dans les molaires surtout, est ventrue en dehors. Enfin,

Deuxième Dentition considérée avant l'éruption.

Il faut, comme dans les cas précédens, distinguer les phénomènes nutritifs en ceux qui ont lieu avant, pendant et après l'éruption. Avant l'éruption, on observe, en ouvrant la mâchoire, une rangée de follicules dentaires correspondant à la rangée des dents déjà formées, situés au-dessous ou à côté, et séparés d'elles par de petites cloisons dont l'épaisseur est d'autant plus grande qu'on l'examine dans un âge plus voisin de la première enfance.

Ces follicules ont exactement la même disposition que ceux de la première dentition; comme eux ils forment des sacs sans ouverture, dont la portion alvéolaire est adhérente et dont la pulpeuse est libre et se revêt à sa surface des premières couches osseuses pour la couronne. L'accroissement est le même dans son mode, c'est-à-dire qu'il a lieu de l'extérieur à l'intérieur, à l'inverse des autres os, disposition qui fait que la partie de la dent immédiatement en contact avec les corps étrangers, étant la première formée, a plus le temps d'acquérir la solidité nécessaire à ses fonctions.

A mesure que les dents secondaires croissent, on voit leur système vasculaire se prononcer davan-

---

les deux molaires caduques sont multicuspidées; ce sont de *grosses molaires*, tandis que celles qui leur succèdent sont bicuspidées, ce sont les *petites molaires* proprement dites.

(F. Blandin.)

tage, et celui des anciennes dents diminuer; ce qui tient à ce que la sensibilité, affaiblie dans celles-ci, n'appelle plus le sang, tandis que, exaltée dans l'autre, elle l'attire avec force. On remarque aussi que la cloison des alvéoles diminue en épaisseur, et que la racine des premières se détruit. Ce double phénomène ne paraît point tenir à la pression exercée par la nouvelle dent, puisque alors la racine s'élargirait, s'aplatirait seulement; ou, si elle éprouvait une destruction réelle, on en trouverait les débris; ce qui n'arrive point. Il est donc probable que c'est par l'absorption du phosphate calcaire que la cloison et la racine disparaissent, à peu près comme nous avons dit que les cavités internes des os cartilagineux se forment.

On voit, d'après cela, que l'ossification des racines des premières dents est d'assez courte durée: elle commence la dernière et finit la première. Lorsqu'elle n'a plus que peu d'étendue, les dents commencent à vaciller, faute d'insertion. La disparition de la cloison augmente leur mobilité. C'est à peu près à l'âge de six ou sept ans que commence leur chute: cette chute se fait suivant l'ordre de leur éruption, c'est-à-dire que les incisives, puis les canines, puis les molaires, se détachent. Remarquez cependant que la dernière, celle qui a paru à quatre ans, n'est point renouvelée.

Deuxième Dentition considérée à l'époque de l'éruption.

Pendant l'éruption des secondes dents, on les

voit sortir à mesure et dans le même ordre que celles qui leur correspondent se détachent. 1°. Les huit incisives, 2° les quatre canines se manifestent. 3°. A la place de la première molaire, deux nouvelles se développent : ce sont celles qui, dans la suite, portent le nom de *petites molaires*. 4°. La seconde molaire reste, comme nous venons de le dire : c'est la première des grosses (1). 5°. A huit ou neuf ans, deux secondes molaires paraissent à chaque mâchoire. 6°. Enfin à dix-huit, vingt, trente ans, quelquefois plus tard, il se développe encore une troisième molaire : c'est ce qu'on appelle la *dent de sagesse*.

Alors il y a à chaque mâchoire seize dents, dont quatre incisives, deux canines, deux petites molaires, et trois grosses.

Quelquefois, pendant qu'elles se forment, les dents secondaires, au lieu de s'approprier la substance nutritive des racines des premières et de

---

(1) Il y a ici une contradiction manifeste, qui ne peut être qu'une faute d'attention échappé à l'auteur, ou une erreur typographique. Il est dit plus haut (page 122) que la première dentition se compose de vingt-quatre dents, dont quatre molaires, à chaque mâchoire, sorties vers la fin de la seconde année, et deux autres molaires vers l'âge de quatre ans. Ce sont donc ces dernières, ou les troisièmes de la première dentition, qui forment dans la seconde les premières grosses. Les nouvelles petites molaires remplacent donc deux dents de la même nature, et non une seule. Toute la différence, c'est que ces nouvelles petites molaires sont beaucoup moins fortes que les dents auxquelles elles succèdent : celles-ci ressemblent beaucoup aux grosses molaires. (BÉCLARD.)

leur cloison, les laissent intactes; ni les unes ni les autres ne se détruisent, et l'éruption des secondes dents se fait à côté des premières restées en place. Ce phénomème n'arrive ordinairement qu'à une dent isolée ; quelquefois cependant plusieurs et même toutes le présentent, et alors il y a une double rangée. En général les dents secondaires n'ont de la tendance à sortir que du côté des gencives : lorsque, très-obliquement placée par un vice de conformation, leur couronne regarde en devant ou en arrière, au lieu de percer la mâchoire, elles restent ensevelies pour toujours dans leurs alvéoles (1).

Phénomènes subséquens à l'éruption des secondes Dents.

Après l'éruption, les dents croissent manifestement, 1° suivant la longueur, 2° suivant l'épaisseur. Il n'y a que la racine qui s'allonge dans le premier sens : la couronne garde toujours ses mêmes dimensions; et si, dans les vieillards, elle paraît plus longue, c'est que les gencives se sont affaissées, phénomène que d'ailleurs on observe très-souvent dans les personnes qui maigrissent, dans celles qui ont fait usage de mercure, etc.

---

(1) Pendant toute la vie les dents sont plus ou moins encroutées vers leur collet d'une matière calcaire jaunâtre que l'on appelle le *tartre*. Cette substance est sécrétée par une série de petits follicules au nombre de neuf environ, qui garnissent en forme de cercle le goulot du follicule, disposition tout-à-fait analogue à celle que présentent les poils et les plumes. (F. Blandin.)

L'accroissement dans le second sens ne se fait point en dehors; il n'a lieu qu'en dedans : le canal de la racine et la cavité du corps vont toujours en se rétrécissant; ils finissent enfin par s'oblitérer. Alors, le sang ne pénétrant plus dans la dent, les nerfs n'y portant plus leur influence, elle meurt, et tombe. Mais cette mort paraît aussi déterminée par l'accumulation dans la substance osseuse d'une très-grande quantité de phosphate calcaire, qui y devient tellement prédominant sur la gélatine que le principe de vie est entièrement étouffé; en sorte que, sous ce rapport, le chute des dents présente un phénomène analogue à celui de la chute des cornes des herbivores, de l'enveloppe calcaire des crustacés, etc.

Pourquoi la nature a-t-elle marqué à la vie des dents un terme plus court qu'à celle des autres os, qui ne finissent d'exister qu'avec tous les autres organes, tandis qu'elles meurent long-temps avant? Est-ce parce que, l'estomac s'affaiblissant avec l'âge, les animaux se trouvent forcés par là de ne se nourrir, dans leur vieillesse, que de substances molles, accommodées à l'état de langueur de leurs forces gastriques? Sans doute que chez l'homme mille causes, nées surtout de la nature des alimens, de leur degré de chaleur ou de froid, de leur coction, de leurs qualités infiniment variées, accélèrent l'époque naturelle de la mort et de la chute des dents, parce qu'en excitant sans cesse, en agaçant ces organes, elles les entretiennent dans un état d'activité habituelle qui épuise leur vie plus tôt qu'elle ne devrait finir. Ainsi mille causes, nées de la so-

ciété, mettent-elles à la vie générale un terme bien antérieur à celui fixé par la nature. Mais, en général, dans tous les animaux, la mort des dents précède celle des autres organes, quoiqu'ils ne soient point sous l'influence sociale, que leur mastication ne s'exerce par conséquent que sur des alimens destinés par la nature à être en contact avec leurs dents.

Les mâchoires, dépourvues de dents chez le vieillard, se resserrent; les alvéoles s'effacent; le tissu des gencives se raffermit, et la mastication continue, quoique avec plus de peine. Dans ce changement de conformation, le bord alvéolaire se rejette en arrière, de là la saillie du menton en devant; il diminue en hauteur, de là le rapprochement de cette partie près du nez, phénomène qui tient aussi spécialement à l'absence des dents (1).

---

(1) On trouvera de nouvelles particularités sur le développement des dents, la disposition et la structure de leurs follicules membraneux, l'époque à laquelle ils se forment et s'ossifient pour les différentes classes de dents, les rapports des dents secondaires et des dents de lait, les phénomènes de l'éruption, etc., dans les ouvrages publiés sur ce sujet par MM. Serres et Delabarre, ainsi que dans les considérations qu'a présentées M. J.-F. Meckel sur le même objet. Presque tous ces détails appartiennent à l'anatomie descriptive; c'est pourquoi ils ne seront pas exposés ici. (Béclard.)

§ V. *Phénomènes particuliers du développement des Sésamoïdes.*

Les sésamoïdes offrent une exception, moins marquée que celle des dents, mais aussi réelle cependant, aux lois générales de l'ossification.

Disposition générale des Sésamoïdes.

Ces petits os, ordinairement de forme arrondie, de grosseur variable, n'excèdent guère communément celle d'un pois, excepté la rotule cependant; ils ne se trouvent, en général, que dans les membres; le tronc n'en présente jamais.

Dans les membres supérieurs, on n'en voit guère qu'à la main, où l'articulation du pouce avec le premier os métacarpien en présente toujours deux, et où quelquefois l'articulation analogue du doigt indicateur, très-rarement celle du petit doigt, et l'articulation phalangienne du pouce en offrent aussi.

Dans les membres inférieurs, au contraire, ils sont nombreux et surtout beaucoup plus prononcés. Deux s'observent sur chaque condyle du fémur, dans les tendons des jumeaux, derrière le genou; au-devant est la rotule. Dans le pied, le tendon du jambier postérieur près son insertion à la tubérosité du scaphoïde, celui du long péronier à son passage sous le cuboïde, offrent aussi des sésamoïdes. On en voit constamment deux sous l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil; sous

la plupart des articulations analogues des autres doigts, il s'en trouve aussi, quoique ceux-ci soient plus variables. Dans les articulations phalangiennes, j'en ai vu aussi plusieurs fois. En général, les os sésamoïdes n'existent que dans le sens de la flexion, qui est celui où les plus grands efforts sont à supporter. Dans le sens de l'extension, je ne connais que la rotule.

Ces petits os n'ont point, comme les autres, une existence isolée ; ils se développent toujours dans un organe fibreux, soit dans un tendon, comme ceux des jumeaux, du péronier, du jambier postérieur, comme aussi la rotule; soit dans un ligament, comme tous ceux placés au-devant des articulations métacarpo-phalangiennes, métatarso-phalangiennes ou phalangiennes, lesquels ont pour base le faisceau fibreux considérable et transversal que nous avons appelé *ligament antérieur* de ces articulations.

Etat fibro-cartilagineux.

Les deux bases primitives des sésamoïdes restent long-temps sans en offrir les rudimens, et sont telles, à l'endroit où ces os doivent exister, qu'elles sont partout ailleurs. Leur organisation est généralement uniforme Quelque temps après la naissance, un peu plus de gélatine que n'en contiennent pour leur nutrition propre ces deux corps fibreux commence à s'y exhaler à l'endroit où, devenus un jour osseux, ils offriront les sésamoïdes ; alors naissent des cartilages essentiellement diffé-

rens des cartilages d'ossification ordinaire, lesquels sont à peu près de même nature que ceux des extrémités des os longs des adultes, tandis que ceux-ci appartiennent vraiment à la classe des substances fibro-cartilagineuses. Ils ressemblent par leur nature aux fibro-cartilages inter-articulaires, à ceux des coulisses tendineuses, etc. Ce ne sont pas des cartilages, mais des fibro-cartilages d'ossification, dont on distingue d'autant mieux la base fibreuse qu'on est plus près du temps de leur développement.

État osseux.

Peu à peu les vaisseaux de ces fibro-cartilages, qui ne charriaient que des sucs blancs, se mettent en rapport de sensibilité avec le sang; ce fluide les pénètre; en même temps le phosphate calcaire commence à s'y déposer : alors le tissu celluleux s'y forme à l'intérieur par un mécanisme analogue à celui des autres os; une légère couche compacte se développe à l'extérieur. Mais, au milieu de cet os nouveau, la base fibreuse reste toujours; les fibres du tendon supérieures au sésamoïde se continuent, pour ainsi dire, à travers sa substance, avec les inférieures : aussi les cicatrices de ces os, lorsqu'ils sont fracturés, prennent-elles un caractère particulier et distinctif; c'est leur base fibreuse qui, en s'étendant pour la réunion, établit cette différence. On sait que le cal de la rotule n'est pas le même que celui des autres os (1). Souvent, lorsque

(1) On sait aujourd'hui que la rotule peut présenter un cal

l'appareil n'a pas été exactement maintenu, il reste entre les deux fragmens un tissu fibro-cartilagineux pour moyen d'union : or, ce tissu, c'est le développement non-seulement de la portion cartilagineuse de l'os, mais encore de la portion du tendon des extenseurs qui fait partie de l'organisation de cet os. La vie des sésamoïdes participe presque autant à celle du système fibreux qu'à celle du système osseux.

A mesure qu'on avance en âge, ces petits os croissent et deviennent plus caractérisés dans l'économie animale : souvent il s'en développe très-tard, à l'âge de vingt, trente et même quarante ans. Chez certains vieillards, ils ont au pied un volume très-marqué. J'ai vu, sur deux cadavres de personnes attaquées de la goutte, qu'ils s'étaient développés au point de gêner probablement la progression. Y aurait-il quelque rapport entre eux et cette cruelle affection? Je n'ai là-dessus que ces deux faits.

Les sésamoïdes éloignent leurs tendons du centre du mouvement, facilitent leur glissement sur les os, garantissent leurs articulations, concourent même à leurs mouvemens. Tous ceux développés dans les ligamens antérieurs des articulations métacarpo-phalangiennes et métatarso-phalangiennes,

---

analogue à celui des autres pièces du squelette, et que la cicatrice fibreuse qui a souvent été observée à la suite des fractures de cet os, s'établit à la faveur du grand écartement des fragmens, écartement que favorise la disposition des puissances musculaires insérées sur le fragment supérieur. (F. Blandin.)

et des phalangiennes elles-mêmes, concourent aussi au mouvement de ces articulations. Une portion de la synoviale se déploie sur leur face qui y correspond, et qui reste légèrement cartilagineuse.

La formation des sésamoïdes n'est point un effet mécanique de la pression des tendons ou des ligamens contre les os, comme on l'a prétendu, mais bien un résultat des lois de l'ossification. En effet, dans la première supposition, pourquoi toutes les articulations de la main et du pied, autres que celles indiquées plus haut, étant exposées à peu près à un mouvement égal au mouvement de celles-ci, ne seraient-elles pas pourvues de ces os (1)?

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME OSSEUX.

§ Ier. *Altérations dans les formes extérieures.*

Le gonflement des os est de plusieurs espèces. 1°. Il y a des tumeurs qui semblent déposées, pour ainsi dire, à la surface de l'os, en sorte que celui-ci est parfaitement au-dessous : telles sont la plupart des exostoses. Cette altération paraît dépendre, dans beaucoup de cas, d'une inflammation du périoste, à la suite de laquelle cette membrane se détache, et sécrète par sa face interne une matière qui se durcit et se confond avec le tissu de l'os; une sorte de périostose précède la formation de la tumeur osseuse. Celle-ci est plus ou moins volumineuse suivant l'étendue de l'inflammation. Si l'inflammation est circonscrite, il en résulte ce qu'on appelle des *nodus*. Ces sortes de tumeurs sont très-distinctes de l'os dans leur principe; plus tard, la macération les en détache encore, et les fait voir tenant au périoste : ce n'est qu'à la longue qu'elles paraissent se continuer avec le

tissu osseux ; on observe alors, au microscope, que leurs vaisseaux n'ont pas la même disposition que ceux du reste de l'os, et ne semblent pas être un prolongement de ces derniers. Lorsqu'au contraire le périoste s'enflamme dans une grande étendue, des lames énormes se produisent et donnent naissance à l'exostose dite *laminée* : l'os est entier au-dessous de ces lames, comme dans l'autre cas. 2°. Certaines exostoses ont leur siége dans l'os lui-même, et sont produites par un développement ou un écartement de ses lames les plus superficielles. 3°. L'os tout entier est distendu, aminci, considérablement dilaté, dans le spina-ventosa. 4°. Un véritable excès de nutrition est la cause de l'accroissement de volume, quand il s'y joint une augmentation de densité, ou que du moins cette densité reste la même. C'est ce qu'on voit dans les exostoses éburnées, et dans certains cas où la totalité de l'os paraît avoir augmenté tout à la fois d'épaisseur et de consistance. On peut rapporter à la même cause l'accroissement en longueur que subissent quelquefois les os des individus scrophuleux, celui en largeur que présentent les os du crâne ou ceux du sinus maxillaire, dans des affections de ces cavités. Cet accroissement accidentel, qui se fait ainsi dans un ou plusieurs os, tandis que les autres n'y participent nullement, ne s'opère point par un mécanisme analogue à celui du développement naturel : il y a ici déposition interstitielle, et non formation de couches successives.

L'accroissement de substance peut se borner à accroître la densité du tissu osseux. L'énostose ou ossification intérieure, dans laquelle les cavités des os s'effacent, en est un exemple. Les os des rachitiques présentent un phénomène analogue, dans la compacité que contractent leurs courbures du côté de la concavité.

Un état opposé au précédent est l'espèce d'atrophie qu'éprouve ce tissu quand l'absorption vient à le détruire, soit à l'intérieur, comme cela a lieu chez le vieillard, soit à l'extérieur, ainsi qu'on l'observe quelquefois. Suivant Howship, auquel on doit de nouvelles recherches sur les altérations du tissu osseux, la fragilité des os dépend dans certains cas, dans la syphilis, par exemple, d'une altération de ce genre, d'une sorte d'absorp-

tion intérieure qui transforme la substance compacte en tissu spongieux. Cet auteur distingue la fragilité qui tient à cette cause de celle qui arrive, par exemple, à la suite du scorbut, des scrophules. Cette dernière est généralement attribuée à un défaut de proportion entre les élémens constitutifs du tissu osseux; mais il paraît y avoir en outre altération de la matière animale.

Le ramollissement est très-voisin de la fragilité; souvent l'un et l'autre coïncident dans le même os. Ce ramollissement est de deux espèces. L'un affecte les adultes: les os qui en sont le siége deviennent mous et flexibles, et ploient par le seul effort des muscles; sur le cadavre, le scalpel les coupe aisément. La dessiccation, la coction, montrent dans ces os une prédominance marquée de la substance gélatineuse, qu'indiquent déjà leur couleur et leur aspect. L'autre espèce de ramollissement, propre aux enfans, diffère du précédent sous plusieurs rapports : il constitue le rachitis.

Comprimés par des tumeurs voisines, les os éprouvent dans leur configuration divers changemens. Souvent aussi ces tumeurs les détruisent en partie, les perforent, les usent dans une plus ou moins grande étendue. Cela arrive surtout pour celles qui sont agitées d'un mouvement pulsatile, telles que les anévrysmes.

Les connexions des os, ou les articulations, sont le siége de diverses altérations qui changent plus ou moins les rapports des surfaces articulaires. La soudure des articulations immobiles, les luxations, l'ankylose des articulations mobiles, en offrent des exemples. Des connexions accidentelles ont quelquefois lieu entre les os, comme on le voit dans les fausses articulations. Parmi ces dernières, les unes succèdent à des luxations, et méritent le nom d'*articulations supplémentaires;* les autres, qui sont la suite de fractures, et que forme un seul os divisé en deux fragmens, sont des *articulations surnuméraires.* 1°. Lorsqu'un os luxé n'a pas été réduit, il peut se creuser une nouvelle cavité dans le lieu qu'il occupe. Cette cavité acquiert peu à peu la profondeur convenable; un bourrelet cartilagineux d'abord, puis osseux, se forme à sa circonférence; le tissu cellulaire, épaissi autour des surfaces, représente une sorte de capsule

fibreuse (1), laquelle contient un fluide visqueux, un peu moins onctueux que la synovie. Un périoste fibro-cartilagineux revêt la nouvelle cavité articulaire. L'ancienne se déforme et diminue en général d'étendue. 2°. Quand les deux bouts d'un os fracturé ne peuvent se réunir, soit à cause de leur mobilité, soit par toute autre circonstance, les nouveaux rapports qu'ils contractent ressemblent en quelque sorte à une articulation, quoique cela soit bien moins sensible que dans le cas précédent. Le plus souvent, en effet, les fragmens ne tiennent l'un à l'autre que par des espèces de liens fibreux intermédiaires. Dans quelques cas, néanmoins, leurs extrémités s'arrondissent et s'encroûtent de cartilages; une capsule fibreuse les entoure. On a même vu, dans certaines fractures du col du fémur, le fragment inférieur se creuser une cavité dans le supérieur : ce cas pourrait être confondu avec un décollement de l'épiphyse.

§ II. *Altérations dans l'organisation.*

On connaît peu les effets de l'inflammation sur le tissu osseux. On sait pourtant que les os suppurent. Ils présentent ce phénomène dans la carie, maladie dont la nature est jusqu'à présent inconnue, et qui paraît devoir être dans beaucoup de cas une véritable nécrose. Dans ce qu'on appelle tumeur blanche, et qui comprend certainement des affections très-diverses, les extrémités articulaires offrent souvent quelque chose d'analogue. Elles sont alors le foyer primitif de la maladie. La substance spongieuse se ramollit d'abord, se pénètre de vaisseaux et s'infiltre d'une sérosité roussâtre. Plus tard l'os suppure, et il se forme des fistules dans son intérieur, lesquelles se dirigent tantôt vers la substance compacte extérieure, tantôt du côté du cartilage articulaire. Dans ce dernier cas, le cartilage, jusqu'alors sain, se détache de l'os, s'amincit et se perfore; et ce qui prouve bien

(1) Bichat parle de cette capsule dans le système synovial, auquel elle lui a semblé appartenir plutôt qu'au système fibreux. Le fait est qu'elle n'a pas toujours la même apparence dans les différens cas.
(Béclard.)

que la maladie a commencé par l'os, c'est que l'ouverture reste plus petite à la surface libre du cartilage qu'à son côté adhérent, comme l'ont très-bien vu Palletta et M. Brodie, qui ont décrit cette altération, et comme je l'ai moi-même constaté.

La gangrène des os est la nécrose. Elle est suivie des mêmes phénomènes que celles des parties molles, si ce n'est qu'il faut un temps beaucoup plus long pour que l'inflammation, la suppuration et la séparation de la partie morte, qui prend ici le nom de *séquestre*, aient lieu. Mais cette nécrose varie en outre d'après son étendue, ainsi que suivant son siége. Elle est ordinairement le résultat de la destruction des vaisseaux nourriciers de l'os, par le détachement du périoste ou la destruction de la membrane médullaire. Quand c'est la membrane médullaire qui est lésée, la nécrose peut n'occuper que les lames internes de l'os; le séquestre est alors renfermé dans le canal médullaire, et a l'épaisseur de l'os en dehors à traverser avant de pouvoir être rejeté. Mais, dans d'autres cas, le périoste s'enflamme en même temps et se sépare de l'os; celui-ci se nécrose alors dans toute son épaisseur, et il arrive tous les phénomènes décrits plus bas à l'article du système médullaire; le périoste sécrète un nouvel os, lequel entoure l'os nécrosé. Il faut pour cela que cette membrane soit restée intacte; car si elle était détruite, il n'y aurait point de régénération. C'est à tort que Scarpa et d'autres ont nié cette régénération, et ont prétendu que ce qu'on regardait comme un nouvel os était toujours une partie de l'os ancien, dilatée par l'inflammation et que la nécrose avait épargnée. Le séquestre a toutes les formes de l'os ancien; on y retrouve toutes les saillies, les enfoncemens les plus superficiels: les nombreuses pièces que l'on possède à ce sujet ne laissent pas le moindre doute. Ce qui a pu en imposer aux auteurs dont nous venons de parler, c'est que l'os nécrosé s'use à sa surface et se recouvre d'inégalités. Le nouvel os a une forme irrégulière, et ressemble plutôt à une exostose ou à une sorte de végétation, qu'à un os qui existait primitivement. Enfin, dans les os larges, tels que l'omoplate, cela est encore bien plus frappant: il existe alors deux os de nouvelle formation, l'un en dehors, l'autre en dedans, et l'os ancien, nécrosé, est compris, dans l'intervalle.

Le décollement du périoste et la dénudation des os qui en est le résultat ne sont pas toujours suivis de nécrose, lorsqu'ils n'ont lieu que dans une certaine étendue. Si l'os n'est pas fortement contus, que le sujet soit jeune, et que les tégumens aient été réappliqués, on obtient la réunion immédiate par l'épanchement d'une matière coagulable. Cette matière présente, à une certaine époque, des points osseux irréguliers, qui ont fait croire à une exfoliation insensible ; ces points s'effacent ensuite.

Les solutions de continuité des os, ou les fractures, diffèrent suivant qu'il y a en même temps plaie aux parties molles, ou que ces parties recouvrent encore le lieu de la fracture. Les phénomènes sont tout différens dans l'un et l'autre cas. Ce n'est qu'aux fractures avec dénudation qu'il faut appliquer tout ce qui a déjà été dit précédemment de la formation du cal. Dans celles-là seulement naissent des bourgeons charnus, qui font ensuite la base de la cicatrice, qu'il y ait eu ou non exfoliation par la dénudation. Dans les autres, on doit subsistuer aux trois périodes indiquées, 1° une période d'exsudation, 2° une période de tuméfaction, 3° une période de réunion.

Première période. Le tissu osseux ne peut être divisé sans que les vaisseaux ouverts ne laissent écouler du sang : aussi s'épanche-t-il d'abord une certaine quantité de ce fluide entre les deux fragmens ; cette quantité est ordinairement peu considérable, et le sang s'arrête de lui-même au bout d'un temps assez court. Un autre fluide lui succède ; celui-ci est de nature séreuse et d'une consistance légèrement visqueuse. Le sang épanché perd peu a peu sa couleur rouge. La réunion s'opère dans le périoste, dans la membrane médullaire, et dans toutes les autres parties molles qui ont souffert par le seul effet de la fracture.

Deuxième période. Ces parties molles réunies, et le périoste en particulier, s'enflamment, se gonflent et s'écartent de l'os : de là une tumeur qui se manifeste au dehors. Cette tumeur est en grande partie formée par une matière coagulable épanchée au-dessous du périoste et entre ses lames internes. Des points osseux se forment dans cette matière, et finissent par l'envahir totale-

ment ; l'état cartilagineux est à peine sensible, et n'existe tout au plus que dans quelques points. Au défaut du périoste, le tissu cellulaire devient le siége de cette ossifieation, ainsi que l'a vu Maedonald. La membrane médullaire s'ossifie également.

Troisième période. Jusqu'ici il ne s'est presque rien passé dans l'os même : seulement les deux bouts se trouvent joints en dehors par une sorte de virole, en dedans par une cheville qui ferme le canal médullaire. Mais cette union n'a qu'une médiocre solidité ; et si l'os est de nouveau soumis à des efforts, même peu considérables, le cal peut céder et se plier, ou se rompre. Le travail de la réunion s'opère dans les fragmens eux-mêmes ; la substance intermédiaire qui remplit leur intervalle, de fluide qu'elle était, devient peu à peu plus consistante, et se pénètre de vaisseaux qui se continuent avec ceux du périoste et même de l'os. Cette substance ne tarde pas à s'ossifier : on ne sait pas au juste de quelle manière, quoiqu'on ait vu manifestement les vaisseaux s'y développer. En même temps que ces phénomènes ont lieu, le gonflement extérieur s'affaisse. A la longue l'ossification du périoste disparaît, le canal médullaire se reproduit, et les choses se rétablissent dans l'état où elles étaient avant la fracture.

Il y a donc dans la réunion des fractures, comme dans les plaies des parties molles, une cicatrice vasculaire, formée à peu près par le même mécanisme. Toute la différence consiste dans les changemens qu'éprouvent les parties environnantes, et qui donnent lieu au développement d'un os provisoire, avant que le cal définitif ne soit formé. Retranchez la seconde période, et le mode de réunion des os fracturés ne différera plus sensiblement de celui des parties molles.

On voit aussi ce qu'on doit penser des opinions si diverses qu'ont eues les auteurs sur la formation du cal. La plupart ne sont exclusifs que pour n'avoir observé le cal que dans une période de son développement. C'est ainsi que Duhamel, et après lui Fougeroux, M. Pelletan, avaient fort bien vu que le périoste s'ossifie ; mais ils lui attribuaient trop en pensant que c'était là ce qui constituait le cal. Or, cela ne paraîtra pas étonnant,

quand on saura que Duhamel ne suivait ses expériences sur le cal, d'ailleurs si recommandables, que pendant trente à quarante jours. De même, Boerhaave, Haller, Dethleef, avaient trouvé entre les fragmens une matière lymphatique, et s'en étaient tenus à cette observation. Presque de nos jours encore, Hunter, Macdonald, Howship, ont dit que c'est le sang épanché, et dont la matière colorante est absorbée, qui s'organise ensuite pour donner naissance au cal. D'autres, à l'exemple de Bordenave, ont été abusés par ce qui se passe quand la fracture est en contact avec l'air, et ont cru qu'il en était de même lorsque les fragmens ne sont point à nu : Bichat lui-même n'a pu éviter cette erreur. Quelques-uns, tels que Troja, Camper, ont plus approché de la vérité en adoptant une opinion mixte. Mais c'est surtout aux anatomistes modernes qu'est due la connaissance des faits que nous avons exposés. M. Dupuytren a observé ces faits un des premiers. On doit à MM. Breschet et Villermé un travail fort étendu sur cette matière.

Il est des fractures dans lesquelles il ne se forme point de cal osseux, mais seulement une cicatrice fibreuse qui unit lâchement les deux fragmens. C'est ce qu'on voit surtout pour les os qui, comme la rotule, l'olécrâne, le col du fémur, sont très-difficiles à maintenir parfaitement immobiles. Les mouvemens des fragmens et leur écartement sont en effet les seules causes de ce phénomène, que l'on regardait autrefois comme constant dans ces os et inhérent à leur structure, et qu'on cherchait à expliquer par une prétendue dilution du suc osseux, par l'absence du périoste, etc. On obtient le même résultat quand, sur un animal vivant, on resèque une portion d'un os long : si la distance est trop grande entre les deux bouts pour que leurs extrémités puissent se rejoindre en s'amincissant et se portant l'une vers l'autre, le cal est en partie fibreux ou fibro-cartilagineux. L'ouverture du trépan offre également cette particularité : lorsqu'elle est très-large, la cicatrice est complétée par une portion fibreuse. Au contraire, la réunion est immédiate, même dans les os qu'on n'en croyait pas susceptibles, dès que le rapprochement des fragmens est exact pendant le temps convenable. J'ai vu des rotules ainsi réunies ; desséchées et trempées dans l'essence de

térébenthine, afin que cette essence rendît la cicatrice transparente, dans le cas où elle aurait été fibreuse; elles sont restées osseuses partout. Ces cas sont, à la vérité, fort rares, parce que l'écartement est presque inévitable; qu'il peut survenir non-seulement à l'instant de la fracture, mais encore tant que la substance intermédiaire jouit de quelque extensibilité; que le cal lui-même cède quelquefois; et qu'il faut au moins deux ou trois mois pour que ce cal ait acquis toute sa solidité, au lieu de cinquante à soixante jours, comme on le croit communément. Cette issue des fractures est absolument analogue à ce qui arrive aux os longs, quand on meut continuellement leurs fragmens. Il en résulte une sorte de fausse articulation.

Les os sont rarement affectés de transformations organiques : ce point de leur histoire a d'ailleurs été jusqu'à présent assez négligé. Cependant on a décrit leur cancer, qu'on a appelé *ostéo-sarcôme;* mais il reste beaucoup à faire pour démêler tout ce qui a été désigné sous ce nom. On rencontre quelquefois dans les os la dégénération tuberculeuse. Ils sont aussi le siége de tumeurs comme charnues, qui interrompent totalement leur continuité, et dont le tissu a beaucoup de ressemblance avec celui des tumeurs cérébriformes, si ce n'est qu'il contient davantage de vaisseaux sanguins. La clavicule m'a plusieurs fois offert de ces tumeurs.

§ III. *Altérations dans le développement.*

Le système osseux est sujet à de fréquens vices de conformation; on les observe surtout aux os du crâne et au sternum.

La substance osseuse tend à se produire dans une foule de circonstances. Il n'est presque pas de partie qui ne s'ossifie par les progrès de l'âge. Les cartilages sont en première ligne, comme on l'a vu; puis viennent les fibro-cartilages, les tissus fibreux, sous le rapport de la fréquence de cette ossification. Le tissu cellulaire en est moins souvent le siége. Quant aux artères, c'est dans beaucoup de cas une sorte d'incrustation, plutôt qu'une véritable transformation osseuse. Le système vei-

neux, le musculaire, le nerveux, en offrent plus rarement des exemples. Les productions accidentelles ne sont pas exemptes de cette transformation : on trouve souvent des kystes tout osseux. L'état cartilagineux ne semble pas toujours précéder ces ossifications. (BÉCLARD.)

SYSTÈME MÉDULLAIRE.

Quoique le système médullaire ne se rencontre que dans les os, quoique ses usages principaux leur paraissent absolument relatifs, cependant ses propriétés et sa vie diffèrent tellement de la vie et des propriétés de ces organes, qu'on ne peut s'empêcher de l'examiner d'une manière isolée.

On distingue deux espèces de systèmes médullaires : l'un occupe le tissu celluleux des extrémités des os longs, de tout l'intérieur des os courts et plats ; l'autre se trouve seulement dans la partie moyenne des premiers : examinons-les chacun séparément.

ARTICLE PREMIER.

SYSTÈME MÉDULLAIRE DES OS PLATS, DES OS COURTS, ET DES EXTRÉMITÉS DES OS LONGS.

§ Ier. *Origine et Conformation.*

Ce système paraît être l'épanouissement des vaisseaux qui pénètrent dans les os par les trous du second ordre, c'est-à-dire par ceux qui vont se rendre dans le tissu celluleux commun. Ces vais-

seaux, arrivés à la surface interne des cellules, s'y divisent à l'infini, et s'y anastomosent de mille manières. Leur entrelacement donne à l'intérieur du tissu celluleux cet aspect rouge qui le caractérise, et qui est d'autant plus marqué qu'on l'examine dans un âge plus voisin de l'enfance, parce qu'en effet, le système vasculaire, qui y est très-prononcé à cette époque, se rétrécit et s'efface à mesure qu'on s'en éloigne.

Ce sont ces vaisseaux qui, dans la section des os du crâne par le trépan, donnent à la sciure la rougeur qu'on lui observe ; ce sont eux qui produisent le même phénomène dans l'amputation de l'extrémité des membres. Quoiqu'en général ils restent gorgés de beaucoup de sang à l'instant de la mort, cependant on peut, comme je l'ai fait souvent, y en accumuler encore plus par des injections fines, qui poussent devant elles celui qui se trouve dans les vaisseaux, et le concentrent à leur extrémité : alors le tissu spongieux de l'adulte est presque aussi rouge que celui de l'enfant qu'on n'a point préparé.

§ II. *Organisation.*

Les auteurs admettent une membrane fine qui tapisse l'intérieur de toutes les cellules osseuses, et qu'ils considèrent comme l'organe exhalant du suc médullaire. Je n'ai jamais pu, quelque nombreuses qu'aient été mes recherches, découvrir une semblable membrane ; on ne voit que les prolongemens vasculaires dont je viens de parler, lesquels, prodigieusement multipliés, paraissent en

effet former une membrane, mais qui, attentivement examinés, sont très-distincts les uns des autres, nullement continus, si ce n'est à l'endroit des anastomoses, et laissent une foule de petits espaces où l'os est immédiatement à nu, et en contact avec le suc médullaire.

L'exhalation de ce suc paraît donc uniquement provenir de cet entrelacement vasculaire, et sous ce rapport elle est analogue à celle de la substance compacte, qui évidemment ne contient point de membrane, et dont les pores cependant se trouvent remplis de ce suc médullaire, comme le prouvent la combustion du tissu compacte et son exposition au soleil ou à une chaleur artificielle.

§ III. *Propriétés.*

Cet entrelacement vasculaire ne jouit que de la sensibilité organique et de la contractilité organique insensible nécessaires à ses fonctions; et c'est ce qui le distingue spécialement du système médullaire de la partie moyenne des os longs, dont la sensibilité animale est, comme nous le verrons, extrêmement prononcée. Irritez sur un animal vivant l'intérieur d'un os court, plat, etc.; ou l'extrémité d'un os long, aucun signe de sensibilité animale ne se manifeste. La sciure du trépan, celle des condyles du fémur, de la tête de l'humérus, ne sont point douloureuses.

Les lésions de ce système, lorsqu'elles sont très-considérables, peuvent déterminer la nécrose de l'os et la formation d'une substance osseuse

nouvelle aux dépens du périoste; mais si une petite portion est seulement intéressée, ce phénomène ne s'observe point. J'ai percé plusieurs fois transversalement avec une vrille l'extrémité d'un os long sur un animal, et un fer rouge a été ensuite passé par l'ouverture : l'animal a toujours guéri sans nécrose : seulement l'articulation est restée engorgée, très-gênée dans ses mouvemens, et diverses esquilles s'en sont échappées pendant la suppuration.

§ IV. *Développement.*

Le réseau vasculaire qui forme ce système médullaire existe dans l'état cartilagineux; mais alors, d'une part, il n'admet point la portion rouge du sang; de l'autre part les interstices de ses mailles se trouvent tellement remplis par la gélatine que le cartilage paraît homogène. A l'époque de l'ossification, le sang rouge pénètre d'un côté dans les vaisseaux, tandis que, d'un autre côté, ces vaisseaux restent à nu par l'absorption de la gélatine, à l'endroit des cellules sur la surface interne desquelles ils rampent.

Dans le fœtus et dans le premier âge, ce système médullaire offre une disposition remarquable : il ne contient presque point de ce suc huileux dont il emprunte son nom, et qui, dans la suite, remplit en si grande proportion les interstices du tissu celluleux des divers os : en examinant ces organes comparativement dans les divers âges, je m'en suis facilement convaincu. 1°. Exposé à un degré de chaleur un peu considérable, le tissu celluleux des os d'adulte laisse écou-

ler en abondance ce suc huileux, qui se fond. De la même expérience résulte seulement, dans le fœtus, la dessiccation de ce tissu par l'évaporation des fluides qui le pénètrent. 2°. Si on brûle l'extrémité d'un os long d'adulte, la combustion est spontanément entretenue par le suc huileux qui s'échappe des pores de la seconde espèce, et qui donne de la flamme jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Dans le fœtus, l'os cesse de brûler dès qu'on le retire du feu, parce que les fluides qu'il contient n'entretiennent point sa combustion. 3°. Rien n'est plus difficile que de conserver blancs les os d'adulte, parce que l'huile qui en pénètre les intervalles les jaunit toujours un peu. Dans le fœtus et l'enfant, où cette cause n'existe pas, la blancheur des os est facile à obtenir. 4°. Par l'ébullition on n'extrait point ou presque point d'huile du tissu celluleux dans le premier âge; beaucoup nage à la surface de l'eau où l'on a mis bouillir ce tissu dans les âges suivans. En général, le fœtus paraît absolument manquer d'huile médullaire : elle se forme après la naissance, et sa proportion va toujours en augmentant, jusqu'à l'entier accroissement. Quel fluide remplace celui-ci dans les premières années? D'abord beaucoup de sang; car, en général, la rougeur du système médullaire est en raison inverse de l'huile qui s'y trouve; mais les intervalles des cellules paraissent de plus être humides d'un autre fluide qu'on ne connaît pas, et qui s'évapore, comme je l'ai dit, lorsqu'on présente au feu l'os d'un fœtus.

ARTICLE II.

SYSTÈME MÉDULLAIRE DU MILIEU DES OS LONGS.

Ce système diffère essentiellement du précédent par sa nature, ses propriétés, ses fonctions, etc. Il occupe le centre des os longs, dont il remplit la grande cavité.

§ Ier. *Conformation.*

Chacun des organes de l'ensemble desquels il résulte se présente sous la forme d'une membrane mince, tapissant toute la cavité, se repliant sur elle-même un grand nombre de fois, donnant naissance à une foule de prolongemens, dont les uns enveloppent les filets déliés du tissu celluleux qui se rencontrent dans cette cavité, les autres passent, sans adhérer à aucune portion osseuse, d'un côté de la membrane à l'autre, et tous forment des cellules nombreuses où se trouve contenue la moelle.

On peut donc se former de cet organe une idée analogue à celle que nous présente l'organe cellulaire, savoir, celle d'un corps spongieux à cellules communicantes. La place qu'il occupe donne à son ensemble une forme cylindrique.

Il paraît qu'aux deux extrémités du canal, les cellules ou membranes ne s'ouvrent point dans celles du tissu celluleux, et que le suc médullaire du système précédent ne communique nullement avec la moelle de celui-ci. En effet, la ligne de démarcation

qui les sépare est sensible ; ils ne se confondent point d'une manière graduelle : l'air injecté d'un côté du cylindre médullaire ne pénètre qu'avec peine et en déchirant les membranes dans le tissu celluleux de l'extrémité opposée de l'os. Cependant, malgré ces considérations, j'avoue que la question n'est point exactement résolue. Les transsudations cadavériques sont nulles pour la décider, à cause de la perméabilité que nos parties acquièrent après la mort.

§ II. *Organisation.*

La texture de la membrane médullaire est très-peu connue, parce que son extrême ténuité la dérobe à nos recherches; car ce n'est que dans les os des rachitiques que son augmentation morbifique en épaisseur m'a permis d'en poursuivre exactement le trajet. Elle a l'apparence du tissu cellulaire ; cependant ses propriétés, et par là même sa nature, sont très-différentes de celles de ce tissu. Elle ne peut se rapporter à aucune des trois classes des membranes séreuses, fibreuses ou muqueuses. Quelques-uns ont prétendu qu'elle était une expansion du périoste, qui s'insinue par les trous nombreux dont l'os est percé, et pénètre dans la cavité médullaire : mais le moindre parallèle établi entre ces membranes suffit pour faire voir qu'essentiellement différentes par leurs fonctions, leurs forces vitales, etc., elles ne peuvent avoir la même texture. Un vaisseau principal pénètre la membrane médullaire : c'est l'artère qui entre par le trou unique, mais très-marqué, qui se voit sur le corps des os longs; les deux

branches de cette artère, et celles de la veine correspondante, se ramifient en sens opposé sur le cylindre médullaire, et, par l'innombrable quantité de leurs rameaux, lui donnent une couleur rougeâtre très-marquée et qui disparaît avec l'âge. Les extrémités empruntent leurs vaisseaux de ceux du tissu celluleux voisin. On ne peut y suivre aucun nerf. Telle est quelquefois l'abondance des fluides qui pénètrent cette membrane, et son extrême ténuité, qu'on dirait vraiment qu'elle n'existe pas. Pour vous convaincre de son existence, exposez le cylindre qu'elle forme à l'action très-intense du calorique: elle se resserre, se racornit aussitôt comme tous les solides, et devient ainsi plus apparente (1).

---

(1) On fait cette expérience en scianl un os long, qu'on plonge ensuite dans l'eau bouillante : la membrane s'éloigne de l'os et s'applique sur la graisse, ce qui permet de la mieux apercevoir. On peut encore se servir des acides minéraux affaiblis, qui produisent le même effet.

Entièrement détachée de l'os, cette membrane ressemble, en quelque sorte, à une toile d'araignée; elle est percée d'une multitude d'ouvertures. Elle a pour base du tissu cellulaire et des vaisseaux. Le premier est très-rare et n'a d'autre usage que de soutenir les ramifications vasculaires. Parmi ces dernières, les unes, très-bien décrites par Duverney, se jettent en dehors, dans le tissu osseux; les autres se portent en dedans, vers les prolongemens de ce tissu et de la membrane elle-même. L'artère principale du canal médullaire est entourée de vaisseaux absorbans à son entrée dans ce canal. Un plexus nerveux manifeste se remarque également autour d'elle, sur les os qui sont le plus près du tronc.

En outre, des vésicules adipeuses, du même genre que celles du tissu cellulaire, quoiqu'elles soient un peu moins distinctes,

§ III. *Propriétés.*

Les propriétés de tissu sont très-caractérisées dans l'organe médullaire. 1°. Le spina-ventosa, où cet organe se distend d'une manière très-sensible avec le corps de l'os, prouve son extensibilité. 2°. Sa contractilité de tissu est caractérisée par le retour des cellules sur elles-mêmes après l'amputation de la partie moyenne d'un os long, retour qui empêche l'écoulement de la moelle, qui sans cela serait inévitable, à cause de la communication de ces cellules.

Il est probable que la contractilité organique insensible, dont l'exercice est déterminé alors par le contact de l'air sur cette membrane qui se crispe sous son irritation, influe aussi sur ce phénomène : car ce mode de contractilité, ainsi que la sensibilité

---

contiennent la moelle et occupent l'intérieur de la membrane médullaire, logées dans les intervalles celluleux que présente cette dernière; on ignore s'il s'en trouve aussi dans le tissu spongieux des extrémités. Les auteurs avaient indiqué depuis long-temps que la moelle est formée de petits grains réunis en grappe, comme on le voit surtout lorsqu'elle est récente et qu'elle n'a pas encore perdu la consistance qui lui est propre. Mais on croyait que ces vésicules communiquent toutes entre elles, comme on le pensait alors du tissu adipeux. G. Hunter, Mascagni et plusieurs autres, ont vu qu'elles sont fermées. La description qu'ils en ont donnée, tant par l'inspection directe que d'après l'analogie, y montre une disposition semblable à celle du tissu adipeux. Nous ne reviendrons pas sur cette disposition. (Béclard.)

correspondante, sont évidemment le partage de cette membrane.

La sensibilité animale y est développée d'une manière exquise dans l'état naturel : les douleurs les plus aiguës sont le résultat de l'action que la scie exerce sur elle dans l'amputation, de l'introduction d'un stylet, de l'injection d'un fluide irritant dans la cavité médullaire, ou de tout autre moyen qui l'excite très-vivement (1). Je ne parle pas des douleurs osseuses dans le spina-ventosa, la vérole, etc.: comme la membrane n'est point alors dans son état naturel, on ne peut en tirer des conséquences pour juger du mode des forces vitales dont elle est naturellement douée. J'ai observé que sa sensibilité est d'autant plus marquée qu'on approche davantage du centre précis de l'os avec le stylet qu'on y pousse, dans les animaux vivans. A l'extrémité du canal médullaire, cette sensibilité est peu marquée; au milieu, la section de l'os est extrêmement dou-

---

(1) Ce phénomène n'est pas constant : la douleur est souvent nulle dans ce cas; mais il ne faut pas en conclure, comme on l'a fait, que la sensibilité de la membrane médullaire n'existe pas. Dans les amputations faites chez l'homme, la douleur causée par la section des parties molles, et surtout de la peau, est tellement intense, que celle moins forte que produit la lésion de la membrane médullaire, qui lui succède presque immédiatement, est à peine sentie. Mais si, sur un animal vivant, on suspend l'opération après la section des parties molles, pour la reprendre quand une fois cette première impression est en partie dissipée, la sensation est vivement perçue, et l'animal jette des cris douloureux. La sensibilité de la moelle, déjà reconnue par Duverney, niée depuis, est donc réelle. (Béclard.)

loureuse. D'où dépend cette inégalité de force sensitive, ce décroissement du centre aux extrémités? Je l'ignore. La contractilité animale et la contractilité organique sensible sont manifestement étrangères au système médullaire.

Il est évident, d'après cet exposé des forces vitales qui animent ce système, que la vie y est beaucoup plus active que dans le système osseux, que les phénomènes vitaux doivent y être par conséquent plus rapides, s'écarter de cette marche chronique qui caractérise toutes les maladies des os, répondre avec plus de promptitude aux excitations sympathiques des autres organes. Je suis persuadé que beaucoup de douleurs vagues qu'on rapporte ordinairement aux os dans les maladies, ont plutôt leur siége dans le système médullaire, dans celui du milieu des os longs surtout: remarquez en effet que la plupart de ces douleurs sont fixées au milieu des membres, qu'elles existent vraiment dans le sens de ce système. Le système médullaire des extrémités des os longs, des os plats et courts, jouit certainement aussi de plus d'énergie vitale que le tissu osseux lui-même; l'inflammation y est plus facile à se développer; ses effets sont plus prompts à se manifester. Qui ne sait que la carie est d'autant plus rapide que plus de tissu celluleux existe dans les os? Ce n'est pas ce tissu qui, par sa nature, influe sur ce phénomène; mais c'est que plus il est abondant, plus le système médullaire y prédomine: or, comme celui-ci participe à toutes ses affections, il leur imprime une rapidité qu'elles n'ont point dans le tissu compacte, où il n'existe pas.

§ IV. *Développement.*

Cette membrane existe dans l'état cartilagineux de la partie moyenne des os longs ; mais alors elle sert de parenchyme nutritif à la gélatine qui s'y exhale, et qui, accumulée en très-grande quantité dans ses cellules, rend l'os homogène en apparence, et empêche de la distinguer. Quand l'ossification se fait, cette substance est absorbée ; la cavité médullaire se forme ; la membrane médullaire reste à nu ; le sang pénètre dans ses vaisseaux, jusque-là accessibles seulement à des fluides blancs, parce que son mode de sensibilité organique change. Au lieu de recevoir de la gélatine dans ses cellules, c'est la moelle ou un autre fluide qu'elle y admet, phénomène également dépendant de ce changement de sensibilité organique. De là une forme extérieure toute nouvelle, un organe nouveau formé en apparence, tandis qu'en réalité ce n'est pas l'organe qui change, mais le fluide qui s'y sépare. Le même phénomène s'observe à peu près dans la formation du cal, où la portion de membrane médullaire correspondant à la fracture est d'abord cartilagineuse, puis osseuse, et redevient enfin ce qu'elle était primitivement.

Cependant l'exhalation de la moelle ne commence pas dès que le sang aborde dans le canal médullaire, ou plutôt elle commence bien, mais j'ai trouvé qu'elle est toute différente de ce qu'elle sera chez l'adulte. La proportion de la substance huileuse y est presque nulle, ainsi que nous l'avons vu

dans le suc médullaire. 1°. Elle se présente sous un aspect mucilagineux et rougeâtre; pressée entre les doigts, elle n'y laisse point une huile comme chez l'adulte, mais un fluide comme gélatineux; 2°. En comparant l'eau qui a servi à l'ébullition de la moelle dans ces deux âges, on ne voit point dans le premier, comme dans le suivant, surnager une foule de gouttelettes huileuses. 3°. Exposé à l'action du feu, le milieu d'un os long laisse tomber une infinité de gouttelettes enflammées, d'une teinte bleuâtre très-agréable à l'œil, et qui sont fournies par la moelle qui brûle après s'être fondue. Rien de semblable ne s'observe dans le fœtus. 4°. On sait que le goût de la moelle est bien différent dans les jeunes animaux, dans le veau, par exemple, de ce qu'il est dans les animaux adultes. Elle est fade, peu agréable, peu recherchée dans les premiers. 5°. J'ai observé que la moelle des enfans se putréfie avec promptitude, devient verdâtre, puis noirâtre, pour peu que leurs os frais aient été gardés pendant quelque temps à l'air. L'odeur de cette moelle putréfiée est très-fétide. Conservez, au contraire, pendant un certain temps des os d'adulte dépouillés, vous observerez que leur moelle rancit, devient d'un jaune foncé, comme toutes les graisses qui ont été gardées. En général, l'action de l'air est toute différente sur l'organe médullaire dans le premier âge et dans les suivans. Quelle est le fluide que sépare spécialement cet organe dans le fœtus et l'enfant, et qui remplace alors la substance huileuse? C'est un objet intéressant de recherches. Est-ce que le vulgaire, qui allie l'idée

de graisse à celle de moelle, connaît ce phénomène, quand il dit que les enfans n'ont pas encore de moelle dans les os? Cette absence de graisse médullaire dans le fœtus distingue essentiellement la moelle de la graisse ordinaire, qui, à cet âge, est déjà très-abondante (1).

Fonctions.

Le premier et principal usage de l'organe médullaire est de séparer la moelle de la masse du sang par voie d'exhalation, car elle n'a point de glandes, et de l'y réintroduire ensuite par absorption, dès qu'elle a séjourné pendant un certain temps dans son réservoir. Ce double phénomène est très-analogue à celui qui a lieu pour la graisse: d'où l'on voit que deux ordres de vaisseaux distincts des sanguins entrent de plus dans son tissu; il n'est pas

---

(1) La graisse des os, en manquant dans le fœtus, a cela de commun avec celle des parties profondes en général, qui en sont alors presque totalement dépourvues. Au reste, non-seulement il n'y a pas de moelle à cet âge, mais il n'y a pas non plus de membrane médullaire. Bichat ne veut pas que cette membrane soit un nouvel organe, mais il est évident que rien n'indique sa présence avant l'ossification. Lorsque, plus tard, le canal médullaire commence à se former, l'artère nourricière le remplit d'abord en entier; ce n'est qu'à une époque ultérieure que cette artère est rejetée sur les parois de la cavité et que la membrane médullaire existe.

La moelle devient très-abondante chez le vieillard, à cause de l'agrandissement de la cavité médullaire. (Béclard.)

possible cependant de les y démontrer anatomiquement.

L'activité de l'exhalation varie-t-elle suivant l'exercice ou le repos, la chaleur ou le froid, l'embonpoint ou la maigreur? Nous n'avons sur ce fait aucune expérience précise, quoiqu'on ait fait là-dessus une foule de conjectures. Mais ce que nous savons, c'est que, dans la phthisie, l'hydropisie et le marasme, et en général dans tous les états du corps où la débilité générale est portée à l'extrême par la perte lente et graduée des forces, la moelle, comme les autres fluides, comme les solides aussi, se dénature, perd ses caractères essentiels, sa consistance, et prend une apparence toute différente, sans que cependant la membrane médullaire éprouve de lésion organique, sans qu'elle s'épaississe. Je n'ai encore observé cette lésion que dans le rachitisme. L'aspect de la moelle dans ces maladies est mucilagineux, gélatineux, semblable, pour ainsi dire, à celui qu'elle nous offre dans le fœtus, à la différence près de la rougeur que détermine dans le premier âge le grand nombre des vaisseaux sanguins.

La membrane médullaire a un rapport direct avec la nutrition de l'os, rapport qui a été mis en évidence par les belles expériences de Troja, desquelles il résulte que la destruction de cette membrane entraîne la mort de l'os, qui se nécrose et qui est remplacé par un os nouveau, auquel le périoste sert de parenchyme nutritif. Ces expériences se font ordinairement en sciant un os long à son extrémité, et en introduisant dans la cavité médullaire un stylet rougi au feu, qui désorganise tout. Bientôt après

le périoste se gonfle, s'enflamme et devient d'une extrême sensibilité au contact extérieur. Peu à peu cette sensibilité s'émousse, l'inflammation disparaît, beaucoup de gélatine pénètre les lames internes de cette membrane, qui devient un sac cartilagineux dont l'os est enveloppé. Au bout d'un temps qui varie suivant la classe des animaux soumis à l'expérience, suivant leur âge, leur tempérament, et suivant d'autres causes, le système vasculaire, détruit au dedans du canal, et replié en totalité sur le périoste, y dépose le phosphate calcaire destiné à l'os. Au cylindre cartilagineux succède alors un cylindre osseux: l'os au dedans est un corps étranger à la vie, qu'un corps vivant entoure de toutes parts. Il y a donc dans les ossifications artificielles trois périodes bien distinctes: 1° gonflement et inflammation du périoste, 2° état cartilagineux des lames internes de cette membrane, 3° état osseux. Au reste, ces deux derniers états ne sont point aussi réguliers et distincts, ni aussi faciles à observer que dans l'ossification naturelle.

La membrane médullaire sert-elle indirectement à fournir une partie de la synovie par la transsudation de la moelle à travers l'extrémité des os longs? La plupart des auteurs l'affirment. On sait aujourd'hui ce qu'il faut penser de ces transsudations mécaniques qu'on observe dans les cadavres, mais qui répugnent aux phénomènes connus de la vitalité: d'ailleurs, l'expérience suivante ne laisse aucun doute sur ce point. J'ai ouvert sur les côtés deux os longs d'un des membres postérieurs d'un chien, de manière à y faire parvenir un stylet rougi, qui, y

ayant été porté à plusieurs reprises, a détruit complétement les deux systèmes médullaires : la nécrose a été le résultat assez prompt de cette expérience ; et cependant l'articulation intermédiaire aux deux os nécrosés a continué comme à l'ordinaire à recevoir la synovie, circonstance qui ne serait pas arrivée si la transsudation de la moelle était nécessaire à la production de ce fluide. Qui ne sait, d'un autre côté, que, dans les maladies des articulations où la synovie est altérée, viciée, la moelle des os correspondans est presque toujours dans un état d'intégrité parfaite (1), et que, réciproquement, dans les maladies qui attaquent l'organe médullaire,

---

(1) On peut joindre à ces motifs pour ne pas admettre la production de la synovie par la transsudation de la moelle à travers les extrémités articulaires, ceux que donne Sœmmering, savoir, que la moelle est précisément plus abondante dans l'endroit le plus éloigné des extrémités, et que les enfans, qui n'ont pas de moelle, et dont les extrémités sont toutes cartilagineuses, n'en ont pas moins de synovie dans leurs articulations. Ce dernier fluide se rencontre d'ailleurs dans beaucoup d'endroits où l'autre ne peut évidemment pénétrer, comme autour des tendons, dans les bourses muqueuses, soit naturelles, soit accidentelles; enfin, il y a une différence totale de propriétés, de composition, entre lui et la graisse médullaire.

Divers usages, non moins hypothétiques, ont été encore attribués à la moelle. On l'a crue propre à donner de la flexibilité, de la ténacité aux os : c'était l'opinion de Duverney. Mais si l'on se souvient que les os des jeunes sujets sont les moins susceptibles de se rompre; que ceux des vieillards, qui contiennent tant de moelle, sont au contraire les moins résistans, on n'aura point égard à cette opinion, qui ne repose que sur un seul fait, c'est que les os réduits par la combustion à leur matière calcaire re-

la synovie n'est point altérée dans sa nature comme le fluide que cet organe renferme dans ses cellules (1)?

---

prennent en partie leur solidité quand on les fait bouillir dans de l'huile ; mais la même chose a lieu avec toute autre substance, avec la gélatine, par exemple, et il y a loin d'un os que la combustion a détruit en partie, à celui qui contient encore tous ses principes.

Les anciens disaient que la moelle servait à nourrir le tissu osseux ; mais il suffit qu'il y ait un grand nombre d'os dépourvus de graisse médullaire pour que cela ne soit point admissible. La membrane médullaire fait au dedans de l'os l'office du périoste ; elle contient les vaisseaux nourriciers, et c'est sous ce rapport seulement qu'elle sert à la nutrition. Quant à la moelle, elle doit avoir les mêmes usages généraux que la graisse ; c'est une sorte d'aliment en réserve, une des formes que doit revêtir la matière nutritive. Elle sert en outre à remplir le vide qui sans elle existerait dans le canal médullaire. (BÉCLARD.)

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME MÉDULLAIRE.

Les altérations de ce système n'ont pas été assez étudiées pour qu'on puisse en présenter le tableau complet. Nous nous bornerons ici à un simple aperçu.

Il est très-probable que, comme le dit Bichat, la membrane médullaire des os longs est affectée dans les douleurs de la syphilis. En effet, une légère percussion exercée à la surface de l'os excite ces douleurs, à cause de l'ébranlement qui se communique à la moelle. Du reste, on ignore complétement quelle espèce d'altération éprouve cette dernière.

Dans les amputations, la matière huileuse des os est absorbée au voisinage de la plaie ; la membrane médullaire se couvre de bourgeons charnus, et concourt à la formation de la cicatrice. Il a déjà été question de ce qui arrive après les fractures : une sorte de bouchon endurci remplit le canal médullaire ; ce canal

se rétablit ensuite, à moins que la réunion ne soit pas exacte entre les fragmens, comme quand ils chevauchent l'un sur l'autre. Dans les nécroses qui comprennent le canal médullaire, lorsque l'os ancien a été retiré, il reste une membrane rougeâtre qui tapisse le nouveau; mais la moelle ne se reproduit pas.

Le spina-ventosa est une affection propre de la moelle; c'est un véritable cancer de la membrane médullaire, différent du cancer de l'os, de celui qui affecte le périoste, mais analogue à ces affections, quant à sa nature. La maladie a ordinairement son siége près des extrémités; à la jambe, c'est vers le bout supérieur; à la cuisse, vers l'inférieur, qu'elle exerce le plus souvent ses ravages. Il peut se faire que le tissu osseux soit en même temps altéré; mais souvent ce tissu est sain et n'a éprouvé qu'une dilatation plus ou moins grande, une simple extension. On trouve alors que l'os forme à la tumeur une enveloppe, quelquefois prodigieusement dilatée, souvent perforée et traversée par des végétations de nature cancéreuse : c'est ce que j'ai eu plusieurs fois occasion d'observer.

La graisse médullaire varie beaucoup en quantité suivant l'état de l'embonpoint; mais le canal médullaire est toujours plein d'un fluide qui approche plus ou moins de la moelle. Chez les sujets gras, la moelle m'a paru contenir, sur huit parties, sept de matière huileuse et une de matière étrangère. Cela s'accorde avec ce qu'avait annoncé Grützmacher. Sur un phthisique, j'ai vu la graisse ne plus former que le quart; le reste était un fluide séreux ou albumineux semblable à celui dont parle Bichat. (pag. 159). Il serait donc possible que, dans la maigreur extrême, il n'y eût presque plus rien en matière grasse.

(BÉCLARD.)

SYSTÈME CARTILAGINEUX.

Le mot *cartilage* est trop vaguement employé: il désigne, dans l'acception commune, des corps dont l'organisation diffère essentiellement. Certainement les cartilages du nez et ceux des surfaces articulaires n'ont entre eux qu'une analogie très-indirecte: il faut donc établir, dans ces généralités, une ligne de démarcation. J'ai tâché de le faire en formant deux systèmes de celui-ci : l'un comprend les cartilages proprement dits, l'autre les substances fibro-cartilagineuses, telles que celles qui sont entre les vertèbres, celles du milieu de certaines articulations, etc. Comme celui-ci est un composé des systèmes cartilagineux et fibreux, je n'en traiterai qu'après avoir parlé de ce dernier.

En rétrécissant ainsi le sens du mot *cartilage*, il nous présente l'idée d'une substance dure, élastique, blanchâtre, ayant une apparence inorganique, quoique son organisation soit très-réelle. On trouve cette substance animale en différentes parties du corps; elle se rencontre spécialement, 1° aux extrémités articulaires des os mobiles, 2° aux surfaces articulaires des os immobiles, 3° dans les parois de certaines cavités qu'elle concourt spécialement à former: tels sont les cartilages de la

cloison nasale, des côtes, du larynx, etc. De là trois classes différentes qui présentent des variétés dans leurs formes, dans leur organisation, etc. (1).

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES DU SYSTÈME CARTILAGINEUX.

Les formes cartilagineuses varient suivant la classe à laquelle appartient le cartilage.

§ Ier. *Formes des Cartilages des Articulations mobiles.*

Dans toute articulation mobile, il y a, à chaque extrémité osseuse, un cartilage qui encroûte cette extrémité, qui facilite par sa souplesse le mouvement des deux os, dont la substance trop dure éprouverait, en se frottant, un choc trop fort, qui réfléchit, en se comprimant d'abord et en revenant ensuite sur lui-même, une partie considérable du mouvement devenu par là plus étendu, qui amollit, en cédant un peu, l'effet des violentes secousses qu'éprouvent les membres, et qui rend ainsi ces secousses moins dangereuses.

Le caractère général de conformation extérieure

---

(1) Il faut y joindre les fibro-cartilages membraneux, qui sont de vrais cartilages, comme nous le verrons par la suite.
(BÉCLARD.)

propre à ces cartilages est d'être toujours beaucoup moins épais que larges, d'avoir cependant une épaisseur qui est en raison de la largeur, en sorte que les cartilages des grandes articulations excèdent deux, trois, quatre fois même, sous ce rapport, ceux des articulations peu étendues; de se mouler sur les formes articulaires, de présenter deux faces et une circonférence.

L'une des faces est adhérente à l'os; elle y tient d'une manière si intime, que la fracture arrive plutôt en tout autre endroit qu'à celui-ci. Le moyen d'union n'est pas exactement connu : ce qu'il y a de certain, c'est que le cartilage n'est pas un prolongement, une suite du parenchyme cartilagineux de l'os; les fibres de ce parenchyme ne sont point continues avec celles des cartilages. Si cela était, en effet, en enlevant à un os long, frais et revêtu de son cartilage, le phosphate calcaire qui le pénètre, on devrait voir cette continuité, l'os et le cartilage ne devraient plus différer : or, j'ai constamment observé, dans cette expérience, que l'action de l'acide fait détacher le cartilage de dessus l'os, soit par fragmens, soit en totalité. On voit les fibres cartilagineuses de l'os privé de sa base saline se terminer manifestement à la surface convexe qu'embrasse le cartilage; il n'y a point eu de solution de continuité. En général, l'aspect du parenchyme cartilagineux isolé de sa portion calcaire est tout différent de celui d'un véritable cartilage. Je présume que cette différence tient à la quantité de gélatine, qui est plus grande dans le second que dans le premier. L'action des acides, du nitrique

surtout, est le moyen le plus avantageux pour séparer un cartilage de sa tête osseuse; la macération ne produit ce phénomène qu'à la longue; dans l'ébullition, comme la gélatine se fond, il est moins apparent.

La surface du cartilage opposée à l'os est intimement unie à la synoviale de l'articulation. Elle en empunte le poli qui la distingue; car partout où ces substances ne correspondent point à cette membrane, elles perdent ce caractère, comme on le voit au larynx, aux cartilages costaux, etc. Ici le moyen d'adhérence est un tissu cellulaire extrêmement serré, que la macération ni la dissection ne peuvent enlever par lames. Comme la synoviale est toute formée de ce tissu, il paraît que, sur le cartilage, elle n'est qu'un prolongement de celui qui, après avoir concouru à la contexture de cet organe, se condense à sa surface, et s'y organise en membrane.

La circonférence des cartilages qui nous occupe se termine insensiblement sur la surface osseuse; elle y cesse comme en mourant, à l'endroit où la synoviale abandonne l'os pour se réfléchir.

Les deux cartilages correspondans d'une articulation mobile sont tellement disposés et moulés l'un sur l'autre, que, dans la position moyenne de l'articulation, ils se touchent exactement par tous leurs points : or, on sait que la position moyenne d'une articulation est celle où l'os n'incline pas plus dans un sens que dans un autre, où tous les muscles, uniformément contractés et se faisant entre eux une égale résistance, le forcent à s'éloigner

également de l'extension et de la flexion, de l'adduction et de l'abduction, etc., etc., et à tenir le milieu précis. C'est cette position qu'affectent les membres lorsque la volonté ne dirige point l'effort musculaire, comme, par exemple, chez le fœtus, dans le sommeil, dans le repos, etc.; c'est elle que déterminent certaines convulsions où tous les muscles d'un membre sont agités avec un effort égal par l'influx extraordinaire des nerfs, etc. Dans toute autre position, jamais le contact de deux cartilages articulaires ne se fait par tous leurs points; toujours une portion de la surface de chacun pousse avec plus ou moins de force les parties environnant l'articulation, et les distend. La mollesse du tissu cartilagineux rend moins pénible cette pression, dont le sentiment serait douloureux dans les grands mouvemens, si les os gardaient leur dureté à l'extrémité du levier qu'ils représentent.

Les formes cartilagineuses qui nous occupent, outre ces caractères communs, en ont de particuliers à chaque genre d'articulations mobiles.

1°. Dans le premier genre, la croûte convexe qui recouvre la tête osseuse présente de l'épaisseur au centre, mais très-peu à la circonférence. Une disposition inverse se remarque à l'encroûtement concave qui reçoit cette tête; souvent même, comme à l'humérus, au fémur, l'épaisseur de cet encroûtement est augmentée, à sa circonférence, par un bourrelet fibro-cartilagineux. De cette manière, l'effort est supporté inégalement par l'un et l'autre cartilage, dans leurs diverses parties; mais l'uniformité du contact est assurée.

2°. Dans le second genre, qui diffère du premier par l'absence du mouvement de rotation, comme en général une convexité est aussi reçue dans une concavité, la disposition est à peu près la même pour les deux cartilages. Cependant si deux surfaces convexes glissent l'une sur l'autre, comme le condyle de la mâchoire et l'apophyse transverse nous en offrent un exemple, alors le cartilage va toujours en s'amincissant à la circonférence de chacune; mais alors un cartilage inter-articulaire, épais à sa circonférence, mince au milieu, supplée à cette disposition, et établit sur tous les points un contact qui sans lui ne s'exercerait qu'au centre.

3°. Dans le troisième genre, la croûte cartilagineuse qui tapisse les saillies et les enfoncemens qui se reçoivent réciproquement sur les extrémités des deux os présente à peu près une épaisseur uniforme, comme on le voit au coude, au genou, etc.; en sorte que la pression se répartit également sur toute la surface articulaire.

4°. Dans les quatrième et cinquième genres, les encroûtemens cartilagineux, moulés sur la forme des surfaces osseuses, ont aussi une épaisseur à peu près uniforme dans tous leurs points. J'ai trouvé sur les os d'un adulte, que cette épaisseur est d'une ligne et demie dans les articulations radio-cubitale, atloïdo-axoïdienne, d'une ligne dans les articulations carpiennes, métacarpiennes, etc.

§ II. *Formes des Cartilages des Articulations immobiles.*

Les cartilages ne se rencontrent que dans deux genres des articulations immobiles, savoir, dans celles à surfaces juxtaposées, et celles à surfaces engrenées. Ils forment dans tous une couche extrêmement légère, continue aux deux os qui s'articulent ensemble, naissant de leur portion osseuse, comme ceux décrits précédemment, étant de même nature qu'elle, et formant un lien d'autant plus serré qu'on avance plus en âge.

A la tête, ces sortes de cartilages sont très-multipliés; ceux du crâne ont plus d'épaisseur du côté de sa convexité que du côté de sa concavité : de là la disparition plus prompte des sutures dans le dernier que dans le premier sens.

Partout où ils se trouvent, ils concourent à unir des os qui forment des cavités : de là, comme nous l'avons dit, moins de danger pour celles-ci de la part des corps extérieurs, puisque le mouvement, perdu alors en partie dans leur tissu mou, produit un effet bien moindre que si la cavité était d'une seule pièce osseuse.

Il paraît que ces cartilages ont beaucoup plus d'affinité avec le phosphate de chaux, que ceux des articulations mobiles : ceux-ci s'ossifient rarement, tandis qu'à un âge avancé ceux-là deviennent toujours osseux, comme le crâne nous en fournit surtout des exemples. Je remarque cependant que les cartilages des surfaces engrenées ont plus de ten-

dance à l'ossification que ceux des surfaces juxtaposées: au moins est-il plus commun de voir les pariétaux soudés entre eux, avec l'occipital, et avec le coronal, que de voir la réunion des maxillaires, des os palatins, etc.

§ III. *Formes des Cartilages des Cavités.*

Les cartilages des cavités affectent deux formes différentes, suivant les parties qu'ils concourent à former. Ils sont, 1° longs, comme aux côtes; 2° plats, comme au larynx, à la cloison nasale, etc.

Tous sont tapissés, à l'extérieur, d'une membrane fibreuse identique au périoste, et à laquelle s'implantent différens muscles. Pour bien voir cette membrane, il faut faire macérer pendant un jour ou deux le cartilage: elle blanchit alors sensiblement, devient par là très-manifeste dans son épaisseur, dans la direction de ses fibres, etc. Les cartilages des cavités ne présentent point les trous nombreux qu'on remarque sur les os, parce que les vaisseaux sanguins ne les pénètrent point. Peu d'éminences s'y observent; des enfoncemens s'y trouvent rarement creusés. Au reste, on ne peut guère considérer leurs formes d'une manière générale, parce que, destinés chacun à des usages très-différens, ils ont entre eux peu d'analogie de conformation.

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME CARTILAGINEUX.

A voir un cartilage dans son intérieur, il est difficile d'y reconnaître une texture organique ; elle y est très-réelle cependant, et se compose d'un tissu propre et de tissus communs.

§ Ier. *Tissu propre au Système cartilagineux.*

Le tissu cartilagineux propre présente un entrelacement de fibres tellement serrées qu'il paraît, au premier aspect, absolument homogène et formé d'un amas de gélatine, sans ordre et sans direction particulière. Cependant, avec un peu d'attention, on distingue des fibres longitudinales, que d'autres, transversales et obliques, coupent en sens inverse (1).

---

(1) Ces fibres sont elles-mêmes très-difficiles à bien apercevoir; tout semble homogène, comme le dit Bichat, dans un cartilage coupé en travers. La seule chose qui y dénote l'organisation, c'est qu'il se fait un suintement séreux, au bout de peu de temps, sur les surfaces divisées, ce qui indique qu'il y avait des fluides en circulation. Ce suintement est d'autant plus abondant que le sujet est plus jeune.

Divers faits semblent néanmoins montrer un arrangement particulier dans le tissu cartilagineux ; d'où sont nées diverses opinions. Duhamel pensait que ce tissu était composé, dans les cartilages d'ossification, de lames concentriques superposées, d'après la formation des couches osseuses successives que ses

Ces fibres sont plus apparentes dans les cartilages des extrémités osseuses mobiles que dans les autres. Elles ont infiniment moins de souplesse que les fibres des substances fibro-cartilagineuses : aussi celles-ci plient-elles sans se rompre, tandis que les premières cassent dès qu'on veut les cour-

---

expériences sur la garance lui avaient démontrées. Il a été question ailleurs de ces expériences; nous avons vu ce qu'il fallait en conclure relativement à l'accroissement des os. Elles ne prouvent nullement la disposition dont il s'agit, puisque les couches ne se forment qu'à la surface de l'os quand une fois celui-ci est développé en entier : on ne trouve ni plaques ni lames d'aucune espèce dans le cartilage préexistant.

Hunter et Delassone ont dit que les cartilages des articulations mobiles avaient leurs fibres perpendiculaires, pour la plupart, et implantées sur les os de ces articulations; ils comparent au tissu du velours l'aspect qui doit en résulter. La facilité plus grande avec laquelle ces cartilages se cassent dans le sens de leur épaisseur, la direction perpendiculaire des fibres qu'on y aperçoit quand on les coupe dans ce même sens, la macération, qui rend, dit-on, ces fibres distinctes lorsqu'elle est suffisamment prolongée, sont les motifs sur lesquels se fonde cette opinion, qu'on ne saurait entièrement rejeter, car la structure qui vient d'être décrite devient quelquefois apparente dans les maladies. Je dirai seulement, par rapport au second fait, qu'on aura sans doute pris pour des fibres, les traces que laisse l'instrument dont on se sert pour opérer la section du cartilage.

Suivant Hérissant, les cartilages des côtes sont formées de lames contournées en spirale, et c'est à cette disposition qu'ils doivent leur élasticité. Cet auteur cite la macération comme preuve de qu'il avance. Ses observations à ce sujet ont besoin d'être confirmées.

Enfin, quelques-uns paraissent avoir été trompés par les changemens que subissent les cartilages lorsqu'ils sont sur le

ber un peu fortement; l'endroit de la rupture es net, avec peu d'inégalités.

Le tissu cartilagineux est remarquable par un foule de caractères qui le distinguent des autres Après le tissu osseux, aucun ne résiste autant à l putréfaction, à la macération: au milieu d'un cadavre tout putréfié, on trouve ce tissu presque in tact, conservant son apparence, sa texture, souven même sa blancheur naturelle. Les membres gangrénés nous offent fréquemment sur le vivant un semblable disposition. J'ai conservé pendant très-long-temps dans l'eau des substances cartilagineuses qui n'y ont nullement été altérées, excepté un peu dans leur couleur, comme je le dirai. Il faudrait peut-être plus d'un an pour les réduire à cette pulpe

---

point de s'ossifier. C'est ainsi que Mascagni admet dans les cartilages costaux des lames en forme de rayons, parce qu'il a trouvé dans le centre de ces cartilages une sorte de moelle séparant ces lames. Mais elles n'existent que chez les adultes et sur des cartilages qui ont été exposés à la dessiccation : or, pris à cette époque, le tissu cartilagineux n'est plus parfaitement homogène; son extérieur, plus compacte, se dessèche plus vite que l'intérieur, et ne peut revenir sur lui-même quand celui-ci tend encore à diminuer de volume; il en résulte des vides qui se produisent au centre. On doit de même attribuer à un commencement d'ossification, dû aux progrès de l'âge, les cavités rougeâtres et aréolaires que Morgagni et M. Portal ont décrites comme inhérentes à la structure des cartilages.

Les cartilages membraneux du nez, de l'oreille, dont il sera question dans le système fibro-cartilagineux, ont, suivant Sœmmering, des fibrilles distinctes après une macération d'un mois.

(Béclard.)

mollasse, muqueuse, fluente, où la macération amène la plupart des organes.

Le tissu cartilagineux se crispe sous l'action très-concentrée du calorique, comme tous les autres tissus: cependant ce phénomène n'est point apparent sur le thyroïde, à cause de son épaisseur, ni sur les cartilages qui encroûtent les os, à cause de leur adhérence à ces os. Mais si l'on coupe l'un par lames minces, si l'on détache aussi les autres par tranches, et qu'on les plonge dans l'eau bouillante, ils reviennent tout de suite et avec force sur eux-mêmes.

Exposé à la dessiccation, le tissu cartilagineux devient jaunâtre, prend une demi-transparence analogue à celle des tendons, des ligamens desséchés, devient dur, se resserre, diminue de volume, perd son élasticité à mesure qu'il se durcit.

L'ébullition lui donne aussi d'abord une couleur jaunâtre; puis, sur les extrémités articulaires, elle se fait gercer, fendre en différens endroits, et lever par plaques qu'elle ramollit, et qu'elle fond enfin presque complétement (1), à un petit résidu près,

---

(1) Les cartilages des sutures se dissolvent de même dans l'eau bouillante et fournissent une sorte de gelée, comme les cartilages diarthrodiaux; tous les autres résistent à l'ébullition, et ne donnent de la gélatine dans ce cas que lorsqu'ils renferment les points osseux. Cela s'accorde avec ce que l'on sait aujourd'hui de la composition des cartilages. Haller les croyait formés d'eau, de gélatine et de substance terreuse; mais les chimistes modernes ont obtenu des résultats différens. M. Hatchett a trouvé dans les cartilages de l'albumine et du phosphate de chaux. M. Chevreul a donné l'analyse des os cartilagineux du *squalus*

qui ne paraît pas gélatineux. Le ramollissement du tissu cartilagineux dans l'eau bouillante le rend beaucoup plus propre qu'il ne l'est naturellement à être dissous par les sucs digestifs. Avalés crus, les cartilages resteraient long-temps dans l'estomac, tandis qu'ils sont digérés très-promptement étant cuits : c'est là un des grands avantages de la coction des viandes. Dans différentes expériences faites sur la digestion, j'ai trouvé des portions de cartilages encore intactes dans l'estomac des chiens, tandis que déjà les chairs étaient réduites en pulpe.

Dans certains cas, le tissu cartilagineux s'altère singulièrement. Dans les maladies de l'articulation de la hanche, il prend un aspect tout différent; c'est une substance molle, comme lardacée, à vaisseaux très-distincts, à fibres quelquefois très-sensibles, présentant un volume double, quadruple même du naturel, et remplissant la cavité cotyloïde. Alors j'ai observé qu'ils ne jaunissent point,

---

maximus : ils contiennent, d'après ses recherches, du mucus, de l'huile, de l'acide acétique et différens sels. Enfin, d'après J. Davy, il y a dans les cartilages 44,5 d'albumine, 55,0 d'eau, et 0,5 de phosphate calcaire.

Au reste, cette composition doit varier aux différentes époques de la vie, ainsi que la proportion des principes constituans. Les cartilages des jeunes sujets contiennent plus de fluides, comme il est aisé de s'en convaincre en les faisant sécher comparativemet avec ceux d'un adulte. Ils se réduisent presque à rien dans cette expérience, tandis que les seconds perdent beaucoup moins de leur volume. On voit de même, dans la combustion, les uns ne laisser presque point de cendres, tandis que les autres donnent un résidu terreux abondant. (Béclard.)

qu'ils ne se fondent point par l'ébullition, qu'ils ne sont plus gélatineux par conséquent. Dans les mêmes maladies, j'ai trouvé le tissu cartilagineux, sur le fémur et sur l'os iliaque, non-seulement ossifié, mais changé en une substance exactement analogue à l'ivoire: je conserve deux pièces analogues.

Lorsque les cartilages deviennent osseux, il se développe dans leur milieu un tissu analogue au tissu celluleux des os, où les fibres entrecroisées laissent entre elles des espaces très-distincts, et où se dépose même une espèce de suc médullaire. Cette observation est surtout applicable à ceux des cavités, du larynx, de la poitrine, etc.

§ II. *Parties communes à l'Organisation du Système cartilagineux.*

Il y a du tissu cellulaire dans les cartilages, quoique le défaut d'interstices entre leurs fibres le rende très-difficile à distinguer dans l'état ordinaire: en effet, le développement des bourgeons charnus sur les plaies qui les intéressent, et l'ébullition, qui, après avoir enlevé la gélatine, laisse un résidu membraneux et celluleux, prouvent assez l'existence de ce tissu, qu'on voit d'ailleurs d'une manière très-manifeste dans certains états pathologiques, où la gélatine, moins abondamment séparée dans les cartilages, cesse de leur donner la dureté qui leur est habituelle, et y laisse un tissu mou, souvent comme spongieux.

On n'y distingue point de vaisseaux sanguins. Le système exhalant n'y charrie que des sucs blancs : mais, comme ce système est continu aux artères des parties voisines, dès que la sensibilité organique y est exaltée par les irritans maladifs, et qu'ainsi il se trouve en rapport avec les globules rouges du sang, ces globules y passent avec facilité ; et de là la rougeur que prennent alors les cartilages, comme on le voit dans leur inflammation, dans leurs plaies, etc. C'est ce même phénomène qu'on observe sur la conjonctive enflammée, etc. Quand la cause irritante a cessé, la sensibilité reprend son type naturel, les globules rouges deviennent par là même hétérogènes au cartilage, qui reprend sa blancheur.

On ignore la nature des fluides blancs qui circulent ordinairement dans le système vasculaire des cartilages. Ces fluides sont très-susceptibles de devenir le véhicule de la bile, ou au moins de sa substance colorante, lorsqu'elle se répand dans l'économie animale par la jaunisse. On observe presque constamment que, dans cette maladie, les cartilages sont colorés en jaune comme toutes les autres parties; la coloration est plus manifeste à leur surface que dans leur tissu, où elle est cependant très-réelle. En ouvrant une articulation mobile, l'aspect bilieux y est communément aussi marqué que sur la peau. Au reste, toutes les parties qui, comme eux, ne reçoivent que peu ou même point de globules rouges dans l'état ordinaire, se trouvent aussi très-manifestement colorées. Les tendons, la conjonctive, la membrane interne des ar-

tères, etc., en offrent des exemples. J'ai remarqué, dans deux sujets dont les cartilages thyroïdes étaient ossifiés au milieu, que le jaune était beaucoup plus vif dans la portion osseuse que dans la portion cartilagineuse.

Je ne sache pas qu'on ait jamais suivi de nerfs dans les cartilages (1).

---

(1) Quel est le degré d'organisation des cartilages? possèdent-ils réellement des vaisseaux, et sont-ils pénétrés de tissu cellulaire, à l'instar des autres parties solides qui concourent à former nos organes? Voilà deux questions depuis long-temps agitées, et diversement résolues par les anatomistes; questions sur lesquelles la science, il faut bien le dire, n'est pas encore complétement fixée aujourd'hui. Toutefois, si je ne m'abuse, ce problème n'est pas aussi inabordable qu'on le croit généralement, et sa solution complète, si déjà elle n'a été donnée, au moins a été partiellement aperçue par divers savans. Voici, au reste, l'opinion que je professe à cet égard :

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, l'état cartilagineux est une forme que revêt transitoirement la matière organique, à une époque très-voisine encore de son origine. Il succède immédiatement à l'état muqueux, que revêtent d'abord tous les tissus; il constitue avec le cellulaire les deux modes de transmutation de l'état muqueux. Certaines influences décident seulement lequel des deux doit succéder à ce dernier, dans un cas donné; mais jamais, comme on l'a dit, les cartilages, dans l'ordre naturel, n'ont passé par la forme cellulaire. Le fait des pseudo-membranes qui se développent si souvent sur les surfaces séreuses enflammées, pseudo-membranes qui de l'état muqueux passent ici à l'état cellulaire, là à l'état cartilagineux, me paraît éclairer suffisamment cette question.

Ce premier point accordé, *que les cartilages sont des parties très-rudimentaires, et placées très-bas dans l'échelle, sous le rapport de l'organisation, puisqu'ils succèdent immédiatement*

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME CARTILAGINEUX.

§ Ier. *Propriétés physiques.*

L'élasticité est une propriété généralement répandue dans tous les corps organiques et inorganiques. Parmi les premiers, il paraît que les végétaux en sont doués dans un plus grand nombre de leurs organes que les animaux, dont presque toutes les parties sont molles, et dont quelques-

---

à l'état muqueux primitif, examinons le second. Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas de vaisseaux et de tissu cellulaire dans les cartilages? Pour décider cette question, il ne faut pas perdre de vue que les cartilages, par suite de leur condition reconnue d'*organes transitoires*, tendent de plus en plus à s'élever sous le rapport de l'organisation, et que par suite ils ne sont pas, à toutes les époques de leur formation, également propres à servir, dans ce procès, de pièces de conviction : il faut les prendre à l'état parfait, à cette époque où aucune teinte étrangère ne trouble la couleur d'un blanc nacré qui leur est naturelle ; l'omission de cette condition ferait commettre plus d'une erreur. Ce prétendu tissu cellulaire des cartilages parfaits, Bichat ne l'a admis que par analogie : en effet, il avance d'abord que le défaut *d'interstices entre les fibres de ces organes rend ce tissu fort difficile à montrer dans l'état ordinaire ;* mais il n'en conclut pas moins que son existence est réelle, et il invoque à l'appui de son opinion le développement des bourgeons charnus sur la surface des solutions de continuité cartilagineuses. Il est aujourd'hui superflu d'insister pour montrer le peu de valeur de cette dernière preuve ; car chacun sait, non-seulement que le tissu des cartilages ne donne point naissance à des bourgeons charnus, mais encore que ces organes restent constam-

unes seulement reviennent sur elles-mêmes après avoir été ployées ou comprimées. Parmi celles-ci, les cartilages tiennent un des premiers rangs chez l'homme. Leur élasticité est extrêmement prononcée, surtout dans l'âge adulte, où leur consistance est moyenne entre la mollesse qui les caractérise dans l'enfance, et la dureté qui est leur apanage dans les vieillards. Ces deux dernières propriétés ne sont en effet guère favorables à la force élastique.

Si l'on enfonce dans un cartilage une lame de scalpel, les bords de la division réagissent sur elle et l'expulsent. Pressée contre un corps résistant, l'extrémité cartilagineuse d'un os long s'aplatit et re-

---

ment étrangers à toute cicatrisation; le cal des cartilages fracturés se fait tout-à-fait en dehors d'eux, et résulte des modifications variées de la membrane cellulaire qui les entoure, membrane dont l'organisation avancée ne saurait être un instant douteuse. Quant aux vaisseaux des cartilages, leur existence est tout aussi peu établie : Bichat le reconnaît très-bien. Suivant lui, il n'y a pas de vaisseaux rouges dans ces organes; il y admet seulement des vaisseaux blancs. Je ne sache pas que personne ait jamais démontré des vaisseaux blancs dans les cartilages; à moins que l'on ne prenne au sérieux l'hypothèse de Mascagni, qui considérait le tissu cartilagineux comme résultant d'un assemblage de vaisseaux lymphatiques : or, à quel ordre appartiendraient donc les vaisseaux blancs des cartilages, s'ils ne sont ni sanguins ni lymphatiques? En outre de ce que, dans un état avancé de leur vie, lorsqu'ils doivent s'ossifier, les cartilages présentent des vaisseaux sanguins bien évidens, qu'on se garde d'en conclure que ces vaisseaux existaient auparavant, et que seulement alors ils commencent à recevoir la partie colorée du sang, qui auparavant leur était étangère; en effet, d'une part,

prend sa forme dès que la compression cesse. Coupé longitudinalement dans l'opération de la bronchotomie, le thyroïde se rapproche subitement dans ses deux parties divisées. La section de l'anneau cricoïdien offre le même phénomène. Enfoncés du côté de l'abdomen, les cartilages des dernières côtes reviennent d'eux-mêmes en dehors, etc., etc. Tous ces phénomènes sont un résultat manifeste de la force

---

on conçoit tout aussi facilement alors la formation entière de ces canaux au sein de la matière cartilagineuse, que le développement semblable qui s'opère journellement dans les cicatrices, les pseudo-membranes, etc. D'un autre côté, il restera évident, pour tous ceux qui examineront directement le phénomène, et d'une manière sérieuse, que les vaisseaux qui apparaissent dans un cartilage qui s'ossifie offrent tous les caractères de vaisseaux de formation récente : ce sont d'abord de simples cavités à peine colorées, qui bientôt deviennent rosées; plus tard seulement on y remarque une forme allongée et rameuse, jusqu'à ce que l'apparence vasculaire frappe d'une manière non équivoque.

En résumé, il n'y a de véritablement cellulaire et vasculaire dans les cartilages que la membrane qui les entoure : eux-mêmes sont formés par de la matière organisable, mais dans laquelle l'organisation est encore au moins très-rudimentaire; matière qui bien certainement ne possède point de vaisseaux, si ce n'est lorsqu'elle commence à subir la transformation osseuse. Les vaisseaux des cartilages, en un mot, n'ont été admis que par une pure supposition, et il est temps de mettre un terme à toutes ces spéculations de l'esprit, qui peuvent bien transformer la science de l'organisation en un joli roman, mais qui la déparent réellement, en lui ôtant ce cachet de vérité sans lequel elle ne saurait plus désormais servir de base qu'à une physiologie vaine et mensongère. (F. Blandin.)

élastique. Aussi la nature a-t-elle placé les cartilages partout où, pour produire ses phénomènes, elle a besoin d'associer cette force physique aux forces vitales, comme au larynx et à la cloison nasale pour éprouver une sorte de vibration dans le passage de l'air, à l'extrémité des côtes pour être le siége d'une espèce de torsion nécessaire à la respiration mécanique, aux extrémités articulaires pour amortir les coups, etc.....

Il paraît que l'activité vitale rend plus énergique cette propriété, qui reste cependant extrêmement apparente après la mort. Je présume que les cartilages la doivent à la grande quantité de gélatine qu'ils contiennent (1). 1°. On sait que cette substance en jouit à un haut degré, comme le prouvent le tremblement des gelées qui se prennent par le froid, l'examen des différentes colles animales, etc. 2°. Si, par l'ébullition, on enlève cette substance aux cartilages, le parenchyme nutritif reste flasque et mou. 3°. A mesure que, dans nos organes, la gélatine diminue, l'élasticité y est moindre, comme on le voit en examinant le décroissement de cette propriété, des cartilages où elle prédomine, aux organes fibro-cartilagineux où elle est en plus petite proportion, et aux corps fibreux où elle est encore moindre. Il faut avouer cependant que beaucoup de corps très-gélatineux par leur nature offrent des traces peu sensibles d'élasticité; la peau en

(1) Comme on l'a vu plus haut (note de Béclard), les cartilages ne contiennent que peu ou point de gélatine; le mucus en forme essentiellement la base. (F. Blandin.)

est un exemple ; les tendons offrent aussi cette disposition. Comment la même substance peut-elle, suivant qu'elle est diversement travaillée par les lois organiques, être le siége de propriétés toutes différentes?

§ II. *Propriétés de Tissu.*

Les cartilages sont peut-être, de tous les organes, ceux où l'extensibilité et la contractilité de tissu sont le moins développées. On les voit rarement se distendre, s'allonger : ils se rompent plutôt. Les maladies ne nous offrent point dans le larynx ces dilatations si communes aux autres cavités, même osseuses. Loin de s'écarter, comme dans la peau, dans un muscle, etc., les bords de leur section se rapprochent, ainsi que nous l'avons vu, par l'effet de l'élasticité : on dirait que cette dernière propriété y a été accumulée aux dépens de celles de tissu.

§ III. *Propriétés vitales.*

Les propriétés vitales y sont aussi assez obscures. Jamais de sensibilité animale dans l'état naturel ; ce n'est que lorsque l'inflammation ou une autre cause exalte leur sensibilité organique, sensibilité que supposent nécessairement les fonctions qui s'y exercent, ce n'est, dis-je, qu'alors que le cerveau perçoit douloureusement les irritations diverses dont ces organes sont le siége. Ceci devient manifeste surtout par les corps étrangers formés dans les articulations, lesquelles souffrent de leur présence ou

y sont insensibles, suivant que, par leur position, ils irritent ou n'irritent pas les extrémités cartilagineuses (1).

Point de contractilité animale ni de contractilité organique sensible dans les cartilages; l'organique insensible ou tonicité y existe seule : encore y est-elle à un degré assez obscur.

Les sympathies sont obscures, presque nulles dans le système cartilagineux. Je ne sache pas que les affections aiguës des divers organes déterminent des phénomènes sympathiques de sensibilité ou de contractilité dans les cartilages. Ils restent tranquilles au milieu du trouble général qui affecte les autres systèmes dans ces sortes de maladies. Dans les affections chroniques même, ils éprouvent peu d'altération : par exemple, examinez comparativement le cadavre d'un homme qui a péri d'une mort violente, dont les organes sont restés intacts, et celui d'un phthisique, d'un hydropique, d'un cancéreux, etc., vous verrez entre presque tous les organes de l'un et de l'autre une différence frappante; l'aspect des muscles, des surfaces mu-

---

(1) Il paraît certain que les douleurs produites par les corps étrangers articulaires dépendent de leur action sur la membrane synoviale, et médiatement sur les os, mais nullement de la modification des cartilages diarthrodiaux, couche aussi dépourvue de sensibilité et de vie que l'épiderme, et qui se comporte de la même manière dans les inflammations des tissus sous-jacens. Dans l'inflammation du derme cutané, en effet, l'épiderme se détache, comme dans l'inflammation des extrémités articulaires des os, on voit se séparer par écailles le cartilage qui les recouvre. (F. Blandin.)

queuses et séreuses, des vaisseaux, des nerfs, etc., est entièrement changé par l'altération lente qu'ils ont éprouvée dans le second : eh bien! au milieu de ces altérations, les cartilages n'en ont presque pas subi; leur aspect est presque le même que dans l'état naturel.

Caractère des Propriétés vitales.

D'après ce qui vient d'être dit, on conçoit que la vie cartilagineuse doit être très-peu active, que tous les phénomènes maladifs doivent être caractérisés dans ces organes par une lenteur particulière, que l'inflammation, par exemple, doit y affecter toujours, comme dans les os, une marche chronique : c'est ce que l'expérience suivante rend très-évident. Mettez un cartilage à découvert, faites-y une solution de continuité, et établissez ensuite un contact entre lui et une portion d'un muscle, de la peau, etc., aussi intéressés à leur surface; la réunion ne s'opérera pas, ou du moins elle n'aura lieu qu'au bout d'un temps très-long. Pourquoi? parce que, la vie du muscle ou de la peau étant beaucoup plus active que celle des cartilages, l'inflammation des premiers organes sera bien plus rapide que celle des seconds, que par conséquent la première période inflammatoire des uns correspondra à la dernière des autres. Or, la réunion est d'autant plus facile que les périodes inflammatoires se correspondent plus exactement dans les deux parties divisées et en contact. Voilà pourquoi deux parties du même organe se réunissent bien

plus facilement que deux surfaces appartenant à des organes différens. Voilà pourquoi, plus la vie de deux organes a d'analogie, moins leur réunion offre de difficultés ; pourquoi les difficultés croissent à mesure que les différences de la vie deviennent plus marquées. Deux surfaces osseuses en contact restent trente à quarante jours à se réunir ; les deux bords d'une division cutanée offrent le même phénomène accompli en deux ou trois jours. Si vous voulez rendre continus deux organes aussi disparates par leur mode de cicatrisation, en les mettant en contact, vous ne réussirez jamais que lentement. Recouvrez avec la peau l'extrémité osseuse du moignon amputé ; déjà celle-ci suppurera, que l'os commencera à peine à se ramollir : aussi les bons praticiens ont-ils renoncé à ces prétendues réunions par première intention, si vantées à la suite de l'amputation à lambeaux (1). Sans doute elles auraient lieu

---

(1) Par ces expressions de *réunion par première intention*, on entend deux choses bien distinctes l'une de l'autre : 1° le rapprochement immédiat des lèvres d'une plaie ; 2° l'agglutination sans suppuration de ces parties mises en contact. L'une est toujours à la disposition du chirurgien ; l'autre, au contraire, peut bien être favorisée par l'art, mais ne lui est que secondairement soumise, et dépend de la nature elle-même. Aujourd'hui, bien que la plupart des praticiens aient beaucoup rabattu des avantages immenses attribués au rapprochement immédiat des lèvres de la plaie des amputations, cependant ce mode de pansement n'est pas tombé dans le discrédit dont parle ici Bichat : on reconnaît généralement qu'il a des avantages et des inconvéniens ; que les premiers prédominent dans certains cas, et que le contraire a lieu dans d'autres. Le rapprochement immédiat est une nécessité, en quelque sorte,

ces réunions, si la vie des organes qui entrent dans la composition des lambeaux était la même. Mais avec la diversité de ces organes musculaires, osseux, tendineux, cellulaires, nerveux, etc., il faut un temps toujours assez long pour que toutes leurs vies se mettent pour ainsi dire en équilibre, et que ces organes s'agglutinent à leurs extrémités divisées. J'ai déjà observé que la division des inflammations en aiguës et en chroniques présente à tous les médecins une idée inexacte; car la durée des phénomènes inflammatoires dans les organes est absolument relative au mode de leur vie. Une inflammation du tissu cellulaire ou de la peau est aiguë quand elle n'est que de quelques jours; elle est chronique lorsqu'elle passe quarante ou cinquante jours : eh bien !

---

après les amputations articulaires; il est alors souvent suivi de l'agglutination sans suppuration; après les amputations dans la continuité, il est moins avantageux, parce que l'agglutination immédiate est presque impossible sur l'extrémité de l'os scié, et qu'ainsi, en facilitant la réunion des bords de la plaie, on emprisonnerait le pus qui se forme profondément. Le fait de l'agglutination immédiate de beaucoup de plaies des amputations articulaires, quoique bien réel, étonne au premier abord. Toutefois, l'étonnement cesse lorsque l'on réfléchit que les extrémités articulaires des os sont très-vasculaires; qu'en raison de leur rondeur, elles sont peu irritantes pour les parties molles qu'on réapplique sur elles, et que le cartilage diarthrodial, ou bien se détache et est résorbé, ou bien s'organise promptement sous l'influence du défaut de pression, et sert de base solide à la cicatrice ou bien enfin reste adhérent à l'os, qui se trouve à jamais séparé des parties molles par une petite cavité synoviale.

(F. Blandin.)

dans un cartilage, ce dernier terme peut être celui d'une inflammation aiguë, tandis qu'une durée de plusieurs mois est nécessaire pour qu'elle devienne chronique, comme les maladies articulaires en offrent de si fréquens exemples.

Les fonctions naturelles, comme les affections maladives, se ressentent de cette lenteur des phénomènes vitaux des cartilages. Le mouvement habituel de composition et de décomposition qu'y suppose leur nutrition est très-peu rapide : il faut longtemps aux substances nutritives pour se combiner avec eux. Je suis persuadé que, dans les animaux qui meurent rapidement du charbon, et dont les muscles, les glandes, les membranes, etc., presque tout à coup pénétrés des principes contagieux par le mouvement nutritif de composition, offrent un aliment si funeste (1), je suis, dis-je, persuadé que ces principes contagieux n'ayant point encore pénétré les cartilages, ceux-ci pourraient être di-

(1) Les cartilages jouissent, comme nous l'avons vu, d'une vitalité au moins très-obscure, et par conséquent, ainsi que Bichat le fait remarquer, sans doute, ils ne doivent que très-tard se laisser pénétrer des principes contagieux qui circulent quelquefois mélangés avec nos humeurs; mais, pour établir ce fait, Bichat a choisi un exemple qui n'est pas très-concluant. En effet, souvent il est arrivé que telle substance animale, très-délétère dans son application partout ailleurs, portée dans l'estomac et altérée par les sucs gastriques, s'est montrée tout-à-fait innocente. Les expériences de Fontana sur le venin de la vipère, et les faits rapportés par Morand et Thomassin, d'individus qui, sans en être incommodés, ont mangé la chair de bœufs morts du charbon, ne laissent que peu de doutes à cet égard. (F. Blandin.)

gérés sans danger. C'est à la lenteur du mouvement de décomposition qu'il faut attribuer celle de la résolution des engorgemens cartilagineux; car les tumeurs se résolvent par les mêmes lois que nos organes se décomposent, comme elles se forment par les lois qui président à leur composition.

Les cartilages et les organes analogues sont aux autres parties de l'économie, par rapport à leur mode de vitalité, ce que les zoophytes et autres animaux à circulation capillaire seule sont aux animaux mieux organisés, aux animaux à circulation générale, aux animaux qui ont un cœur à double ventricule. Autant la vie, considérée en général dans la série des êtres qu'elle anime, présente de différence dans son activité, autant elle diffère, sous le même rapport, examinée en particulier dans les organes de chacun de ces êtres.

ARTICLE IV.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME CARTILAGINEUX.

Les systèmes osseux et cartilagineux sont confondus dans l'embryon; à mesure que le premier se développe, le second se rétrécit : celui-ci a bien manifestement pour base principale la gélatine; je ne reviendrai pas sur les preuves qui l'ont démontrée dans le système osseux.

J'ai montré, en parlant de ce dernier système, comment le parenchyme cellulaire et vasculaire, existant d'abord seul et constituant l'état muqueux, se pénètre ensuite de cette base; ce qui forme le

cartilage : le mode primitif de formation de ce système d'organes est donc déjà connu. Voyons comment son développement continue.

§ Ier. *État du Système cartilagineux dans le premier âge.*

A mesure que l'ossification envahit l'os, que la gélatine s'y porte par conséquent en moindre quantité, il semble qu'elle afflue plus abondamment aux surfaces articulaires ; car les cartilages qui s'y trouvent perdent alors leur mollesse primitive, et prennent une consistance toujours croissante. Cependant bien plus de gélatine disparaît de dedans les os, qu'il ne s'en introduit dans les cartilages ; en sorte qu'on peut dire que cette substance va toujours en diminuant, proportionnellement aux organes, à mesure qu'on avance en âge. On sait que ce sont spécialement les parties des jeunes animaux qu'on choisit pour faire les colles, les gelées, etc. Les cartilages articulaires, à cette époque, présentent un phénomène que j'ai fréquemment constaté dans mes expériences : quand on les met macérer dans l'eau pendant deux ou trois jours, ils prennent une couleur rouge extrêmement marquée. Cette couleur ne pénètre pas profondément; mais si on coupe en plusieurs endroits le cartilage de manière à mettre aussi son intérieur en contact avec le fluide, il rougit en totalité. Les cartilages d'ossification présentent le même phénomène, qui devient moins sensible à mesure qu'on avance en âge; en sorte que, chez la plupart des adultes, les cartilages

conservent leur couleur blanche par la macération. Chez quelques-uns cependant ils prennent encore une teinte rosée, qui du reste est toujours infiniment moins vive que dans le fœtus. D'où naît ce phénomène ? L'eau donne-t-elle au cartilage la cause de sa coloration, ou lui enlève-t-elle par dissolution certaines substances qui empêchaient cette coloration de se développer ? Quoi qu'il en soit, aucun des organes de l'articulation ne rougit ainsi ; tous, au contraire, la synoviale, les ligamens, etc., deviennent plus blancs.

Il n'y a ordinairement aucune démarcation sensible entre le cartilage qui doit devenir os, et celu qui doit rester tel ; quelquefois cependant, d'un côté, on remarque une couleur plus terne à l'ex trémité des os, tandis que, d'un autre côté, jamai on n'y découvre les stries rougeâtres qu'il est s fréquent de voir irrégulièrement disséminées dan les cartilages d'ossification.

Tant que l'ossification dure, il y a, entre le car tilage et la portion osseuse déjà formée, une couch vasculaire très-sensible, et il est extrêmement facil de séparer ces deux portions, qu'une très-faible ad hérence unit l'une à l'autre. On remarque aussi su la surface de chacune, lorsqu'elles sont isolées, di verses inégalités, des saillies et des enfoncemens qui se reçoivent réciproquement. C'est le défau d'adhérence des deux portions osseuse et cartilag neuse, avant la complète ossification, qui a sans doute donné lieu à tout ce qu'on a écrit sur le dé collement des épiphyses, décollement que les obser

vations des chirurgiens de nos jours ont rarement constaté (1).

A mesure que la substance calcaire arrive aux extrémités de l'os, les vaisseaux disparaissent peu à peu, et les adhérences vont en croissant. Enfin, l'ossification étant achevée, d'un côté il n'y a plus de réseau vasculaire sensible entre le cartilage et l'os; d'un autre côté, leur union est telle que toute rupture est presque impossible entre eux. Ces deux caractères distinguent spécialement le rapport du cartilage d'ossification avec l'os, d'avec le rapport du cartilage réel avec le même os. J'ai remarqué aussi que, presque toujours, au-dessus de son union avec la portion osseuse, le cartilage d'ossification présente une blancheur moindre, une teinte plus foncée qui s'étend l'espace de deux ou trois lignes, et dont la différence est souvent très-marquée: c'est le prélude de l'abord du sang. Cette

(1) Le décollement des épiphyses a été souvent observé depuis Bichat. Il survient dans deux circonstances différentes : tantôt il est le produit de l'action d'une violence extérieure, tantôt il succède à une inflammation qui s'est emparée de cette lame cartilagineuse que l'on s'observe au niveau des épiphyses aussi long-temps que dure l'accroissement des os en longueur. J'ai fréquemment eu l'occasion de voir cette seconde variété du décollement des épiphyses sur les phalanges des doigts et des orteils; et plus d'une fois, dans des os de ce genre, lorsqu'il s'est agi de faire les amputations phalangiennes, ou métacarpo ou métatarso-phalangiennes, l'instrument tranchant est tombé directement entre l'épiphyse et la diaphyse de la phalange inférieure, au lieu d'arriver dans l'articulation elle-même, articulation qu'ensuite il a fallu désunir.

(F. Blandin.)

disposition est étrangère au cartilage d'encroûtement chez l'adulte.

On attribue communément aux mouvemens articulaires le défaut d'ossification des cartilages des articulations mobiles; mais je crois que cela dépend uniquement des lois de la nutrition osseuse. La nature borne là l'exhalation du phosphate calcaire, comme elle borne à l'origine d'un tendon l'exhalation de la fibrine du muscle qui lui correspond : c'est parce que le mode de sensibilité organique change, et que les vaisseaux du cartilage ne sont plus en rapport ni avec la partie rouge du sang, ni avec la substance calcaire. En effet, en supposant vraie l'hypothèse précédente, pourquoi les cartilages des articulations immobiles existent-ils? Pourquoi le mouvement, qui favorise ailleurs les exhalations et les sécrétions, empêcherait-il ici les premières? Pourquoi les ossifications contre nature se font-elles dans les parties les plus mobiles, comme les artères nous en fournissent un exemple? Pourquoi, dans plusieurs ankyloses où les surfaces articulaires s'unissent, et où le mouvement se perd, les cartilages ne disparaissent-ils pas (1)?

---

(1) Je crois bien plutôt que le défaut d'ossification des cartilages diarthrodiaux, dans les circonstances ordinaires, dépend de la pression forte à laquelle ils sont soumis. En effet, pour que le cartilage, substance organisable, bien plus qu'organisée, s'ossifie, il a besoin de vaisseaux; or ces vaisseaux ne peuvent se former qu'à la faveur de la raréfaction de la matière cartilagineuse; et dans les conditions de pression où se trouvent les cartilages diarthrodiaux, cette raréfaction est fort difficile.

(F. Blandin.)

Les cartilages des cavités ont un mode d'origine, de développement et de nutrition, parfaitement analogue à celui des cartilages articulaires. J'observe que leur tissu diffère, ainsi que le tissu de ceux-ci, de celui des cartilages d'ossification, en ce que ces derniers sont parcourus par diverses lignes grisâtres, qu'ils ne présentent point. Lorsqu'on coupe les cartilages d'ossification dans un sens quelconque, leurs surfaces divisées offrent différens petits points qui sont les extrémités coupées de ces lignes, lesquelles paraissent être des vaisseaux qui, sans charrier encore du sang, contiennent cependant un fluide plus foncé que le tissu cartilagineux.

§ II. *État du Système cartilagineux dans les âges suivans.*

A mesure qu'on avance en âge, les cartilages deviennent plus durs, plus forts, moins élastiques. La gélatine qui les nourrit prend un caractère particulier ; car on sait que les colles tirées des jeunes animaux diffèrent essentiellement de celles que fournissent les vieux : les cuisiniers savent très-bien faire la différence d'un pied de veau et d'un pied de bœuf, pour les gelées qui entrent dans leurs assaisonnemens. Cette différence, dans la substance qui compose essentiellement les cartilages et qui est sans doute leur matière nutritive, indique manifestement qu'elle ne reste pas toujours dans ces organes, mais qu'elle y est habituellement exhalée et absorbée, comme le phosphate calcaire dans les os, la fibrine dans les muscles, etc., etc.

Dans les dernières années de la vie, l'ossification s'empare de tous les cartilages; mais elle commence d'une manière inverse dans ceux des cavités et dans ceux des articulations. Dans les premiers, c'est par le centre; dans les seconds, c'est par leur surface qui correspond à l'os, qu'elle se fait d'abord; en général, elle est beaucoup plus tardive dans ceux-ci; et, parmi eux, elle est plus tardive dans les articulations mobiles que dans les immobiles (1).

Les cartilages du larynx et des côtes sont osseux dans leur centre dès l'âge de trente-six à quarante ans, et même bien avant; ils le deviennent ensuite de plus en plus : c'est ce qui rend la section du thyroïde très-difficile dans les derniers temps de la vie. Dans le grand nombre d'opérations que j'ai fait manœuvrer aux élèves, j'ai toujours eu occasion de me convaincre que, au-delà de soixante ans, le bistouri à trempe ordinaire est presque toujours insuffisant pour cette section; il faudrait une trempe beaucoup plus forte. C'est l'ossification des cartilages costaux qui fait que les vieillards ne sont plus susceptibles de ces grands efforts d'inspiration si communs aux jeunes gens : chez eux le diaphragme agit spécialement. J'attribue aussi à cette ossification précoce des cartilages des cavités, ossification qu'accompagne toujours le développement

(1) En décrivant la formation des os, j'ai parlé des changemens que subissent les cartilages qui les représentent, lorsqu'ils tendent à l'ossification; des modifications semblables se remarquent, seulement plus tard, dans les cartilages improprement appelés *permanens*. (F. Blandin.)

du système vasculaire, la fréquence bien plus grande de la carie dans ces sortes de cartilages que dans tous les autres. Je ne sais pourquoi, au larynx, les arythénoïdes sont les plus exposés à cette affection; mais, dans les ouvertures de cadavres, c'est un fait constant: toutes les phthisies laryngées avec carie que j'ai observées sur le cadavre me l'ont présenté (1).

§ III. *Développement accidentel du Système cartilagineux.*

Le système cartilagineux, comme le système osseux, se développe souvent dans des organes auxquels il est naturellement étranger. Mais il y a cette différence, que, pour le système osseux, ce phénomène paraît être un effet de l'âge; au lieu qu'il n'est jamais, pour le cartilagineux, qu'un effet maladif (2). Rien de plus commun que de trouver des

---

(1) Les cartilages passent d'autant plus promptement à l'état osseux, qu'ils remplissent des fonctions plus actives dans l'organisme, et que par suite ils sont soumis à une plus vive irritation: telle est la raison de l'ossification prompte des cartilages costaux, surtout du premier; voilà pourquoi les pièces solides du larynx et de la trachée présentent promptement le même phénomène. Les cartilages arythénoïdes, en particulier, s'ossifient de bonne heure, parmi les pièces laryngées, parce qu'en raison de leur union aux lèvres de la glotte, ils sont dans un mouvement continuel, soit pour la respiration, soit surtout pour la production des différens sons. (F. Blandin.)

(2) Le fait signalé par Bichat, que la formation des cartilages après la naissance réclame nécessairement des influences morbides, tandis qu'il en est autrement pour les formations osseuses,

noyaux cartilagineux dans les tumeurs squirrheuses, cancéreuses, etc., au milieu de ces productions morbifiques si fréquentes où nos parties prennent un aspect lardacé, dans le poumon ou dans le foie engorgés, etc. Je ne sais pourquoi la membrane propre de la rate a une tendance extrême à s'encroûter de gélatine : c'est peut-être de tous les organes celui où les cartilages accidentels sont les plus fréquens. Ordinairement c'est par plaques irrégulières que le développement cartilagineux s'y manifeste ; quelquefois il envahit toute la membrane, qui présente alors une surface convexe analogue aux surfaces convexes des articulations mobiles, et que le péritoine revêt, comme celles-ci sont recouvertes par la synoviale. La rate ainsi cartilagineuse au dehors

---

est digne de la plus sérieuse attention. Il sera compris facilement par toutes les personnes qui ne perdront pas de vue cet autre fait que nous avons énoncé plus haut : *que l'état cartilagineux est une des formes les plus rudimentaires que revête la matière organique, forme qui succède immédiatement à celle que l'on appelle muqueuse.* En effet, à la naissance, l'organisation générale est très-avancée, il ne reste plus rien de la masse muqueuse primitive de l'embryon, et par conséquent il n'y a rien qui puisse, en s'élevant d'un degré d'organisation, subir la forme cartilagineuse. Toutes les métamorphoses de ce genre qui devaient avoir lieu sont réalisées. Une irritation anormale de quelque point du corps peut seule donner lieu à une formation accidentelle de matière muco-gélatineuse, comme cela arrive souvent, et préparer ainsi une organisation de cartilage. Il en est autrement du tissu osseux : état de la matière organique plus élevé dans l'échelle, ce tissu succède à celui des cartilages que l'on rencontre dans beaucoup de points pendant une grande partie de la vie, et qui là, par conséquent, se présente naturellement à l'ossification. (F. Blandin.)

peut-elle se prêter aux changemens de volume qu'elle éprouve souvent? Je l'ignore.

On connaît les productions cartilagineuses mobiles et souvent libres dans les articulations. Viennent-elles de l'ossification d'une portion de la synoviale? Je le présume; car souvent on les a vues tenir au cartilage par des expansions membraneuses. J'ai trouvé, l'an passé, sur un cadavre, la portion de synoviale allant du paquet graisseux qui est derrière la rotule à l'enfoncement qui sépare les condyles du fémur, presque toute cartilagineuse. Si, pendant la vie, elle se fût détachée par l'effet des mouvemens, cela aurait formé un de ces cartilages mobiles et libres. Au reste, comme je n'ai que ce fait qui me soit propre sur ce point, je ne puis qu'offrir des conjectures; d'autant plus qu'on sait que la synoviale et les membranes séreuses sont de même nature, et que cependant ces dernières ne deviennent presque jamais cartilagineuses (1).

Au reste, ces sortes de productions suivent absolument la marche ordinaire de l'ossification. D'abord cartilagineuses et sans vaisseaux sanguins, elles présentent bientôt, pour peu qu'elles soient an-

---

(1) Les corps étrangers que l'on trouve isolés dans quelques articulations, ou dans quelques cavités séreuses, naissent, suivant Bédard, en dehors de la membrane correspondante, la repoussent et s'en enveloppent d'abord tout simplement; plus tard, ils l'entraînent et s'en forment un pédicule qui les soutient suspendus près du lieu de leur naissance, jusqu'au moment où, ce pédicule se rompant, le corps en question devient tout-à-fait libre. (F. Blandin.)

ciennes, un centre rouge, puis osseux, qui s'étend du centre à la circonférence, et qui finit quelquefois par envahir tout le cartilage; en sorte que ce sont de véritables os. Cette dernière circonstance est cependant assez rare. L'état où l'on a trouvé le plus communément ces productions est celui où elles sont osseuses au milieu et cartilagineuses à la circonférence. J'en ai rencontré une, dans l'articulation du pisiforme avec le pyramidal, qui avait le volume de la tête d'une grosse épingle, et qui, dans toute son épaisseur, était plus dure que l'ivoire (1).

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME CARTILAGINEUX.

§ Ier. *Altérations dans les formes extérieures.*

Les cartilages articulaires sont quelquefois gonflés et ramollis dans les tumeurs blanches, d'autres fois détachés en partie et pendans dans l'articulation, souvent détruits dans une plus ou moins grande étendue : cette destruction, fréquente dans les maladies des articulations, peut amener l'ankylose. Dans certains cas, les cartilages articulaires semblent avoir entièrement disparu, et l'on ne trouve que des surfaces osseuses comme nées : le tissu cartilagineux s'ossifie-t-il dans cette circonstance, comme le dit Bichat, ou bien a-t-il a été détruit? C'est ce qu'il est difficile de déterminer. Ces mêmes cartilages offrent assez souvent, après des affections rhumatismales, à la suite d'engorgemens chroniques, des espèces de fibres flottantes et libres par leur extrémité : ce sont ces fibres qui semblent favorables à l'opinion de Hunter et Delassonne sur la structure des cartilages. Le tissu cartilagineux semble se décomposer dans cette

circonstance, à moins qu'on ne regarde cette altération comme le résultat d'une érosion partielle.

§ II. *Altérations dans l'organisation.*

On n'a jamais eu occasion d'observer l'inflammation des cartilages; dans aucun cas, les vaisseaux de ces parties ne sont colorés par le sang; des fluides blancs seuls paraissent susceptibles de s'y accumuler. Cependant l'ulcération, qui n'épargne pas les cartilages articulaires, comme on vient de le voir, est un indice que l'inflammation doit s'y développer.

La dénudation et les plaies, qui, partout ailleurs, sont suivies d'inflammation, ne produisent pas cet effet dans les cartilages. Lorsqu'ils sont mis à nu dans une plaie des parties molles, celle-ci se réunit par adhésion ou par cicatrisation, suivant que le lambeau a été réappliqué ou non: mais le tissu cartilagineux ne participe point au travail de la réunion, comme l'ont vu J. Hunter et J. Bell; il reste isolé, recouvert par la cicatrice, sans lui adhérer aucunement. Quand on ouvre une articulation sur un animal vivant, le cartilage ne s'enflamme point, ne rougit point, quelle que soit la durée de son exposition au contact de l'air: seulement, si on prolonge l'expérience, on voit la synoviale, rouge d'abord dans le reste de son étendue, s'enflammer aussi sur le cartilage, et la rougeur de cette membrane s'étendre peu à peu vers le centre de ce dernier. Cependant les cartilages rompus se réunissent, comme Autenrieth l'a reconnu le premier pour les cartilages costaux. Divers observateurs, MM. Magendie, Lobstein et moi-même, avons de nouveau constaté ce fait. Mais le rôle des cartilages est purement passif dans cette circonstance. Quand ceux des côtes sont fracturés, si les deux bouts restent affrontés, une virole osseuse se forme autour d'eux et les maintient en contact; si, comme c'est le plus ordinaire, les fragmens ont chevauché l'un sur l'autre, un bourrelet, fibreux d'abord, puis cartilagineux et osseux, tenant au périchondre, remplit leur intervalle; mais dans ce cas, comme dans l'autre, eux-mêmes sont simplement contigus. Ce n'est que chez le vieillard, quand

les cartilages sont sur le point de s'ossifier, qu'ils se réunissent, comme les os, par un véritable cal intermédiaire.

Les ulcères des cartilages diarthrodiaux sont quelquefois le siége d'un travail de réparation qui ressemble, jusqu'à un certain point, à celui des plaies des parties molles. On trouve alors des portions cartilagineuses nouvellement formées en remplacement de celles que l'érosion avait détruites. Cette altération a été prise par quelques-uns pour un vice de conformation originel : elle n'est évidemment que secondaire.

La transformation osseuse est la seule qu'éprouvent les cartilages ; mais ils l'éprouvent presque nécessairement avec l'âge, et sans presque sortir pour cela de l'ordre naturel (*voyez* page 196). Au reste, on distingue, sous ce rapport, deux sortes de cartilages : les uns, purement temporaires, doivent s'ossifier dès les premières années ; les autres, qui persistent plus longtemps, sont dits *permanens*, mais seulement par rapport aux premiers, car eux-mêmes finissent aussi par s'ossifier ; les cartilages des articulations mobiles font seuls peut-être exception. Mais leur ossification n'a pas lieu régulièrement ni à des époques fixes, comme celle des cartilages temporaires ; elle peut se faire attendre jusqu'à un âge très-avancé. Keil a vu les cartilages costaux non ossifiés sur un homme de cent trente ans ; Harvey a fait la même observation sur un autre de cent cinquante-deux. Au reste, le mécanisme de l'ossification est le même pour tous les cartilages.

§ III. *Altérations dans le développement.*

Le système cartilagineux est sujet à un petit nombre de vices de conformation : les cartilages costaux offrent quelquefois de ces irrégularités.

Il a été question (page 197) du développement accidentel de ce système : nous reviendrons, dans le système synovial, sur les corps étrangers des articulations, et sur le véritable mécanisme de leur formation. Les productions cartilagineuses diffèrent, comme toutes les autres, suivant qu'elles paraissent dé-

posées, pour ainsi dire, dans les interstices des organes, ou qu'elles sont dues à une transformation qu'a subie l'un d'entre eux. Des masses cartilagineuses isolées ont été trouvées dans diverses parties. Plus souvent encore divers organes deviennent cartilagineux. M. Laennec a rencontré dans l'urètre cette transformation : je l'ai observée dans le vagin, à la suite du renversement de la matrice; je l'ai vue également dans le prépuce, dans un cas de phimosis. (BÉCLARD.)

SYSTÈME FIBREUX (1).

Les organes fibreux n'ont point été considérés par les anatomistes d'une manière générale : personne n'en a encore fait un système. Isolément décrits parmi les parties où ils se trouvent, ils ne peuvent offrir, dans l'état actuel de la science, aucune de ces vues grandes et si utiles à la pratique de la médecine, qui nous montrent chaque appareil organique résultant de la combinaison de différens systèmes dont nous retrouvons les analogues dans les autres appareils, en sorte que, quoique très-différens par rapport à leurs fonctions, ces appareils sont cependant sujets aux mêmes maladies,

(1) Il faut convenir que cette dénomination n'est pas heureuse; car elle s'applique visiblement à tous les tissus dont les élémens anatomiques sont disposés en séries linéaires ; et cependant, en réalité, on ne comprend sous ce nom, en anatomie générale, qu'une partie de ces organes. Ce n'est pas que les anatomistes n'aient cherché à modifier sous ce rapport le langage scientifique; mais leurs tentatives n'ont pas eu tout le succès désirable : les termes de tissu *albugineux*, *tendineux*, *aponévrotique*, en sont la preuve. Celui de *ligamenteux* ou *desmeux*, proposé par Béclard, offrirait les mêmes inconvéniens ; car il insinuerait, tout-à-fait à tort, que ce système est seulement employé, dans l'économie, à fixer les unes aux autres ou à retenir en place certaines parties.

(F. Blandin.)

parce que des systèmes semblables entrent dans leur structure.

J'ai présenté, il y a deux ans, sur les membranes fibreuses, divers aperçus généraux qui ont ouvert la voie; mais ces membranes ne sont qu'une division du système fibreux, qu'il faut ici considérer plus en grand.

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES ET DES DIVISIONS DU SYSTÈME FIBREUX.

Quoique tous les organes fibreux aient une nature absolument identique, quoique la même fibre entre dans la composition de tous, cependant les formes qu'ils affectent sont extrêmement variables : c'est même cette variété de formes, jointe à celle de leur position et de leurs fonctions, qui les a fait différemment dénommer, qui les a fait désigner sous les noms de *tendons*, d'*aponévroses*, de *ligamens*, etc.; car il n'y a point ici de dénomination générale pour tout le système, de mot qui réponde, par exemple, à ceux de *muscle*, de *nerf*, etc.; lesquels, dans les systèmes musculaire, nerveux, etc., donnent l'idée de l'organisation, quelle que soit la forme de l'organe. Je ne créerai point ce mot : on m'entendra facilement sans lui.

Toutes les formes fibreuses peuvent se rapporter à deux générales; l'une est la membraneuse, l'autre est celle en faisceaux. L'organe est large et mince

dans la première; il est allongé et plus épais dans la seconde. Ainsi les muscles, les nerfs, les os eux-mêmes, présentent-ils alternativement cette disposition dans leur conformation, comme on le voit dans la rétine comparée aux nerfs en cordon, dans les couches musculeuses de l'estomac, des intestins, comparées aux muscles locomoteurs; dans les os du crâne comparés à ceux des membres.

§ Ier. *Des Organes fibreux à forme membraneuse.*

Les organes fibreux disposés en membranes sont, 1° les membranes fibreuses proprement dites, 2° les capsules fibreuses, 3° les gaînes tendineuses, 4° les aponévroses.

1°. Les membranes fibreuses comprennent le périoste, la dure-mère, la sclérotique, l'albuginée, les membranes propres du rein, de la rate, etc., etc. Elles sont, en général, destinées à former l'enveloppe de certains organes, dans la texture desquels elles entrent.

2°. Les capsules fibreuses, très-distinctes, comme nous le verrons, des surfaces synoviales, sont des espèces de sacs cylindriques qui se trouvent autour de certaines articulations, spécialement à celles de l'humérus et du fémur, dont elles assurent les rapports avec l'omoplate et l'iliaque, en embrassant l'une et l'autre surfaces de l'articulation par leurs deux extrémités.

3°. Les gaînes fibreuses sont destinées à assujettir les tendons à leur passage sur les os, dans les endroits de leur réflexion, partout en général

où, par la contraction musculaire, ils pourraient éprouver une déviation, et par là ne transmettre qu'avec difficulté aux os le mouvement qu'ils reçoivent des muscles. On peut les diviser en deux espèces : les unes en effet reçoivent et transmettent les tendons réunis de plusieurs muscles, comme celles qu'on observe au poignet, au coude-pied, etc.; d'autres, comme celles des doigts, sont destinées à un tendon isolé ou à deux seulement.

4°. Les aponévroses sont des espèces de toiles fibreuses plus ou moins larges, entrant toujours dans le système locomoteur, et disposées de manière que, tantôt elles forment des enveloppes à diverses parties, tantôt elles fournissent aux muscles des points d'insertion : de là les aponévroses d'enveloppe et les aponévroses d'insertion. Chacune d'elles se divise en espèces.

Les aponévroses d'enveloppe sont placées tantôt autour d'un membre, auquel elles forment comme une gaîne générale, ainsi qu'on le voit à la cuisse, à l'avant-bras, etc., tantôt sur certains muscles qu'elles retiennent partiellement dans leurs places respectives, comme celle qui, du petit dentelé postérieur et supérieur, va au petit dentelé postérieur et inférieur, comme l'aponévrose abdominale, comme celle située antérieurement au soléaire, derrière les muscles profonds de la jambe, etc.

Les aponévroses d'insertion sont tantôt à surfaces plus ou moins larges, comme dans les attaches du triceps crural, du droit antérieur, des jumeaux, etc.; tantôt à fibres isolées les unes des autres, et donnant attache par chacune de ces fibres à une fibre

charnue, comme à l'insertion supérieure de l'iliaque, du jambier antérieur, etc.; tantôt enfin en-forme d'arcades; et alors, en même temps qu'elles offrent aux muscles des points d'insertion, elles laissent passer au-dessous d'elles des vaisseaux, comme au diaphragme, au soléaire, etc.

§ II. *Des Organes fibreux à forme de faisceaux.*

Les organes fibreux disposés en faisceaux sont, 1° les tendons, 2° les ligamens.

1°. Les tendons se trouvent à l'origine, à l'insertion ou au milieu des muscles. Ils sont ou simples, en forme de cordes allongées, comme aux péroniers, aux jambiers, et à presque tous les muscles; ou composés, comme au droit antérieur, aux fléchisseurs, etc.

2°. Les ligamens affermissent les articulations osseuses ou cartilagineuses autour desquelles ils se trouvent. Ils sont à faisceaux réguliers, comme les ligamens latéraux du coude, du genou, de la mâchoire, etc.; ou à faisceaux irréguliers, comme ceux du bassin.

§ III. *Tableau du Système fibreux.*

On peut, dans le tableau suivant, se représenter sous un simple coup d'œil la classification que je viens d'indiquer pour les organes fibreux :

ORGANES FIBREUX

- à forme membraneuse.
  - Membranes fibreuses.
  - Capsules fibreuses.
  - Gaînes fibreuses
    - partielles.
    - générales.
  - Aponévroses. . .
    - à enveloppe..
      - partielle.
      - générale.
    - d'insertion . .
      - à surface large.
      - en arcade.
      - à fibres isolées.
- à forme de faisceaux.
  - Tendons . . . .
    - simples.
    - composés.
  - Ligamens . . . .
    - à faisceaux réguliers.
    - à faisceaux irréguliers.

Quoique les nombreux organes qui entrent dans cette classification appartiennent à des appareils très-différens, quoiqu'ils semblent être disséminés çà et là dans l'économie, sans tenir aucunement ensemble, quoique tous paraissent isolés, cependant tous sont presque continus, tous se tiennent; en sorte qu'on pourrait considérer le système fibreux comme les systèmes vasculaire et nerveux cérébral, c'est-à-dire comme ayant un centre commun d'où partent tous les organes divers qui forment ses divisions.

Ce centre commun du système fibreux me paraît

être le périoste; non que je prétende que, comme le cœur ou le cerveau, il exerce des irradiations sur les organes qui en partent, mais parce que l'inspection anatomique nous montre tous les organes fibreux liés étroitement avec lui, et communiquant ensemble par son moyen : les observations suivantes en sont la preuve.

1°. Parmi les membranes fibreuses, celle du corps caverneux s'entrelace avec le périoste au-dessous de l'ischion ; la dure-mère se continue avec lui à travers les trous de la base du crâne; en s'unissant par la lame qui accompagne le nerf optique avec la sclérotique, elle joint à lui cette membrane, et leur sert d'intermédiaire. 2°. Toutes les capsules fibreuses s'entrelacent en haut et en bas de l'articulation avec le périoste. 3°. Partout où existent des gaînes fibreuses, leurs fibres s'entremêlent aux siennes. 4°. Toutes les aponévroses, soit d'enveloppe, soit d'insertion, offrent un semblable entrelacement. 5°. Partout les tendons, en s'épanouissant, se confondent aussi avec cette membrane. 6°. Aux deux extrémités des ligamens elle unit aussi ses fibres aux leurs. Il n'est guère que l'albuginée, le périchondre du larynx, les membranes de la rate et du rein, qui fassent exception à cette règle générale.

Le système fibreux doit donc être conçu d'une manière générale, c'est-à-dire, se prolongeant partout, appartenant en même temps à une foule d'appareils organiques, distinct dans chacun par sa forme, mais se continuant dans le plus grand nombre, ayant partout des communications. Cette ma-

nière de l'envisager paraîtra plus naturelle encore, si l'on considère que le périoste, aboutissant général des diverses portions de ce système, est lui-même partout continu, et qu'à l'endroit où les articulations le séparent, les capsules fibreuses et les ligamens servent, ainsi que nous l'avons dit, à le réunir.

On conçoit, d'après cet usage du périoste par rapport au système fibreux, quel est l'avantage de sa situation sur les os, qui lui offrent un appui solide, et par là même aux organes dont il est l'aboutissant.

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME FIBREUX.

Au milieu des variétés de formes que nous venons d'examiner, l'organisation générale des organes fibreux est toujours à peu près la même. Je vais considérer ici cette organisation; je traiterai ailleurs des variétés qu'elle éprouve dans chaque partie. Elle résulte de l'assemblage d'un tissu propre et des systèmes vasculaire, cellulaire, etc.

§ Ier. *Du Tissu propre à l'organisation du Système fibreux.*

Tout organe fibreux a pour base une fibre d'une nature particulière, dure, un peu élastique (1), in-

(1) Les fibres du tissu fibreux, sous le rapport de l'élasticité,

sensible, presque pas contractile, tantôt juxtaposée et parallèlement assemblée, comme dans les tendons, les ligamens; tantôt entrecroisée en divers sens, comme dans les membranes, les capsules, les gaînes fibreuses, etc., mais partout la même, partout d'une couleur blanche ou grise, d'une résistance très-marquée.

Cette résistance du tissu fibreux rend tous les organes qu'il compose propres à soutenir les plus grands efforts. Aussi ces organes sont-ils tous destinés à des usages qui nécessitent cette faculté : les ligamens retiennent avec force les surfaces articulaires en rapport; les aponévroses brident les muscles et résistent à leur déplacement; les tendons, sans cesse en butte à la contraction de ces organes, se trouvent à chaque instant placés entre la puissance énergique qu'ils représentent et les résistances plus ou moins considérables situées à l'extrémité des muscles, etc. Telle est cette résistance, que souvent elle est supérieure à celle des os eux-mêmes. On sait que, dans les efforts musculaires, la rotule, l'olécrâne et le calcanéum se fracturent quelquefois : or, cela ne pourrait avoir lieu si les tendons extenseurs qui correspondent à ces divers os offraient aux contractions un tissu plus facile à déchirer.

---

peuvent être partagées en deux classes, comme le tissu lui-même : les unes élastiques et jaunes, les autres peu élastiques et blanches. Tout ce que Bichat dit ici se rapporte aux secondes; quant à ce qui concerne les premières, *voyez* plus bas une note de Béclard. (F. Blandin.)

C'est à cette résistance qu'il faut attribuer les phénomènes suivans : 1° on éprouve les plus grandes difficultés à faire des luxations sur le cadavre, principalement dans les articulations communément nommées énarthrodiales ; 2° sur le vivant les efforts extérieurs suffisent rarement pour les produire : il faut que l'action efficace des muscles y soit jointe. 3°. Le supplice autrefois usité, par lequel on tirait à quatre chevaux les membres des criminels, était d'autant plus affreux, que la résistance des ligamens le faisait durer plus long-temps : presque toujours les chevaux étaient impuissans pour produire l'arrachement des membres; il fallait que l'instrument tranchant aidât à leurs efforts. 4°. Des poids suspendus à un tendon ne le rompent que lorsqu'ils sont énormes : aussi les meilleurs liens à employer dans les arts seraient-ils ceux tissus avec des organes fibreux, si la dessiccation n'enlevait à ces organes leur mollesse et leur flexibilité, si l'humidité ne les altérait, etc. 5°. On ne peut qu'avec des efforts extrêmes déchirer une aponévrose, surtout celles qui sont un peu épaisses, comme le fascia-lata, l'albuginée, la dure-mère, etc.

Cependant cette résistance est quelquefois surmontée dans le vivant, et la pratique chirurgicale offre en quelques cas la rupture des tendons du soléaire, du plantaire grêle, des extenseurs de la cuisse, etc. Alors, comment se fait-il que le tissu du muscle, plus mou, ne cède jamais, tandis que celui du tendon, beaucoup plus dense, se rompt? C'est que toujours, dans ces cas, les fibres charnues sont en contraction, par conséquent loin d'être dis-

tendues, comme le sont les fibres tendineuses, qui se trouvent alors, pour ainsi dire, passives. Les portions diverses de ces fibres charnues font effort pour se rapprocher, et se rapprochent en effet; ce qui donne aux muscles une densité et une dureté égales, et même, en certains cas, beaucoup supérieures à celles de leur tendon, comme on peut le voir en appliquant la main sur un muscle en contraction. Une preuve que ces sortes de ruptures tiennent à la cause que j'indique, c'est que si, dans un cadavre, on suspend un poids à un muscle détaché de l'os par une de ses extrémités, ce sera la portion charnue, et non la tendineuse, qui se rompra.

Le tissu fibreux a été considéré par quelques anatomistes comme étant d'une nature approchant de celle du tissu musculaire, et même comme en étant quelquefois la continuation. Ainsi ont-ils dit que le tendon ne résultait que d'un rapprochement des fibres charnues, qui, sans changer de nature, perdaient seulement leur rougeur. Ainsi les aponévroses d'enveloppe ont-elles été envisagées comme un effet de la pression des corps environnans sur les fibres charnues les plus extérieures. Pour faire voir combien peu de fondement a cette opinion, il suffit de remarquer, 1° que la dure-mère, la sclérotique, le périoste, les ligamens, sont évidemment de même nature que les tendons et les aponévroses et que cependant ils diffèrent totalement du tissu musculaire; 2° que la composition chimique, les propriétés vitales, la texture apparente, sont entièrement différentes dans la fibre tendineuse et dans

la musculeuse; qu'il n'y a aucun rapport entre les fonctions de l'une et de l'autre. Il y a certainement moins d'analogie entre le muscle et le tendon qui reçoit son insertion, qu'entre celui-ci et l'os qui lui fournit une attache, et dont la portion cartilagineuse s'en rapproche par sa nature. Un muscle et son tendon forment un appareil organique, et non un organe simple (1).

Quelle est la nature du tissu fibreux? On l'ignore, parce qu'on ne lui connaît pas de propriétés bien caractérisées; il n'en a que de négatives de celles du tissu musculaire, que caractérise la contractilité, et de celles du tissu nerveux, que distingue la sensibilité. On la voit toujours dans un état passif; elle obéit à l'action qui lui est imprimée, et n'en a guère qui lui soit propre.

Elle établit une grande différence entre les organes où elle existe, et la peau, le tissu cellulaire, les cartilages, les membranes séreuses, etc. : aussi

---

(1) Il paraîtrait même y avoir, suivant la remarque de Murray, entre le muscle et le tendon une substance intermédiaire, différente de tous les deux, et servant à les unir. Du moins, en regardant attentivement, contre le jour, la fibre tendineuse et la musculaire, on trouve que leur intervalle est demi-transparent : et il ne semble de la nature ni de l'une ni de l'autre fibre. Cette substance est d'autant plus distincte que les muscles sont mieux nourris : elle est peu apparente chez les sujets morts dans l'émaciation. La disposition des vaisseaux de ces parties est encore une raison de plus pour ne point admettre leur continuation : ces vaisseaux ne se prolongent pas de l'une à l'autre, mais se terminent vers leur point d'union, ou se recourbent en cet endroit. (Béclard.)

a-t-on eu tort de rapporter toutes ces parties à une même classe désignée sous le nom d'*organes blancs*, mot vague qui ne porte que sur les apparences extérieures, sur des rapprochemens d'analyse encore incomplets, et nullement sur la texture, les propriétés vitales, la vie, les fonctions des organes. Fourcroy a bien pressenti que cette division extrêmement générale devait être subordonnée aux expériences ultérieures.

Quoi qu'il en soit, voici les résultats que donne le tissu fibreux soumis à la macération, à l'ébullition, à la dessiccation, à l'action des acides, etc.

Exposé à la macération, dans une température moyenne, le tissu fibreux y reste long-temps sans y éprouver d'altération; il conserve son volume, sa forme, sa densité : peu à peu cette densité diminue; le tissu se ramollit, mais il ne se dilate point, ne se boursoufle point, comme on l'a dit; ses fibres alors peuvent s'écarter les unes des autres; on voit distinctement entre elles le tissu cellulaire qui les unit. Enfin, au bout d'un temps très-long, elles finissent par se changer en une pulpe mollasse et blanchâtre, qui paraît homogène. Tous les organes fibreux ne se ramollissent pas de cette manière aussi vite les uns que les autres. Les tendons sont les premiers à céder à la macération. Viennent ensuite les aponévroses : parmi celles-ci, celles qui sont formées par l'épanouissement d'un tendon se ramollissent plus vite que celles destinées à envelopper les membres, que le fascia-lata, par exemple. Les membranes fibreuses, les capsules et les gaînes de même nature sont plus résistantes. Enfin ce sont

les ligamens qui cèdent le plus tard à l'action de l'eau qui tend à les ramollir : cependant, lorsqu'ils viennent primitivement d'un tendon, comme le ligament inférieur de la rotule, ils sont plus prompts à être macérés. J'ai fait comparativement des expériences sur tous ces organes : elles donnent le résultat que j'indique.

Tout organe fibreux plongé dans l'eau bouillante ou exposé à un calorique très-vif se crispe, se resserre comme la plupart des autres tissus animaux ; il se ramasse en un volume moindre que celui qu'il occupait : par là il devient plus solide, prend une élasticité qui lui est étrangère dans l'état naturel, et qu'il perd ensuite en se ramollissant pour passer à l'état gélatineux. En mettant toutes les parties de ce système en même temps dans une eau qu'on fait bouillir par degrés, on voit que ce ramollissement survient dans toutes au même degré, et avec à peu près la même force. Cette force, qui tend alors à faire contracter les fibres de ce système, est très-considérable : elle suffit pour rompre à l'endroit de leurs attaches celles du périoste, qui s'enlève, par ce mécanisme, de dessus tous les os bouillis un peu longuement ; pour faire détacher les ligamens inter-osseux, la membrane obturatrice, etc., lorsqu'on les plonge dans l'eau bouillante, avec les os auxquels ils adhèrent ; pour serrer si fortement les surfaces articulaires les unes contre les autres, qu'on ne peut plus les remuer, lorsqu'on les a exposées, entourées de leur ligamens, à l'action concentrée du calorique.

Peu à peu le tissu fibreux se ramollit dans l'eau

bouillante, devient jaunâtre, demi-transparent, et enfin se fond en partie. En mettant bouillir ensemble toutes les parties du système fibreux, j'ai observé que les tendons se ramollissent d'abord, puis les aponévroses, puis les membranes, capsules et gaînes fibreuses, et enfin les ligamens, qui sont, comme dans la macération, ceux qui cèdent les derniers. Plusieurs ont déjà fait cette remarque, à laquelle j'ajoute que tous les ligamens ne résistent pas également : ceux placés entre les lames des vertèbres sont les plus tenaces; ils ne prennent point cette couleur jaunâtre et cette demi-transparence communes à tout le système fibreux bouilli; ils restent blancs, coriaces; ils paraissent contenir beaucoup moins de gélatine, et être entièrement différens par leur nature (1).

---

(1) Ces ligamens appartiennent, en effet, à une division du système fibreux confondue pendant long-temps avec les autres organes du même nom, mais qui en diffère par une foule de caractères : je veux parler du tissu fibreux jaune ou élastique. Il faudra donc, à l'avenir, partager le système fibreux en deux grandes classes : l'une comprendra les organes fibreux blancs ou albugineux de M. Chaussier, l'autre les jaunes ou élastiques. Cette dernière expression est peut-être plus convenable que la première pour désigner ce genre de tissu, l'élasticité en étant le principal caractère, tandis que la couleur ne lui est pas aussi essentielle. Au reste, personne, que je sache, n'a donné de description complète de ce tissu : il n'a presque été indiqué jusqu'à ce jour que dans des leçons orales. M. Chevreul s'est, dit-on, occupé de sa composition.

Ce tissu se rencontre partout où il faut une résistance continuellement en action, une sorte d'antagonisme perpétuel, diffé-

Exposé à l'action de l'air, le système fibreux perd sa blancheur, par l'évaporation des fluides qu'il contient; il se racornit, jaunit, devient en partie transparent, se rompt avec facilité. Quelques jours après avoir été séché, si on le replonge dans l'eau,

---

rent sous ce rapport du fibreux ordinaire, dont la résistance est, pour ainsi dire, passive, et n'entre en exercice que par la distension, et du musculaire, qui ne résiste qu'autant que dure sa contraction. On la retrouve chez les animaux dans les mêmes circonstances. Le ligament cervical postérieur des quadrupèdes agit de cette manière pour s'opposer à la pesanteur, qui tend incessamment à fléchir leur tête. Une tunique de la même nature fortifie la paroi abdominale chez ces mêmes animaux, et l'empêche de céder au poids des viscères. Tout le genre des *chats* a un ligament élastique inséré à l'ongle, et maintenant celui-ci dans le sens de l'extension dès que l'animal ne contracte plus ses muscles pour le rendre saillant. Les écailles des bivalves, huîtres, moules, etc., s'ouvrent au moyen d'un tissu fibreux analogue, quand les muscles qui les ferment sont relâchés. Chez l'homme, outre les ligamens jaunes des vertèbres, on doit encore ranger parmi les organes que ce tissu concourt à former la membrane propre des artères, celle des veines, des vaisseaux lymphatiques, des conduits excréteurs, celle des voies aériennes, l'enveloppe fibreuse du corps caverneux, de l'urètre, peut-être aussi celle de la rate. Toutes ces parties ont besoin d'une force sans cesse active, opposée à la distension, et qui les fasse revenir sur elles-mêmes aussitôt que l'effort contraire cesse d'avoir le dessus.

Les fibres du tissu élastique ont la même disposition que celles du tissu fibreux blanc. Leur couleur tire plus ou moins sur le jaune; elle est plus marquée dans le cadavre. Leur ténacité est moindre que dans l'autre tissu; leur élasticité est, au contraire, plus grande. Les vaisseaux de ce tissu sont en petit nombre.

La coction ne le résout point en gélatine, comme le tissu

il reprend se blancheur, sa mollesse et presque son apparence primitives; en sorte qu'on dirait véritablement qu'à l'eau seule est due cette couleur blanchâtre : ce phénomène a lieu surtout dans les tendons. J'ai observé aussi sur ces derniers un autre phénomène remarquable : c'est que, quand ils ont macéré pendant quelque temps, et qu'on les expose ensuite à la dessiccation, ils ne prennent plus en séchant de couleur jaune, mais restent d'un blanc très-marqué. Sans doute que tout le système fibreux se comporte de même.

L'action des acides sulfurique et nitrique ramollit promptement le tissu fibreux; ce premier le réduit en une espèce de pulpe noirâtre, l'autre en une pulpe jaunâtre. A l'instant où on plonge ce tissu dans l'acide, il se crispe, se resserre comme dans l'eau bouillante.

---

fibreux blanc. Il paraît contenir beaucoup de fibrine, jointe à un peu de gélatine et d'albumine.

Ses propriétés sont peu marquées, à part l'élasticité et la résistance qui le caractérisent spécialement. Il ne paraît point sensible, ou du moins ne l'est-il, comme le système fibreux en général, que pour certains genres d'impressions. Il s'ossifie rarement. Il a pour fonctions de servir de lien ou d'enveloppe, et de faire en même temps l'office d'un ressort, qui obéit à l'extension et revient brusquement sur lui-même une fois qu'elle ne subsiste plus. C'est ce qui est bien manifeste dans les artères : la colonne de sang qu'elles contiennent, ébranlée à chaque contraction des ventricules, étend les parois de ces canaux; mais l'instant d'après, l'élasticité resserre ces parois : par là le cours du sang est continu, tandis qu'il devrait être interrompu si le cœur en était l'agent unique, comme nous l'avons dit ailleurs.

(Béclard.)

Le tissu fibreux résiste en général moins à la putréfaction que le cartilagineux; mais il y cède plus difficilement que le médullaire, le cutané, le muqueux, etc. Au milieu de ces tissus pourris et désorganisés dans nos cadavres des amphithéâtres, on trouve celui-ci encore intact; enfin il finit par s'altérer aussi. L'eau dans laquelle il a macéré donne une odeur moins infecte que celle qui a servi à la macération de la plupart des autres systèmes.

Plus digestible que les cartilages et que les fibro-cartilages, le tissu fibreux l'est moins que la plupart des autres. Les expériences de Spallanzani et de Gosse l'ont prouvé. Il paraît qu'il cède à l'action des sucs digestifs dans le même ordre qu'à la macération, à l'ébullition : ce sont, 1° les tendons, 2° les aponévroses, 3° les diverses membranes fibreuses, 4° les ligamens, lesquels sont le plus indigestes. Je remarque cependant qu'une fois que la coction a ramolli le tissu fibreux, il se digère à peu près uniformément. Ainsi les cartilages sont-ils d'aussi facile et même de plus facile digestion que les tendons, quand ils sont devenus gélatineux, comme Spallanzani l'a expérimenté sur lui-même, quoiqu'étant crus ils soient bien plus indigestes (1).

---

(1) Les organes fibreux forment le passage du tissu cellulaire à celui des muscles. Ils occupent un degré intermédiaire dans l'échelle organique. Le tissu cellulaire est presque uniquement formé de gélatine; le fibreux contient encore beaucoup de cette substance, mais, de plus, on y rencontre de la fibrine en quantité

§ II. *Des parties communes qui entrent dans l'organisation du Système fibreux.*

Le tissu cellulaire existe dans tous les organes fibreux ; mais il est plus ou moins abondant, suivant que leurs fibres sont plus ou moins rappro-

---

plus ou moins grande. Toutefois, parmi les organes fibreux, il existe sous le rapport de l'organisation des degrés secondaires bien distincts et importans à signaler ici. Quelle différence, en effet, ne trouve-t-on pas entre les simples membranes fibro-cellulaires et les tissus fibreux élastiques, entre l'aponévrose cervicale, par exemple, et les ligamens jaunes des vertèbres? Les premières sont très-voisines du tissu cellulaire ; ou mieux, ce sont, comme leur nom l'indique, de véritables hermaphrodites, que, dans une classification, on est embarrassé de rapporter au tissu cellulaire ou bien au tissu fibreux, ainsi que le témoignent les assertions des auteurs sous ce rapport. Les seconds sont réellement des organes fibro-musculaires, que les auteurs ont aussi quelquefois rangés parmi les muscles, et que l'on considère aujourd'hui, avec beaucoup plus de raison, comme appartenant à une variété du tissu fibreux. Qu'on étudie les opinions émises à diverses époques sur la nature de la tunique moyenne des artères, et l'on se convaincra de cette vérité. Enfin, et ce trait me paraît frappant en faveur du rapprochement que j'établis entre le tissu fibreux élastique et le tissu musculaire : lorsqu'une partie musculaire dans les animaux, tombe chez l'homme, dans des conditions un peu plus rudimentaires, elle revêt le caractère du tissu fibreux élastique ; la membrane du canal aérien, musculaire chez les animaux, fibreuse chez l'homme, en est un exemple ; et d'autre part, dans l'homme lui-même, on voit quelquefois en sens inverse, comme je l'ai dit plus haut, le ligament élastique stylo-hyoïdien subir la transformation musculaire. (F. Blandin.)

chées. Dans certains ligamens, il forme aux faisceaux fibreux des gaînes analogues à celles des muscles; dans d'autres, dans les tendons, les aponévroses, etc., on l'aperçoit avec peine; mais partout il devient très-sensible par la macération, par les affections maladives, comme par exemple, par les fongus de la dure-mère, par le carcinôme du testicule qui a envahi l'albuginée, par certains engorgemens du périoste, etc. Dans tous ces cas, le tissu fibreux, relâché, ramolli, dénaturé, devenu comme spongieux, laisse ses fibres s'écarter et l'organe cellulaire paraître très à nu. Le développement des bourgeons charnus, et la nature mollasse que prennent ces bourgeons dans certaines plaies qui intéressent l'organe fibreux, y prouvent encore l'existence de l'organe cellulaire, qui du reste y est en général en petite quantité; ce qui ne contribue pas peu à produire la résistance et la force des organes qui lui appartiennent. Ce tissu cellulaire contient-il de la graisse? Au premier coup d'œil on n'en observe point, puisqu'à peine peut-on distinguer ce tissu. Cependant, en soumettant à la dessiccation des portions d'aponévroses, de périoste, de dure-mère, etc., exactement dépouillées de toute partie étrangère, j'ai observé plusieurs fois que, lorsque tous ces fluides s'étaient évaporés, et que l'organe avait pris cette apparence de parchemin qu'on y remarque alors, une exsudation graisseuse restait en divers endroits de sa surface.

L'existence des vaisseaux varie dans le système fibreux : très-développés dans certains organes,

comme dans la dure-mère, le périoste, etc., ils le sont moins dans d'autres, comme dans les aponévroses, et nullement dans certains, comme dans les tendons. J'observe, en général, que c'est dans ceux où ils sont le plus prononcés que les inflammations, ainsi que les diverses espèces de tumeurs sont le plus fréquemment observées. Les affections de la dure-mère, du périoste, etc., comparées à celles des tendons, en sont une preuve remarquable.

Je ne sache pas qu'on ait suivi de vaisseaux absorbans dans le système fibreux.

Les nerfs lui paraissent également étrangers, malgré ce qu'on a écrit sur ceux du périoste, de la dure-mère, etc., etc.

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME FIBREUX.

§ Ier. *Propriétés physiques.*

Le système fibreux n'a qu'une très-faible élasticité dans l'état naturel; mais lorsque, extraits du corps, ses divers organes sont soumis à la dessiccation, ils en acquièrent une très-manifeste: aussi les tendons, les lambeaux aponévrotiques, etc., qui ne seraient dans l'état frais susceptibles d'aucune vibration, se trouvent-ils susceptibles de résonner dans les instrumens lorsqu'ils sont très-secs.

§ II. *Propriétés de Tissu.*

Les propriétés de tissu sont sensibles dans le système fibreux ; mais elles s'y trouvent moins prononcées que dans plusieurs autres.

L'extensibilité se manifeste, pour la dure-mère, dans l'hydrocéphale ; pour le périoste, dans les divers engorgemens dont les os sont susceptibles ; pour les aponévroses, dans le gonflement des membres, dans la distension des parois abdominales, qui, comme on le sait, sont autant aponévrotiques que charnues ; pour les capsules fibreuses, dans les hydropisies articulaires ; pour la sclérotique et l'albuginée, dans la tuméfaction de leurs organes respectifs.

Cette extensibilité du système fibreux est soumise à une loi constante et qui est étrangère à l'extensibilité de la plupart des autres systèmes : elle ne peut s'opérer que d'une manière lente, graduée, insensible. Aussi, quand elle est trop brusquement mise en jeu, il arrive deux phénomènes différens, qui supposent également l'impossibilité de s'étendre tout à coup, comme le font, par exemple, un muscle, la peau, le tissu cellulaire, etc. 1°. Si l'organe fibreux qui se trouve distendu est supérieur par sa résistance à l'effort qu'il éprouve, alors il ne cède point, et différens accidens en résultent. On en a des exemples dans les engorgemens inflammatoires qui se manifestent sous les aponévroses des membres, sous celles du crâne, au dedans des gaînes fibreuses des tendons, etc. Alors

ces divers organes fibreux, ne pouvant se distendre avec la même rapidité que les parties subjacentes qui se gonflent, compriment douloureusement ces parties tuméfiées, les exposent même quelquefois à la gangrène : c'est ce qui arrive dans ces étranglemens si fréquens dans la pratique chirurgicale, et qui nécessitent diverses opérations pour les débrider. 2°. Si l'organe fibreux est inférieur par sa résistance à l'effort subit qu'il éprouve, il se rompt au lieu de céder : de là la rupture des tendons, la déchirure des capsules fibreuses et des ligamens dans les luxations, celle des aponévroses dans certains cas assez rares rapportés par divers auteurs, etc., etc. On conçoit facilement que la grande résistance dont se trouve doué le tissu fibreux est principalement due à cette impossibilité de céder subitement à l'impulsion qui lui est donnée.

Dans l'extension lente et graduée à laquelle se prêtent les organes fibreux, on observe que souvent loin de s'amincir, de s'élargir aux dépens de leur épaisseur, ils augmentent au contraire en cette dimension. L'albuginée d'un testicule squirrheux, la sclérotique d'un œil hydropique ou cancéreux, le périoste d'un os rachitique, etc., nous présentent ce phénomène, dont l'inverse est quelquefois observé comme dans la distension des aponévroses abdominales produite par la grossesse, par l'hydropisie ascite, dans l'hydrocéphale, etc.

La contractilité de tissu est accommodée, dans le système fibreux, au mode de son extensibilité : de même qu'il ne peut tout à coup se distendre, il ne saurait revenir subitement sur lui-même quand il

cesse d'être distendu. Ce fait est remarquable dans la section d'un tendon, d'une portion aponévrotique, d'un ligament mis à nu sur un animal vivant; dans l'incision de la dure-mère, pour donner issue au sang épanché sous elle lors de l'opération du trépan, etc. Dans tous ces cas, les bords de la division ne subissent qu'un écartement à peine sensible : aussi, dans la rupture des tendons, l'écartement étant produit, non par le retour sur elles-mêmes des extrémités divisées, mais seulement par les mouvemens du membre, le contact s'obtient par la position où, dans l'état naturel, ce tendon n'est point tiraillé ; tandis que, dans un muscle divisé, il faut non-seulement cette position, mais celle où le relâchement est le plus grand possible, et encore souvent le contact ne s'obtient-il pas. Si, pendant qu'un muscle est distendu, on coupe son tendon sur un animal vivant, le bout tenant aux fibres charnues s'écarte un peu de l'autre par la rétraction de ces fibres; mais celui qui tient à l'os reste immobile ; en sorte qu'il n'y a alors qu'une cause d'écartement, au lieu qu'il y en a deux dans une portion charnue divisée. Si on coupe un tendon quand le muscle est relâché, ses bouts restent affrontés.

La contractilité de tissu se manifeste cependant au bout d'un certain temps dans le système fibreux, surtout lorsque l'organe a été préliminairement distendu : car, lorsqu'il est divisé dans son état naturel, elle est toujours presque nulle. La sclérotique, après la ponction à l'œil ou après l'amputation de la moitié antérieure de cet organe et l'évacuation de ses humeurs ; l'albuginée, la tunique propre de la

rate et celle du rein, après la résolution d'une tumeur qui avait distendu leurs organes respectifs; les capsules fibreuses après l'écoulement du fluide des hydropisies articulaires, les aponévroses abdominales après le premier et même le second accouchement, le périoste à la suite de la résolution des exostoses, etc., reviennent peu à peu sur eux-mêmes, et reprennent leurs formes primitives.

§ III. *Propriétés vitales.*

Il n'y a jamais dans le système fibreux ni contractilité animale, ni contractilité organique sensible. La sensibilité organique et la contractilité organique insensible s'y trouvent comme dans tous les autres organes.

La sensibilité animale y existe dans l'état naturel; mais elle s'y présente sous un mode particulier, dont aucun système de l'économie n'offre, je crois, d'exemple, et que personne n'a encore exactement indiqué. Les agens ordinaires qui la mettent en jeu, tels que les irritans divers, mécaniques, chimiques, etc., ne sauraient ici la développer, à moins que l'organe ne soit dans un état inflammatoire. Les tendons, les aponévroses, les membranes fibreuses, les ligamens, etc., mis à découvert dans les opérations, dans les expériences sur les animaux vivans, et agacés de différentes manières, ne font éprouver aucune douleur. Ce qu'on a écrit sur la sensibilité du périoste, de la dure-mère, etc., prise dans ce sens, est manifestement contraire à

l'observation. Mais si les organes fibreux sont exposés à une extension violente et subite, alors la sensibilité animale s'y manifeste au plus haut point: ce fait est surtout remarquable dans les ligamens, les capsules fibreuses, les aponévroses, etc.

Mettez à découvert une articulation sur un chien, celle de la jambe, par exemple; disséquez avec soin les organes qui l'entourent; enlevez surtout exactement les nerfs, de manière à ne laisser que les ligamens; irritez ceux-ci avec un agent chimique ou mécanique: l'animal reste immobile, et ne donne aucun signe de douleur. Distendez après cela ces mêmes ligamens, en imprimant un mouvement de torsion à l'articulation, l'animal à l'instant se débat, s'agite, crie, etc. Coupez enfin ces ligamens de manière à laisser seule la membrane synoviale, qui existe ici sans capsule fibreuse, et tordez ces deux os en sens contraire; la torsion cesse d'être douloureuse. Les aponévroses, les tendons même mis à découvert et tirés en sens opposé, produisent le même phénomène. J'ai fréquemment répété ces expériences, qui prouvent incontestablement ce que j'ai avancé, savoir, qu'incapable d'être mise en jeu par les moyens ordinaires, la sensibilité animale du système fibreux se prononce fortement dans les distensions dont il est le siége. Remarquez que ce mode d'être excité est analogue aux fonctions qu'il remplit. En effet, écarté par sa position profonde de toute excitation extérieure qui puisse agir sur lui chimiquement ou mécaniquement, il n'a pas besoin, comme le système cutané, par exemple, d'une sensibilité qui en transmette l'impres-

sion; au contraire, la plupart de ses organes, tels que les ligamens, les capsules fibreuses, les tendons, etc., étant très-sujets à être distendus, tiraillés, tordus, dans les violens mouvemens des membres, il était nécessaire qu'ils avertissent l'âme de ce genre d'irritation, dont l'excès aurait pu sans cela devenir funeste aux articulations ou aux membres. Voilà comment la nature accommode la sensibilité animale de chaque organe aux excitations diverses qu'il peut éprouver, à celles surtout qui deviendraient dangereuses si l'âme n'en était prévenue; car cette force vitale est l'agent essentiel par lequel l'animal veille à sa conservation.

C'est à ce mode de sensiblité du système fibreux qu'il faut principalement attribuer, 1° les douleurs vives qui accompagnent la production des luxations; 2° celles plus cruelles qu'on fait éprouver aux malades dans les extensions propres à les réduire, surtout lorsque, comme dans les anciens déplacemens, on est obligé d'employer des forces considérables; 3° les intolérables souffrances du supplice qui consistait à tirer un malheureux à quatre chevaux; 4° le sentiment pénible que font naître toutes les entorses, celui que détermine une distension forcée de la colonne épinière et par conséquent de ses ligamens, un mouvement trop brusque pour détourner la tête, etc.; 5° la douleur aiguë qu'éprouvent immédiatement avant l'accident ceux qui se rompent un tendon, douleur que la rupture elle même fait en partie cesser; 6° celle moins sensible que nous ressentons lorsqu'un tendon quelconque, celui d'Achille, par exemple, se trouve, par un

mauvaise position, un peu fortement tiraillé; 7° le surcroît considérable de douleur qu'on ressent, lorsque, dans un engorgement subjacent à une aponévrose, celle-ci ne pouvant prêter, se trouve très-fortement soulevée; 8° le sentiment pénible qu'on éprouve derrière le jarret, lorsqu'on veut forcer l'extension de la jambe, et que par là on tiraille les deux ligamens obliques destinés à borner cette extension, etc., etc.

C'est sans doute à l'insensibilité des organes fibreux pour un mode d'excitation, et à leur sensibilité pour un autre mode, qu'il faut rapporter les résultats contradictoires qu'ont offert les expériences de Haller d'une part, de ses antagonistes de l'autre, sur la membrane dure-mère.

Caractère des Propriétés vitales.

L'activité vitale commence à devenir bien plus prononcée dans le système fibreux, que dans les systèmes osseux et cartilagineux. Cela est prouvé très-manifestement, 1° par le mode de sensibilité animale que nous venons d'y observer, et qui est étranger aux deux autres; 2° par la disposition beaucoup plus grande de ce système à devenir le siége de douleurs plus ou moins fréquentes, et spécialement de l'inflammation, etc.; 3° par le caractère bien plus aigu qu'y prend cette affection, comme on peut le voir dans les rhumatismes aigus, lesquels affectent principalement les parties fibreuses des grandes articulations, de l'aisselle,

de la hanche, du genou, du coude, etc., les parties aponévrotiques des muscles, etc.; 4° de plus, par la grande mobilité des douleurs rhumatisantes, qui passent avec une promptitude étonnante d'un endroit à l'autre, qui supposent par conséquent une grande promptitude dans l'altération des forces vitales des différentes parties de ce système; 5° par la rapidité plus grande de sa cicatrisation : ainsi, en mettant à découvert des fractures faites exprès sur des animaux, j'ai constamment observé que déjà les bourgeons charnus provenus du périoste et de l'organe médullaire sont tous formés, qu'à peine ceux fournis par l'os lui-même ont pris naissance. J'observe, à l'égard de cette cicatrisation, que les parties du système fibreux où pénètrent le plus de vaisseaux sanguins, comme le périoste, les membranes fibreuses, les capsules, etc., sont les plus susceptibles de ce phénomène, qui est bien plus difficile dans ceux où peu et même et presque pas de sang aborde, comme dans les tendons, dont les bouts se réunissent avec peine. 6°. On peut enfin se convaincre de la différence de vitalité du système fibreux d'avec celle des précédens, par la marche d'une exostose comparée aux progrès bien plus rapides d'une périostose, d'un engorgement à la dure-mère, etc. Cependant il y a encore, sous le rapport de la vitalité, une lenteur remarquable dans ce système. On le voit surtout dans certaines affections des membres, où la gangrène se manifeste, et fait, ainsi que l'inflammation qui la précède, de rapides progrès dans le tissu cellulaire, les muscles, etc., tandis que, comme je l'ai dit,

les tendons qu'elles ont mis à découvert ne s'altèrent que quelque temps après, et sont remarquables par leur blancheur au milieu de la noirceur ou de la lividité générale.

Le système fibreux présente un phénomène remarquable: c'est que presque jamais il ne se prête à la formation du pus. Je ne sache pas qu'à la suite des inflammations de ce système on ait observé des collections purulentes. Le rhumatisme, qu'on range dans les phlegmasies, n'est jamais accompagné de ces collections; quelques extravasations gélatineuses ont seulement été trouvées autour des tendons. Ce qu'on prenait autrefois pour une suppuration de la dure-mère, dans les plaies de tête, est bien évidemment un suintement purulent de l'arachnoïde, analogue à celui de toutes les autres membranes séreuses. Pourquoi ce système se refuse-t-il ou se prête-t-il si difficilement à produire le pus, ou au moins n'y est-il pas autant disposé que la plupart des autres? Je l'ignore. Je ne sache pas non plus qu'au milieu des cartilages on ait trouvé des collections de ce fluide. Les inflammations du système cartilagineux sont remarquables en ce qu'elles se terminent rarement ou presque jamais par la suppuration.

Sympathies.

Toutes les espèces de sympathies se font observer dans le système fibreux. Parmi les sympathies animales, en voici quelques-unes de sensibilité. 1°. Dans certaines périostoses qui n'occupent qu'une petite surface, la totalité du périoste de l'os resté sain devient douloureuse. 2°. A la suite d'une meurtrissure du périoste, souvent la totalité du membre se gonfle et devient douloureuse. 3°. Dans les affections de la dure-mère, souvent l'œil s'affecte et ne peut supporter le contact de la lumière, phénomène qui peut aussi dépendre de la communication du tissu cellulaire, comme je l'ai dit, mais qui certainement est quelquefois sympathique. 4°. Dans le temps où l'on fait les extensions pour réduire une luxation, et que les ligamens articulaires souffrent par conséquent, le malade se plaint souvent de douleur dans un endroit du membre très-éloigné, etc., etc.

La contractilité est aussi mise en jeu dans les sympathies animales du système fibreux. 1°. La piqûre du centre phrénique cause, dit-on, dans les muscles faciaux, une contraction d'où naît le rire sardonique. 2°. La lésion des aponévroses, la distension des ligamens dans les luxations du pied, la déchirure des tendons, sont fréquemment accompagnées de mouvemens convulsifs des mâchoires, du tétanos même caractérisé. 3°. Une esquille fixée dans la dure-mère determine des contractions en divers muscles de l'économie. 4°. Dans les lésions

de l'albuginée, des aponévroses extérieures, on observe souvent de semblables phénomènes.

Dans les sympathies organiques du système fibreux, tantôt c'est la contractilité organique insensible qui est mise en jeu, tantôt c'est la contractilité organique sensible : voici des exemples du premier cas. 1°. La dure-mère étant enflammée, l'inflammation, qui suppose toujours un accroissement de forces toniques ou de contractilité organique insensible, se manifeste souvent au péricrâne, et réciproquement. 2°. L'irritation d'une étendue un peu considérable du périoste enflamme souvent et fait suppurer l'organe médullaire. 3°. Les ligamens articulaires étant distendus dans une entorse, toutes les parties voisines, et souvent tout le membre, se gonflent et deviennent un centre d'irritation où toutes les forces de la vie, la contractilité insensible en particulier, se trouvent beaucoup plus exaltées qu'à l'ordinaire, etc.

D'autres fois c'est la contractilité organique sensible qui entre en action. 1°. On observait souvent dans l'opération de la cataracte par abaissement, que la lésion de la sclérotique donnait lieu à des vomissemens sympathiques, à des soulèvemens de l'estomac, des intestins (1), etc. 2°. Une forte douleur née dans une partie quelconque, dans le système

(1) L'irritation qui produit ces phénomènes est-elle bien celle qui résulte de la lésion de la sclérotique? Je ne le pense pas. Il me paraît plus probable que c'est à la lésion des nerfs

fibreux en particulier, augmente beaucoup la contractilité organique sensible du cœur, et fait ainsi naître sympathiquement une accélération dans le mouvement qu'il imprime au sang. 3°. J'ai vu un homme à qui Desault réduisait un luxation, et qui, pendant que les ligamens fortement distendus lui occasionaient les plus vives douleurs, ne put s'empêcher de rendre ses excrémens, tant était grande la contraction du rectum.

On voit que, dans ces sympathies, tantôt c'est le système fibreux qui exerce son influence sur les autres, tantôt ce sont les autres qui exercent sur lui leur action. C'est principalement lorsqu'il est tiraillé, lorsque le mode particulier de sensibilité animale dont il jouit y est fortement mis en jeu,

---

ciliaires que tout doit être rapporté. Ces nerfs, en effet, émanés pour la plupart du ganglion orbitaire du grand sympathique, marchent entre la sclérotique et la choroïde, parallèlement à l'axe de l'œil, jusqu'au cercle ciliaire qu'ils traversent pour aller ensuite se terminer dans l'iris : par conséquent, il doit arriver souvent qu'ils soient lésés dans l'opération de la cataracte par dépression, puisque l'aiguille traverse la sclérotique au-dessus du cercle ciliaire. L'opinion que je professe ici a été, au reste, partagée par des hommes du premier mérite, et notamment par Chaussier, Béclard, etc. De là le précepte donné par eux, dans l'opération de la cataracte par dépression, de piquer la sclérotique en dirigeant en haut la convexité de l'aiguille, de manière à mettre le plus grand diamètre de la partie aplatie de l'instrument, en rapport avec le diamètre intéro-postérieur de l'œil, de manière surtout à opposer aux nerfs ciliaires le plus petit diamètre de l'aiguille, et ainsi courir le plus de chances possible pour éviter ces parties. (F. Blandin.)

qu'il détermine dans toute l'économie un trouble sympathique remarquable. Je présume que les anciens considéraient comme des nerfs toutes les parties blanches, les ligamens, les tendons, etc., à cause des accidens très-graves qu'ils avaient observé résulter de leur distension dans les entorses, dans les luxations compliquées du genou, du coude, du coude-pied, luxations qui ne peuvent être produites sans un violent tiraillement d'une foule de ligamens, de parties aponévrotiques, tendineuses, etc. Un coup de sabre qui divise les ligamens du tarse, un corps qui les meurtrit, produisent des accidens bien moins graves qu'une fausse position qui les distend. Ceci nous mène à une belle considération générale, dont l'examen des autres systèmes constate aussi la réalité; savoir, que c'est le mode de propriétés vitales dominant dans un système qui est mis spécialement en jeu par les sympathies. Comme le mode de sensibilité animale susceptible de répondre aux agens de distension est ici le plus caractérisé, c'est lui qui joue le rôle principal dans les sympathies fibreuses.

ARTICLE IV.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME FIBREUX.

§ Ier. *État du Système fibreux dans le premier âge.*

Au milieu de l'état muqueux de l'embryon, on ne distingue point encore les organes fibreux. Tout est confondu : ce n'est que lorsque déjà plusieurs autres organes sont formés qu'on en aperçoit les traces. Ceux en forme de membranes se présentent d'abord sous l'aspect de toiles transparentes; ceux disposés en faisceaux paraissent être un corps homogène. En général, les fibres ne sont point distinctes dans le premier âge : les aponévroses, les membranes fibreuses, les tendons, etc., ne m'en ont offert aucune trace ; tout alors semble être uniforme dans la texture des organes fibreux. Dans le fœtus de sept mois, on commence à distinguer insensiblement les fibres blanches : rares d'abord, et écartées les unes des autres, elles se rapprochent peu à peu après la naissance, se disposent parallèlement, ou s'entrecroisent en divers sens, suivant l'organe, qu'elles finissent enfin par envahir entièrement à un certain âge, si je puis me servir de cette expression. C'est surtout au centre phrénique du diaphragme, sur la dure-mère, sur l'aponévrose de la cuisse, qu'on fait facilement ces observations.

A mesure que les fibres se développent dans les organes fibreux, ils prennent plus de résistance et

de dureté. Dans le fœtus, et dans les premières années, ils sont extrêmement mous; ils cèdent facilement: leur blancheur a une teinte toute différente de celle qu'ils affectent à un âge plus avancé; ils sont d'un blanc perlé. Ce n'est que peu à peu qu'ils parviennent à ce degré de force qui caractérise spécialement leur tissu.

C'est à cette mollesse, à ce défaut de résistance du système fibreux dans les premières années, qu'on doit attribuer les phénomènes suivans: 1° les articulations se prêtent à cet âge à des mouvemens que la raideur des ligamens rend impossibles dans la suite; toutes les extensions peuvent alors se forcer au-delà de leur degré naturel. On sait que c'est à cette époque que les faiseurs de tours commencent à s'exercer: jamais ils ne pourraient parvenir à exécuter les mouvemens extraordinaires qui nous frappent, si l'habitude n'entretenait chez eux depuis l'enfance la facilité de ces mouvemens. 2°. Les luxations sont en général rares dans le premier âge, parce que les capsules fibreuses cèdent et ne se rompent pas. 3°. Les entorses ont alors des suites moins funestes. 4°. Les engorgemens inflammatoires subjacens aux aponévroses sont rarement susceptibles de ces étranglemens souvent funestes dans un âge adulte. 5°. Cette mollesse du système fibreux s'accommode aussi, dans les tendons, les ligamens, les aponévroses, etc., d'une part à la multiplicité et à la fréquence, de l'autre au peu de force des mouvemens de l'enfant.

Je remarque que, quoique le système fibreux ait dans le premier âge une mollesse de texture à peu

près uniforme dans toutes les parties qui appartiennent au même ordre, il est cependant plus ou moins développé suivant les régions où il se trouve. En général, quand il appartient à des organes précoces dans leur développement, comme au cerveau par la dure-mère, aux yeux par la sclérotique, etc., il a plus de volume, plus d'épaisseur proportionnellement; mais ce n'est que sur ses dimensions, et non sur son organisation intime, que portent alors ces différences.

Il est vraisemblable que ce mode d'organisation du système fibreux influe, à l'époque qui nous occupe, sur son mode de vitalité, et par conséquent sur ses maladies. On sait que le rhumatisme, qui paraît assez probablement affecter ce système, est rarement l'apanage des enfans du premier âge; que sur cent malades affectés de ces sortes de douleurs, il en est quatre-vingt-dix au moins au-dessus de l'âge de quinze à seize ans.

Soumis à l'ébullition, dans le fœtus et dans l'enfant, le système fibreux se fond avec facilité, mais ne prend pas cette couleur jaunâtre qui est son attribut constant lorsqu'on le fait bouillir dans l'âge adulte : on sait que les gelées des jeunes animaux sont beaucoup plus blanches que celles des animaux avancés en âge.

§ II. *État du Système fibreux dans les âges suivans.*

A mesure qu'on avance en âge, le système fibreux devient plus fort, plus dense : il reste, dans l'âge adulte, comme stationnaire, quoique cepen-

pant l'absorption et l'exhalation alternatives des substances nutritives continuent toujours. Ces deux fonctions se distinguent difficilement dans l'état ordinaire; mais l'exhalation est très-apparente lorsque, par une contusion ou une cause interne quelconque, le périoste, les capsules fibreuses, les ligamens, etc., se gonflent, s'engorgent, etc. L'absorption, à son tour, devient prédominante lorsque le dégorgement et la résolution surviennent.

Dans les vieillards, le système fibreux devient de plus en plus dense et serré; il cède bien plus difficilement à la macération et à la putréfaction; les dents des animaux qui s'en nourrissent le déchirent avec plus de difficulté; les sucs gastriques l'attaquent moins facilement. Spallanzani a observé que les tendons et les aponévroses des vieux animaux sont beaucoup plus indigestes que ceux des jeunes. Avec l'âge, la force du tissu fibreux augmente, mais sa mollesse diminue; de là la difficulté des mouvemens, leur raideur : les ligamens, les capsules fibreuses ne permettent qu'avec peine aux surfaces articulaires de s'écarter les unes des autres; les tendons ne se plient qu'avec difficulté; lorsqu'on presse à l'extérieur les endroits où ils sont à nu sous les tégumens, on sent qu'ils sont durs, peu souples, etc. On ne peut qu'avec peine, et qu'au bout d'un temps très-long, les ramollir par l'ébullition. Tout le système fibreux jaunit: on dirait qu'il se rapproche alors de cet état dense, racorni et demi-transparent auquel le réduit la dessiccation : en sorte que, si l'on pouvait supposer ce système parcourant plus vite que les autres les périodes

diverses de son décroissement, tous les mouvemens cesseraient par la rigidité des ligamens, des tendons, des aponévroses, alors même que l'énergie de contraction subsisterait encore dans les muscles (1).

§ III. *Développement accidentel du Système fibreux.*

Nous avons vu que diverses productions appartenant par leur nature au système osseux ou au cartilagineux se développent quelquefois accidentellement dans certaines parties. L'anatomie pathologique nous montre aussi des productions où l'apparence fibreuse est très-manifeste. J'ai fait plusieurs fois cette observation dans des tumeurs de la matrice, des trompes, etc. : au lieu de la matière lardacée qui est si commune dans ces affections organiques, on voit un ou plusieurs amas de fibres entassées, très-distinctes, jaunâtres, etc. Je ne puis cependant répondre que ces excroissances appartiennent essentiellement, par les substances qui les composent, au système fibreux, n'ayant point fait sur elles des expériences comparatives à celles tentées sur les organes de ce système.

---

(1) En se développant, le tissu fibreux passe successivement par les états muqueux et cellulaire ; puis il revêt l'état qui le caractérise lors de sa complète évolution.

(F. Blandin.)

ARTICLE V.

DES MEMBRANES FIBREUSES EN GÉNÉRAL.

Après avoir considéré le système fibreux d'une manière générale, sous les rapports de son organisation, de sa vie, de ses propriétés et de sa nutrition, je vais l'examiner plus en particulier dans les grandes divisions qu'il nous offre, et que nous avons indiquées plus haut. Je commence par les membranes fibreuses.

§ Ier. *Formes des Membranes fibreuses.*

Ces sortes de membranes, qui comprennent, ainsi qu'il a été dit, le périoste, la dure-mère, la sclérotique, l'albuginée, les membranes propres du rein, de la rate, celle du corps caverneux, etc., sont presque toutes destinées à former des enveloppes extérieures, des espèces de sacs où se trouvent contenus les organes qu'elles revêtent.

Ces organes ne sont point, comme ceux autour desquels se déploient les surfaces séreuses, comme l'estomac, les intestins, la vessie et les poumons, sujets à des dilatations et à des contractions alternatives : cela ne s'accommoderait point avec leur mode d'extensibilité. Elles se moulent exactement sur la forme de ces organes, et ne présentent point ces replis nombreux qu'on voit dans les membranes séreuses, si l'on en excepte cependant la dure-mère.

Leurs deux surfaces sont adhérentes, caractère qui les distingue spécialement des membranes précédentes, ainsi que des muqueuses.

L'une de ces surfaces, intimement unie à l'organe, semble y envoyer différens prolongemens, qui identifient au premier coup d'œil son existence à celle de la membrane. Une foule de fibres détachées de l'albuginée, de l'enveloppe des corps caverneux, de la tunique propre de la rate, etc., ou plutôt adhérentes à ces tuniques, pénètrent dans les organes respectifs de ces membranes, et, s'y entrecroisant en divers sens, forment pour ainsi dire le canevas, la charpente autour de laquelle s'arrangent et se soutiennent les autres parties constituantes de ces organes, qui semblent, d'après cela, avoir pour moule leurs membranes extérieures. Aussi les voit-on, lorsque ces moules viennent à être enlevés, pousser çà et là d'irrégulières végétations : le cal, dans les déplacemens trop considérables pour permettre au périoste de se prolonger sur les surfaces divisées, est inégal, raboteux, etc.; la figure du testicule s'altère dès que l'albuginée a été intéressée dans un point quelconque, etc. Cette adhérence de la membrane fibreuse qui enveloppe divers organes avec les prolongemens intérieurs de ces organes, avec les fibres qui composent leur canevas, a fait croire aux anatomistes que la nature de l'une était la même que celle des autres, que ceux-ci n'étaient que des prolongemens de la membrane : je le croyais aussi en publiant mon *Traité des Membranes;* mais de nouvelles expériences m'ont convaincu du contraire.

Je puis assurer d'abord que la membrane des corps caverneux appartient seule, dans ces corps, au système fibreux. Le tissu spongieux intérieur renfermé dans la cavité de cette membrane n'en a nullement la nature, n'en est point, comme le disent tous les anatomistes, un prolongement. Ce ne sont pas des lames qui, suivant l'expression commune, se détachent de la membrane, et produisent par leur entrecroisement le tissu spongieux : celui-ci est un corps à part, distinct par sa vie et par ses propriétés.

En exposant un corps caverneux à l'ébullition, j'ai manifestement observé cette différence : la membrane externe se comporte comme tous les organes fibreux, devient épaisse, jaunâtre, demi-transparente, puis se fond plus ou moins en gélatine; le tissu spongieux reste au contraire blanc, mollasse, n'augmente point de volume, ne se crispe presque point sous l'action du feu, présente un aspect, en un mot, que je ne puis comparer à celui d'aucun tissu traité également par l'ébullition.

La macération sert très-bien aussi à distinguer ces deux tissus : le premier ne cède que lentement; ses fibres restent long-temps distinctes; elles ont encore leur disposition naturelle, que déjà le second est réduit en une pulpe homogène, rougeâtre, où rien de fibreux, rien d'organique ne se distingue plus. En général, il paraît que le tissu spongieux des corps caverneux est leur partie essentielle, celle où se passent les grands phénomènes de l'érection, celle qu'anime le mode particulier de motilité qui le distingue des autres organes : l'é-

corce fibreuse n'est qu'accessoire à ses fonctions ; elle n'est qu'une enveloppe ; elle ne fait qu'obéir, dans l'érection, à l'impulsion qui lui est communiquée.

Lorsqu'on expose le corps caverneux à l'action de l'acide nitrique, le tissu spongieux, lavé du sang qu'il contient, devient d'un jaune bien plus marqué que la membrane fibreuse : cela les fait distinguer l'un de l'autre d'une manière sensible.

En exposant le testicule à l'action de l'eau bouillante, on remarque également que son tissu intérieur prend un aspect tout différent de celui de sa membrane extérieure ; il devient d'un brun foncé, tandis qu'elle reste blanchâtre : elle ne prend pas l'apparence gélatineuse d'une manière aussi marquée et aussi prompte que celle du corps caverneux.

Soumis à la macération, le testicule est aussi tout différent dans son enveloppe et dans son tissu intérieur.

La surface des membranes fibreuses opposée à celle qui correspond à leur organe est jointe aux parties voisines, tantôt d'une manière lâche, comme l'enveloppe caverneuse ; tantôt par des liens très-serrés, comme la dure-mère. En général, les membranes, et même tous les organes fibreux, ont une tendance singulière à s'unir intimement aux surfaces séreuses et muqueuses : on en trouve des exemples, pour les membranes séreuses, dans l'union de la dure-mère avec l'arachnoïde, de l'albuginée avec la tunique vaginale, des capsules fibreuses avec les sy-

noviales. Telle est l'intimité de cette adhérence, que la dissection la plus exacte ne peut la détruire dans l'âge adulte. Dans l'enfance, elle est beaucoup moindre, comme on le voit surtout très-bien dans le rapport qui existe entre la base du péricarde et le centre phrénique, rapport qui est tel que, dans le premier âge, on peut avec facilité isoler les deux surfaces, qui sont plutôt contiguës que continues, tandis que dans les âges suivans on ne saurait y parvenir.

Quant à l'union des surfaces muqueuses avec les fibreuses, lorsqu'elles se trouvent contiguës, elles se confondent entièrement : cela s'observe dans la pituitaire, dans la membrane des sinus, dans celle de l'oreille, etc. Le périchondre du larynx, de la trachée, ne fait qu'un avec leur membrane interne. Dans toutes ces parties, le périoste s'entrelace tellement avec la surface muqueuse, qu'il est impossible de les séparer, et qu'on les enlève en même temps de dessus l'os, qui alors reste à nu. Le conduit déférent, les trompes de Fallope, les uretères, etc., sont aussi très-manifestement fibro-muqueux.

§ II. *Organisation des Membranes fibreuses.*

Les membranes fibreuses ont, en général, une texture très-serrée, une épaisseur remarquable ; elles ne sont formées que d'un seul feuillet. La dure-mère semble faire exception à cette règle, par les replis qui forment la faux et la tente du cervelet ; mais, excepté à l'endroit des sinus, il est

très-difficile, impossible même, d'y trouver deux lames distinctes.

Ces membranes ont plus de vaisseaux que toutes les autres divisions du système fibreux; elles sont percées d'un très-grand nombre de trous pour le passage de ces vaisseaux, dont la plupart ne font que les traverser, et se rendent ensuite dans les organes qu'elles recouvrent. Ces trous, dont chacun est plus large que le rameau qu'il transmet, forment encore un caractère des membranes fibreuses qui les distingue des séreuses, qui se replient toujours et ne s'ouvrent jamais pour laisser pénétrer le système vasculaire dans leurs organes respectifs.

Au reste, la description particulière des membranes qui nous occupe sera jointe à celles des organes qu'elles entourent. J'en excepterai cependant le périoste, dont la description appartient à ces généralités, soit parce que, revêtant tout le système osseux, on ne peut point le considérer isolément; soit parce que, comme je l'ai dit, il est le centre d'où naissent et où se rendent tous les organes du système fibreux, en sorte que ses fonctions sont relatives plus encore à ce système qu'à celui des os.

§ III. *Du Périoste.* 1°. *De sa forme.*

Cette membrane entoure tous les os. Dure, résistante, grisâtre, elle leur forme une enveloppe qui se prolonge partout, excepté là où les cartilages les revêtent. Son épaisseur est remarquable

dans l'enfance ; plus mince à proportion dans l'adulte, elle devient plus dense et plus serrée.

Les anciens se la figuraient comme se prolongeant d'un os à l'autre sur l'articulation, et formant ainsi un sac continu pour tout le squelette. Cette idée est inexacte. A la jonction des os le périoste s'entrelace avec les ligamens, qui lui servent de moyen de communication, et ce n'est qu'ainsi qu'on peut concevoir sa continuité. La couronne des dents en est dépourvue, ainsi que toutes les productions osseuses qui s'élèvent sur la tête de certains animaux.

Le périoste est faiblement uni à l'os dans l'enfance ; on l'en sépare alors avec une extrême facilité, surtout sur la partie moyenne des os longs. Dans l'adulte, comme la substance calcaire encroûte peu à peu ses fibres les plus internes, l'adhérence devient très-sensible : elle est extrême dans le vieillard, où cette membrane se trouve réduite souvent à une lame très-mince, par les progrès de l'ossification. La pression habituelle exercée par les muscles, dans leurs contractions, peut bien aussi influer un peu sur cette adhérence. Divers prolongemens passent du périoste à l'os : ils sont beaucoup plus nombreux aux extrémités des os longs et sur les os courts, que sur le milieu des os longs et sur les os larges ; ce qui se conçoit facilement, d'après le nombre beaucoup plus considérable de trous dans l'une que dans l'autre partie. Ces prolongemens accompagnent les vaisseaux, tapissent les conduits qui percent l'os de part en part, se perdent dans ceux qui se terminent dans sa sub-

stance, ne pénètrent point dans la cavité médullaire et, bornés uniquement au tissu osseux, établissen des rapports immédiats entre lui et la membran dont ils émanent.

Ce sont ces rapports qui, étant anéantis lorsqu le périoste est malade ou détruit dans une partie u peu considérable de son étendue, font que l'o meurt et se sépare au-dessous. Il y a cependan cette différence entre ce phénomène et la mort de l'o par la lésion de la membrane médullaire, que, s celle-ci est désorganisée, tout l'os se nécrose, tandi que, lorsqu'on irrite et qu'on déchire le périoste à la partie moyenne d'un os long, dans une étendu à peu près correspondante à celle de cette mem brane médullaire, les lames externes seules du tissu compacte se détachent par l'exfoliation, e c'est le même os qui reste. J'ai fait cette expérienc sur deux chiens. Quant à celle qui consiste à enlever le périoste, non-seulement de dessus la partie moyenne, mais de dessus toute la surface de l'os, je ne sais si quelqu'un a pu la tenter, elle m'a paru impossible; elle serait praticable, que bientôt l'animal mourrait à cause de l'étendue du délabrement, et qu'ainsi on n'aurait aucun résultat.

Les rapports du périoste avec les organes voisins varient singulièrement. Dans le plus grand nombre des os, ce sont des muscles qui glissent sur lui; le tissu cellulaire l'unit à eux plus ou moins lâchement, suivant que les mouvemens sont plus ou moins considérables. A la suite des inflammations, il perd cette laxité, et souvent tout mouvement cesse.

2°. *Organisation du Périoste.*

La direction des fibres du périoste est à peu près nalogue à celle des os, sur les os longs spécialenent, ainsi que sur les os courts ; mais il n'a point a structure rayonnée des os plats qu'il recouvre. Les fibres, superposées les unes aux autres, ont des ongueurs différentes : les superficielles sont plus tendues; celles qui correspondent immédiatement l'os ne parcourent qu'un petit espace. Toutes en général deviennent très-apparentes dans certaines naladies des os. Je me rappelle, entre autres exemples de ce développement accidentel des fibres, 'observation d'un homme affecté d'éléphantiasis, t en même temps d'un gonflement dans le tissu compacte du tibia, qui avait pris une épaisseur renarquable : le périoste de cet os était très-épais, i peu adhérent à l'os que le plus léger effort suffit pour l'enlever dans toute son étendue, et à fibres ellement prononcées qu'on l'aurait pris pour une portion de l'aponévrose plantaire ou palmaire, lorsqu'il en fut séparé.

Le périoste emprunte ses vaisseaux de ceux des environs. Leurs branches innombrables s'y ramifient à l'infini, y forment un réseau que les injections rendent extrêmement sensible, surtout chez es enfans, s'y perdent ensuite, ou pénètrent dans e tissu compacte de l'os, ou bien reviennent dans es parties voisines former diverses anastomoses.

Cette membrane reçoit, comme nous l'avons dit, l'insertion de presque tout le système fibreux, des

tendons, des ligamens et des aponévroses spéciale ment. Cette insertion paraît étrangère à l'os dan l'enfant; en détachant à cet âge le périoste, tou s'enlève en même temps : mais l'ossification enva hissant bientôt les lames les plus internes, tous le organes fibreux paraissent identifiés à l'os dans l'a dulte. J'observe que cette disposition coïncide ave la force prodigieuse de traction que les muscles devenus plus prononcés, exercent souvent à cet âge et qui, uniquement répartie sur le périoste, comm elle l'aurait été sans son ossification, n'aurait p y trouver une résistance suffisante, au lieu que s'opérant aussi sur l'os, elle le meut sans dange pour son enveloppe. L'organisation générale, le propriétés, la vie du périoste, sont les même que celles du système fibreux : je ne m'en occu perai pas.

3°. *Développement du Périoste.*

Dans le fœtus, cette membrane est molle, spon gieuse, pénétrée de beaucoup de fluide gélatineux elle se fond dans l'eau avec facilité; ses fibres son peu distinctes ; elles le deviennent à mesure qu'o avance en âge, et en même temps la mollesse dimi nue, et la résistance augmente. Le périoste, dans l vieillard, est d'une extrême tenacité ; il résist presque autant que les ligamens à l'ébullition ceux qui préparent des squelettes le savent très bien. Il se fend en divers endroits, parce que se fibres en se raccourcissant se détachent de l'os; mai ce qui reste adhérent ne devient qu'avec beaucou de difficulté gélatineux.

4°. *Fonctions du Périoste.*

Le périoste garantit les os qu'il revêt de l'impression des parties mobiles qui l'entourent, de celle des muscles, des artères, dont le battement aurait pu les user, comme il arrive dans certaines tumeurs anévrysmales voisines du sternum, des vertèbres, etc.

Il est une espèce de parenchyme de nutrition de réserve, si je puis m'exprimer ainsi, toujours prêt à recevoir le phosphate calcaire, lorsqu'il ne peut se porter sur l'os devenu malade : de là les nécroses naturelles et artificielles, qui n'ont jamais lieu dans les dents, faute de cette membrane. Ces petits os ont des caries, des altérations diverses, et non de véritables nécroses.

On ne peut douter que les lames internes du périoste ne s'ossifient successivement, et ne contribuent ainsi un peu à augmenter l'os en épaisseur, lorsqu'une fois son accroissement en longueur est fini. J'observe à ce sujet que non-seulement lui, mais encore tout le système fibreux, a une affinité singulière avec le phosphate calcaire. Après le système cartilagineux, c'est celui qui a le plus de tendance à s'en encroûter; sans doute parce que son mode de vitalité générale, de sensibilité organique en particulier, a beaucoup d'analogie avec celle des os. Là où les tendons en glissant sur les os y éprouvent un grand frottement, ils deviennent osseux. La dure-mère, l'albuginée, s'ossifient assez souvent; la sclérotique sert de parenchyme à beaucoup de substance terreuse, dans les oiseaux, qui par là l'ont extrêmement dure.

Le périoste est étranger à la formation des os (1); il n'est qu'accessoire à celle du cal; il est une espèce de limite qui circonscrit dans ses bornes naturelles les progrès de l'ossification, et l'empêche de se livrer à d'irrégulières aberrations. Prépare-t-il le sang qui sert à nourrir l'os? On ne peut résoudre cette question par aucune expérience; mais on peut assurer que les propriétés vitales dont il jouit ne le rendent nullement propre à accélérer la circulation du sang arrivant aux os, comme quelques auteurs l'ont cru.

Au reste, il me semble qu'on a trop envisagé le périoste exclusivement par rapport aux os : sans doute il est nécessaire à ces organes, mais peut-être joue-t-il, par rapport aux organes fibreux, un rôle encore plus important. Si la nature l'a partout placé sur le système osseux, c'est peut-être en grande partie, comme je l'ai dit, parce qu'il trouve sur ce système un appui général, solide, résistant, et qui le met à même de ne point céder aux trac-

---

(1) Le périoste joue au contraire un rôle fort important dans la formation des os. Partie essentiellement vasculaire de ces organes, c'est lui qui, dans les premiers temps, sécrète la matière cartilagineuse qui, par son organisation de plus en plus patente, et de plus en plus élevée, finit par subir la transformation osseuse proprement dite; c'est encore lui qui, lorsque cette importante révolution première a été accomplie, continue à fournir les matériaux de cette couche mince de cartilage par laquelle il est séparé de l'os chez l'enfant, et qui, continuellement envahie par les progrès de l'ossification, est aussi continuellement reproduite, jusqu'à ce que l'accroissement en épaisseur de ces organes ait atteint les limites naturelles. (F. Blandin.)

ions diverses que tout le système fibreux exerce sur ui, tractions qui sont elles-mêmes communiquées à e dernier système. C'est là un nouveau point de ue sous lequel il faut envisager le périoste, et qui rêtera bien plus à des considérations générales, ue celui sous lequel Duhamel, Fougeroux, etc., nt considéré cette membrane.

§ IV. *Périchondre.*

On trouve sur tous les cartilages non-articulaires me membrane exactement analogue au périoste, t qu'on nomme *périchondre.* Le larynx, les cô- es, etc., l'offrent d'une manière très-sensible : il st mince, à fibres entrecroisées en tous sens, noins strictement uni aux organes qu'il recouvre que le périoste ne l'est aux os, parce que, les car- ilages ayant à leur surface des trous moins nom- breux, il n'y envoie pas une aussi grande quantité le prolongemens fibreux : de là un rapport moins ntime entre la vie du périchondre et celle du car- ilage, qu'entre celle de l'os et de son périoste.

J'ai dénudé deux fois sur un jeune chien le thy- roïde de sa membrane externe, et refermé tout de suite la plaie, qui a été guérie sans altération appa- rente dans l'organisation du cartilage : au moins a-t-il continué à remplir ses fonctions. La même expérience serait facile sur les cartilages des côtes : je ne l'ai point tentée. Le périchondre m'a paru, dans plusieurs injections, contenir beaucoup moins de vaisseaux sanguins que le périoste : ses usages

sont analogues à ceux de cette dernière membrane.

ARTICLE VI.

DES CAPSULES FIBREUSES.

Les capsules fibreuses sont infiniment plus rares dans l'économie qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Les articulations scapulo-humérale et ilio-fémorale en sont presque exclusivement pourvues : ailleurs il n'y a guère que des membranes synoviales.

§ Ier. *Formes des capsules fibreuses.*

Ces capsules forment une espèce de sac cylindrique ouvert par ses deux extrémités, attaché par la circonférence de ses ouvertures autour des surfaces articulaires, supérieure et inférieure, entrelacées dans cette insertion avec le périoste. Elles sont d'autant plus lâches que l'articulation exerce des mouvemens plus étendus ; celle de l'humérus, par exemple, permet un écartement bien plus considérable des surfaces osseuses articulaires que celle du fémur. En effet, leur longueur est presque la même : or, comme, d'une part, le col du premier os est bien moindre que celui du second, et que, de l'autre part, toutes deux s'implantent au bas de ce col, il en résulte que l'étendue de l'écartement des deux articulations est en raison inverse de la longueur des cols articulaires.

Beaucoup de tissu cellulaire entoure en dehors

ces capsules, que des fibres tendineuses, des tendons même provenant des muscles voisins, fortifient singulièrement. Elles s'ouvrent quelquefois pour laisser passer ces tendons, qui se fixent à l'os entre elles et la synoviale, comme on en voit un exemple à l'articulation scapulo-humérale pour le sous-scapulaire. Les anatomistes qui ont remarqué l'insertion des tendons aux capsules en ont conclu que les muscles de ces tendons étaient destinés à empêcher que la capsule ne fût pincée par les surfaces articulaires en mouvement : cela me paraît peu probable; mais au moins les muscles sont-ils destinés à empêcher la laxité de la capsule pendant les grands mouvemens, qui auraient été affaiblis par cette laxité : aussi y a-t-il plusieurs de ces sortes de muscles à la capsule humérale, tandis qu'on n'en voit point à la fémorale, qui est beaucoup moins lâche, comme je l'ai dit. En dedans, les capsules sont très-intimement unies à la synoviale, surtout dans les adultes, car dans les enfans cette adhérence est moindre. Le voisinage de leur extrémité manque cependant de ce rapport, parce que, la synoviale se réfléchissant sur le cartilage, un espace triangulaire reste entre elle et la capsule qui va s'attacher à l'os, et, comme cette disposition règne tout autour de l'articulation, il en résulte une espèce de canal circulaire, rempli de tissu cellulaire, parsemé de vaisseaux, et que j'ai quelquefois distendu avec une injection poussée par une petite ouverture faite à dessein.

L'union intime de la capsule avec la synoviale empêche les replis de celle-ci, et par là même sa

contusion, dans les grands mouvemens articulaires.

§ II. *Fonctions des Capsules fibreuses.*

Pourquoi les capsules fibreuses ne se trouvent-elles qu'autour du premier genre d'articulation? la raison en est simple : comme ces articulations exercent en tous sens des mouvemens à peu près égaux, elles devaient trouver de tous côtés une égale résistance; tandis que les autres ne se mouvant qu'en deux ou trois sens seulement, les ligamens n'étaient nécessaires qu'en certains endroits, pour borner ces mouvemens. Voilà pourquoi, par exemple, le système fibreux est disséminé en membrane autour de l'articulation ilio-fémorale, et rassemblé en faisceaux isolés autour de la fémoro-tibiale, où la synoviale est presque partout à nu.

On conçoit, d'après tout ce qui vient d'être dit, que l'usage unique des capsules fibreuses est d'affermir les rapports articulaires, et que cet usage est absolument étranger à l'exhalation synoviale.

Quand, dans les luxations non réduites, la tête de l'os a abandonné la cavité articulaire, une membrane nouvelle se forme autour d'elle dans le tissu cellulaire, et lui sert comme de capsule; mais cette membrane n'a nullement la texture de l'ancienne. J'ai observé, sur deux sujets, qu'on n'y distinguait aucune fibre, que son tissu était absolument analogue à celui de ces kystes divers que l'on trouve souvent en plusieurs endroits de l'économie, de ceux surtout qui se forment autour

les corps étrangers dont la présence n'est pas une cause de suppuration, et que, par conséquent, ces capsules contre nature appartiennent plutôt à la classe des membranes séreuses qu'à celle des membranes fibreuses.

ARTICLE VII.

DES GAINES FIBREUSES.

Les gaînes fibreuses sont, comme nous l'avons dit, partielles ou générales.

§ Ier. *Gaînes fibreuses partielles.*

Les gaînes partielles, destinées à un seul tendon, sont de deux sortes : les unes parcourent un trajet assez long, telles sont celles des fléchisseurs du pied et de la main, qui correspondent à toute la surface concave des phalanges ; les autres ne forment que des espèces d'anneaux où se réfléchit un tendon, comme on en voit un exemple au grand oblique de l'œil.

Toutes, en général, parcourent un demi-cercle, et font un demi-canal que l'os complète d'autre part; en sorte que le tendon glisse dans un canal moitié osseux, moitié fibreux. Ce canal est tapissé d'une membrane synoviale, dont l'adhérence avec la gaîne fibreuse est égale à celle de la synoviale articulaire avec sa capsule. Par leur surface externe, les gaînes fibreuses correspondent aux organes voisins, auxquels les unit un tissu cellulaire lâche.

Toutes ces gaînes sont d'un tissu très-dense, très-serré : elles sont plus fortes, proportionnellement à l'effort que les tendons peuvent exercer sur elles, que les capsules fibreuses ne le sont par rapport aux impulsions diverses que les os peuvent leur communiquer, et qui tendent à rompre ces capsules. Elles se confondent avec le périoste par leurs deux bords. Celles des fléchisseurs s'unissent aussi par leurs extrémité avec l'épanouissement des tendons : de là l'entrecroisement fibreux très-considérable qui se remarque à l'extrémité des dernières phalanges.

Aux membres, il n'y a de ces sortes de gaînes que pour les fléchisseurs : les tendons extenseurs en sont dépourvus. Cela tient d'abord à ce qu'il y a deux tendons de la première espèce à chaque doigt, tandis qu'on n'en voit qu'un seul de la seconde, que conséquemment plus de force est nécessaire pour les retenir dans le premier sens. En second lieu, chaque tendon extenseur reçoit sur ses côtés l'insertion des petits tendons des interosseux et des lombricaux, qui, le tirant en sens opposé dans les grands mouvemens, le retiennent à sa place, et suppléent ainsi aux gaînes fibreuses qui manquent. Enfin les efforts des extenseurs sont bien moindres que ceux des fléchisseurs, dont ils ne sont, pour ainsi dire, que des espèces de modérateurs.

§ II. *Gaînes fibreuses générales.*

Les gaînes générales se voient surtout au poignet et au coude-pied, où elles portent le nom de *ligamens annulaires.* Elles sont destinées à brider plusieurs tendons réunis. Comme, dans ces deux endroits, tous ceux de la main ou du pied passent en un espace assez étroit, il fallait qu'ils fussent fortement maintenus. D'ailleurs, ces sortes de gaînes servent aussi quelquefois à changer leur direction, comme on le voit dans ceux qui vont se rendre au pouce, soit à sa face palmaire, soit à sa face dorsale, et qui font manifestement un angle à l'endroit de leur passage sous la gaîne. Les tendons du petit doigt offrent aussi une disposition analogue.

Ces sortes de gaînes présentent deux grandes modifications : dans les unes, comme à la partie antérieure du poignet, tous les tendons se trouvent contigus, séparés seulement par une espèce de membrane lâche qui se trouve placée entre eux ; dans les autres, comme à la partie postérieure du poïgnet, sous la gaîne générale, se trouvent de petites cloisons fibreuses qui isolent les tendons les uns des autres. En général, la résistance de ces gaînes est extrêmement considérable.

ARTICLE VIII.

DES APONÉVROSES.

Nous avons distingué deux classes d'aponévroses celles à enveloppe et celles à insertion.

§ Ier. *Des Aponévroses à enveloppe.*

Les aponévroses à enveloppe sont générales ou partielles.

I. *Aponévroses à enveloppe générale.*

1°. *Situation et Formes.*

Elles se trouvent autour des membres, dont elles assujettissent les muscles. Le bras, l'avant-bras et la main, la cuisse, la jambe et le pied, en sont pourvus.

Elles sont, par leur conformation, analogues à la forme du membre, qu'elles déterminent en partie, et surtout qu'elles maintiennent, en prévenant le déplacement des parties subjacentes, déplacement qui aurait lieu sans cesse, à cause de la laxité de l'organe cutané. Leur épaisseur varie. En général, plus les muscles qu'elles recouvrent sont nombreux, plus cette épaisseur est grande : voilà pourquoi l'aponévrose du fascia-lata l'emporte sous ce rapport sur la brachiale; pourquoi l'anti-brachiale est plus épaisse en devant qu'en arrière

pourquoi la plantaire et la palmaire sont si prononcées, tandis que quelques fibres se trouvent à peine sur la région dorsale du pied et de la main. Il y a cependant quelques exceptions à cette règle : par exemple, l'enveloppe aponévrotique de la partie postérieure de la jambe n'est point proportionnée à la force des jumeaux et du soléaire ; aussi ces muscles sont-ils plus que tous les autres exposés à des déplacemens souvent très-douloureux qui forment la crampe, et qu'il faut bien distinguer des douleurs ou de l'engourdissement qui résultent de la compression d'un des nerfs des membres inférieurs, comme du sciatique, du plantaire externe, compression produite par une fausse position ou par toute autre cause analogue, etc.

En dehors, les aponévroses d'enveloppe générale sont contiguës aux tégumens. Un tissu extrêmement lâche les unit à eux ; en sorte que ceux-ci peuvent facilement glisser dessus dans les pressions extérieures. Immobiles entre ces mouvemens et ceux des muscles, elles les isolent entièrement ; en sorte que la peau et les muscles qui lui correspondent n'ont, sous ce rapport, aucune influence l'un sur l'autre.

En dedans, ces aponévroses sont, en général, lâchement jointes aux muscles par du tissu cellulaire. D'espace en espace, elles envoient entre les diverses couches musculaires des prolongemens nombreux, qui vont ensuite s'attacher à l'os, et qui, en même temps qu'elles fournissent des points d'attache, assurent la solidité de l'enveloppe du membre.

2°. *Muscles tenseurs.*

Les aponévroses à enveloppe générale ont presque toutes un ou deux muscles particuliers, qui s'y insèrent en tout ou en partie, et qui sont destinés à leur imprimer un degré de tension ou de relâchement proportionné à l'état du membre. Cette disposition est remarquable dans l'insertion, 1° des grands dorsal et pectoral à la brachiale ; 2° du biceps à l'anti-brachiale; 3° du grêle de l'avant-bras à la palmaire ; 4° du grand fessier, du fascia-lata à l'aponévrose de ce nom ; 5° des demi-tendineux, demi-membraneux et biceps à la tibiale, etc.

Comme dans les grands mouvemens des membres, où tous les muscles sont le plus disposés à se déplacer, ceux-ci sont nécessairement en action, ils distendent fortement l'aponévrose, qui par là réfléchit le mouvement qui lui est communiqué, et surtout résiste à tout déplacement. Le membre est-il en repos, les muscles tenseurs cessent leur contraction, et l'aponévrose se relâche. Je remarque que les muscles qui vont s'attacher aux capsules fibreuses, comme à celle de l'humérus, par exemple, remplissent vraiment, à leur égard, les fonctions des muscles tenseurs à l'égard de leurs aponévroses respectives.

La couleur de ces dernières est d'un blanc resplendissant ; sous ce rapport elles diffèrent de tous les organes fibreux examinés jusqu'ici, et sont analogues aux tendons, dont elles diffèrent cependant un peu par leur nature : en effet, elles sont moins

promptes à céder à la macération et à l'ébullition; leurs fibres sont plus raides, plus résistantes. Il n'y a d'aponévroses exactement identiques aux tendons que celles qui sont essentiellement formées par leur épanouissement ou qui sont situées à leur origine, comme celles répandues sur le droit antérieur de la cuisse, celles qui se cachent dans les fibres charnues d'un muscle, et qui en sortent ensuite pour devenir un tendon. En certains endroits des membres, comme au haut du bras, par exemple, les aponévroses d'enveloppe générale se perdent insensiblement dans le tissu cellulaire, sans qu'on puisse tirer de ligne de démarcation. Cette disposition est presque exclusive au système fibreux : au moins je n'en connais aucun qui entrelace et perde ainsi ses fibres dans le tissu cellulaire : elle est d'autant plus remarquable, que la nature des deux tissus est essentiellement différente; ils ne donnent point les mêmes produits, n'ont point le même ordre organique.

Les fibres des aponévroses générales ne sont guère entrelacées qu'en deux ou trois sens : cet entrelacement y est presque toujours assez sensible à l'œil nu. Mais j'ai remarqué qu'en plongeant une aponévrose dans l'eau bouillante, et en l'y laissant quelque temps, ses fibres, dans le racornissement qu'elles éprouvent alors, deviennent encore beaucoup plus sensibles. Cette observation est, au reste, applicable à tout le système fibreux, à ces organes surtout dont la texture peu apparente semble au premier coup d'œil être homogène. De cette manière, on distingue aussi très-bien les fibres de la membrane dure-mère.

3°. *Fonctions.*

La compression habituelle exercée sur les membres par leurs aponévroses, outre les usages indiqués, a celui d'y favoriser la circulation des fluides rouges ou blancs. Aussi les varices, très-rares dans les veines profondes qui accompagnent les artères, sont-elles extrêmement communes dans les superficielles placées hors de l'influence de cette compression que l'art imite dans l'application des bandages serrés, dont l'effet est si avantageux dans une foule de maladies externes nées du défaut de ton, du relâchement des parties. J'ai constamment observé que les infiltrations séreuses commencent toujours par le tissu cellulaire sous-cutané, que ce n'est que dans une période avancée de l'hydropisie qu'on trouve infiltré celui qui est au-dessous des aponévroses, et qu'en général il ne contient à proportion jamais autant de sérosité que l'autre. Dans la plupart des grandes distensions des membres hydropiques, quand on a enlevé la peau, et que l'eau subjacente s'est écoulée, le membre enveloppé de son aponévrose n'est guère plus gros que dans l'état ordinaire. Les muscles non revêtus de ces sortes d'enveloppes, comme ceux situés sur les côtés de l'abdomen, par exemple, s'infiltrent avec bien plus de facilité.

II. *Aponévroses à enveloppe partielle.*

Ces aponévroses se rencontrent sur des parties isolées, au-devant de l'abdomen, sur la tête, au

dos, etc.; elles sont ordinairement destinées à retenir en place un certain nombre de muscles qu'elles n'entourent point de tous côtés, comme les précédentes, mais auxquels elles répondent seulement dans un sens. Leur épaisseur est beaucoup moindre que celle des précédentes; elle est analogue aux efforts qu'elles doivent supporter.

Toutes ont un muscle tenseur, qui proportionne leur degré de relâchement ou de tension à l'effort des muscles voisins. Le droit antérieur, au moyen de ses intersections, et le pyramidal, remplissent cet usage à l'égard de l'aponévrose abdominale; les petits dentelés postérieurs à l'égard de celle qui recouvre les muscles des gouttières vertébrales; les auriculaires, les frontaux et les occipitaux à l'égard de l'épicrânienne, etc.

Les aponévroses d'enveloppe dont l'usage est uniquement borné à un muscle, comme celle, par exemple, du temporal, manquent de muscle tenseur, et sont par conséquent toujours au même degré de tension : c'est sans doute pour cela qu'elles ont un tissu très-serré, très-épais, comme celle que je viens de citer en offre un exemple.

En général, l'usage de toutes les aponévroses d'enveloppe, soit générale, soit particulière, relatif à la compression des muscles, est nécessité par les déplacemens dont ils seraient susceptibles en se contractant, déplacemens manifestes, 1° lorsqu'on place la main sur un muscle en action, et qui est dépourvu d'aponévrose, comme le masseter; 2° lorsque, une plaie ayant intéressé une partie un peu considérable d'une aponévrose d'enveloppe, les muscles subja-

cens deviennent accidentellement contigus aux tégumens ; 3° lorsque, dans un animal, on met à découvert les muscles d'un membre, qu'on ne laisse pour les assujettir que le tissu cellulaire, et que dans cet état on excite leur contraction. 4°. Dans certaines plaies des muscles arrivées à l'instant de leur contraction, il est difficile de sonder ces plaies, parce que, dans leur relâchement, les muscles prenant une position différente, les rapports changent entre les parties qui formaient les deux bords de la plaie, etc.

§ II. *Des Aponévroses d'insertion.*

Nous avons distribué en trois espèces les aponévroses d'insertion : 1° les aponévroses d'insertion à surface large, 2° celles d'insertion en arcade, 3° celles d'insertion à fibres isolées.

1°. *Aponévroses d'insertion à surface large.*

Elles sont très-nombreuses. Tantôt elles résultent de l'épanouissement d'un tendon, comme on le voit dans celles du droit antérieur de la cuisse ; tantôt, comme au masseter, elles tirent immédiatement leur origine des os. Quelquefois c'est d'un seul côté que se fait l'insertion ; d'autres fois c'est des deux en même temps, et alors elles représentent des espèces de cloisons placées entre des faisceaux charnus, qu'elles servent en même temps à séparer et à unir, comme on l'observe dans le paquet de muscles qui naît de chacun des condyles de l'humérus.

Toujours ces aponévroses reçoivent dans une direction très-oblique l'insertion des fibres charnues. Leur adhérence mutuelle est intime : j'en parlerai en traitant des tendons.

Elles ont le grand avantage de multiplier prodigieusement les points d'insertion sans nécessiter de grandes surfaces osseuses. La largeur de toute la fosse temporale ne suffirait pas pour le masseter, s'il s'implantait par des fibres isolées : au moyen des cloisons aponévrotiques qui reçoivent ses fibres et vont ensuite se fixer à l'os, son insertion est concentrée sur un des bords de l'arcade zygomatique. Aussi, en général, tous les muscles très-forts, dont les fibres sont très-multipliées par conséquent, sont-ils entrecoupés par de semblables aponévroses, comme le deltoïde, les ptérygoïdiens, etc., en sont la preuve.

Presque toutes ces aponévroses sont exactement identiques aux tendons ; plusieurs se continuent avec eux, et alors leurs fibres restent dans la même direction. En général, c'est un caractère de ces aponévroses, de n'avoir point leurs fibres entrelacées en divers sens comme celles des aponévroses d'enveloppe. La raison en est simple : les fibres charnues auxquelles elles donnent attache étant toutes à peu près dans un sens, ou du moins ne s'entrecroisant pas, il faut qu'elles se comportent comme elles, puisqu'elles leur sont continues.

J'ai fait une expérience qui montre bien manifestement l'identité des tendons avec ces aponévroses. Elle consiste à faire macérer pendant quelques jours un tendon : il devient souple alors ; ses fibres s'écar-

tent ; en le distendant suivant son épaisseur, on en fait une espèce de membrane qu'il serait impossible de distinguer d'une vraie aponévrose.

2°. *Aponévroses d'insertion en arcade.*

Elles sont beaucoup plus rares que les précédentes. Lorsqu'un gros vaisseau passe sous un muscle, la nature emploie ce moyen pour ne pas interrompre l'insertion des fibres charnues : le diaphragme pour l'aorte, le soléaire pour la tibiale, en offrent des exemples. L'insertion se fait sur la convexité, et le passage du vaisseau sous la concavité de l'arcade, dont les deux extrémités sont fixées à l'os. On a cru long-temps que les artères pouvaient être comprimées sous ces arcades; et de là l'explication des anévrysmes poplités, de l'apoplexie par le reflux vers la tête du sang gêné dans l'aorte, etc. Mais il est bien évident qu'en se contractant, les fibres charnues doivent élargir le passage, loin de le rétrécir, puisque l'effet nécessaire de ces contractions est d'agrandir en tous sens la courbure aponévrotique, effet qui serait tout opposé si leur insertion se faisait à la concavité. Ces sortes d'aponévroses sont fortement entrelacées, et résistent beaucoup.

3°. *Aponévroses d'insertion à fibres isolées.*

Elles sont l'assemblage d'une infinité de petits corps fibreux tous distincts les uns des autres, qui semblent se détacher du périoste comme les fils du velours sortent de leur trame commune. Chacune

e continue avec une fibre charnue ; en sorte que, orsque, par la macération, on a enlevé toutes les bres, ces petits corps deviennent flottans et se oient parfaitement bien, surtout quand le périoste u'on a détaché est plongé dans l'eau.

On conçoit que ce mode d'insertion de la part es muscles exige toujours de larges surfaces oseuses, puisque chaque fibre a sa place propre : on n voit un exemple dans la partie supérieure de l'iaque, du jambier antérieur, du temporal, etc. Si ous les muscles s'inséraient de cette manière, dix ois plus de surface dans le squelette ne suffirait pas our les recevoir.

ARTICLE IX.

DES TENDONS.

Les tendons sont des espèces de cordes fibreuses, ntermédiaires aux muscles et aux os, transmetant aux seconds le mouvement des premiers, et ouant dans cette fonction un rôle absolument assif.

§ Ier. *Situation et Formes des tendons.*

Communément situés aux extrémités du faisceau harnu, ils en occupent cependant quelquefois le nilieu, comme on le voit au digastrique; presque oujours c'est à l'extrémité la plus mobile qu'ils se rencontrent, celle qui sert d'appui ayant des aponévroses pour insertion, comme on le voit spéciale-

ment à l'avant-bras et à la jambe, dont tous le muscles, implantés en haut sur de larges surface osseuses ou aponévrotiques, se terminent en ba par un tendon plus ou moins grêle. De cette dispo sition résultent, 1° peu d'épaisseur à l'extrémit des membres, et par conséquent la facilité de leur mouvemens; 2° beaucoup de résistance aux pres sions extérieures très-fréquentes en cet endroit, l tissu fibreux étant, comme nous l'avons dit, extrê mement résistant; 3° la concentration de tout l'ef fort d'un muscle souvent très-épais sur une surfac osseuse très-étroite, et par là même l'étendue, l force des mouvemens de l'os, etc.

Les formes tendineuses sont ordinairement ar rondies, sans doute parce que ce sont celles où, sou le moins de volume, entre le plus de matière. Quel quefois cependant, comme aux tendons des ex senseurs de la jambe ou de l'avant-bras, elles son aplaties.

Parfois bifurqués ou divisés en plusieurs prolon gemens secondaires, les tendons s'implantent au os, ou bien reçoivent les fibres charnues en deu ou plusieurs points différens. Tous sont recouvert d'un tissu lâche, qui leur permet de glisser facile ment les uns sur les autres ou sur les parties voi sinés. Quelquefois ce tissu manque, et alors des cap sules synoviales les entourent pour favoriser leur mouvemens. Leur extrémité où se fixent les fibre charnues reçoit ces fibres différemment: quelque fois c'est d'un seul côté qu'elles s'y rendent, de l les muscles demi-penniformes; d'autres fois c'es des deux côtés en même temps, ce qui constitue le

enniformes. Souvent le tendon, enfoncé dans leur paisseur, ne peut être mis à découvert que par eur section longitudinale.

L'adhérence est extrême entre la fibre charnue t la tendineuse : cependant, en les faisant longemps macérer, en les soumettant à l'ébullition, lles s'isolent peu à peu l'une de l'autre. J'ai remarqué que, dans les jeunes sujets, l'union était beaucoup moins intime : aussi en raclant à cet âge le endon avec un scalpel, on en enlève le muscle, ans qu'ensuite il y paraisse : le poli est presque le même là où s'implantaient les fibres que là où elles manquent naturellement. L'extrémité du tendon fixée à l'os s'entrelace avec le périoste en s'y épanouissant ordinairement ; en sorte que c'est avec cette membrane, et non avec l'os lui-même, que le tendon fait corps, parce qu'en effet ce n'est qu'à elle qu'il est identique par sa nature : aussi, s'il trouve une membrane analogue, il s'y fixe également, comme on le voit dans l'insertion des muscles droits et obliques à la sclérotique, des ischio et bulbo-caverneux à la membrane du corps caverneux, etc. En général, jamais les tendons ne s'unissent qu'aux membranes fibreuses : les séreuses, les muqueuses, tout organe, en un mot, étranger au système fibreux leur est hétérogène.

§ II. *Organisation des Tendons.*

Le tissu fibreux est extrêmement serré dans les tendons : plusieurs paraissent homogènes au premier coup d'œil ; mais, en les examinant avec

soin, on y distingue bientôt des fibres que réuni un tissu cellulaire serré et en général très-pe abondant. L'ébullition rend très-sensibles ces f bres: lorsqu'on plonge tout à coup le tendon dan l'eau bouillante à l'endroit où il a été coupé trans versalement, elles prennent un peu plus d'épais seur à cette extrémité divisée, se renflent pou ainsi dire, et deviennent ainsi très-apparentes. A l'endroit où elles s'épanouissent pour former un aponévrose ou s'unir au périoste, ces fibres s montrent distinctement sans nulle préparation D'un autre côté, comme on peut toujours, ains que je l'ai dit, réduire artificiellement en apo névrose un tendon macéré, et que, dans cet éta de macération, mou et lâche, il se prête à toute les formes qu'on veut lui donner, c'est encore un excellent moyen de bien distinguer les fibres tendineuses. Dans cette expérience très-simple à répéter, je n'ai jamais vu la forme en spirale des cylindres tendineux, dont quelques auteurs modernes ont parlé: ces fibres sont dans le tendon comme à l'endroit où tous s'en écartent pour former une aponévrose, c'est-à-dire en ligne droite.

Le sang n'aborde presque point dans le système vasculaire des tendons; mais dans certaines inflammations, ils en sont tout pénétrés. J'ai vu un de ceux des extenseurs, mis à découvert, dans un panaris, par un chirurgien de campagne, tellement rouge qu'il avait l'apparence d'un phlegmon. Cependant je remarquai que cette couleur n'était point, comme dans plusieurs autres organes enflammés, dépendante de beaucoup de pe-

tes stries rougeâtres, indices des exhalans remplis de sang ; mais qu'elle était uniforme, comme, par exemple, un corps teint en rouge. En général, il paraît que, de tout le système fibreux, ce sont les tendons qui ont le mode de vitalité le moins énergique et les forces vitales les plus obscures. En les disséquant sur un animal vivant, j'ai trouvé qu'ils avaient exactement la même disposition que sur le cadavre : les sucs blancs qui les pénètrent ne coulent point sous le scalpel ; ils sont secs, s'enlèvent par couches. Ils ne paraissent avoir à eux qu'une température très-faible ; car, en général, le degré de chaleur d'un organe est proportionné à la quantité de vaisseaux sanguins qu'il reçoit.

Si, dans le corps, ils sont à la température générale, ce ne peut être que parce que les organes voisins leur communiquent la leur : il ne se dégage pas de calorique dans leur tissu.

Les tendons ont une affinité remarquable avec la gélatine, et même avec le phosphate calcaire : là où ils glissent sur un os, et où ils souffrent un grand frottement, ils présentent un endurcissement que les auteurs attribuent à la pression, en le comparant à l'endurcissement calleux de la plante des pieds, mais qui est dû évidemment à une exhalation dans le tissu tendineux des deux substances précédentes, exhalation que détermine le mouvement, et d'où naît une ossification véritable.

C'est ainsi, comme nous l'avons dit, que se forment les différens os sésamoïdes, et la rotule en particulier, os dont le tissu diffère manifestement de celui des autres, parce qu'au milieu de la gélatine et du

phosphate calcaire qui le pénètrent, il lui reste un partie de tissu fibreux qui n'est point envahie par ce substances, et qui est assez considérable pour qu son mode de vitalité et d'organisation tienne autan et plus de celui du système fibreux que de celui d système osseux.

Au reste, si on détache la rotule ou un os sésa moïde quelconque, en y laissant une portion tend neuse de chaque côté, et qu'on l'expose à l'actio d'un acide, cette substance calcaire est enlevée, le fibres de l'os restent à nu, et on voit qu'elles son une continuation de celles du tendon, qui est alor ramolli.

Les muscles de la vie organique, la plupart d ceux qui, dans la vie animale, forment des sphinc ters, sont dépourvus de tendons: ce tissu blanc ces cordes argentées qu'on trouve dans le cœur n'ont nullement la nature des tendons des mem bres.

ARTICLE X.

DES LIGAMENS.

Nous avons distingué les ligamens en ceux à fais ceaux réguliers, et ceux à faisceaux irréguliers.

§ Ier. *Ligamens à faisceaux réguliers.*

Ils se rencontrent, en général, dans presque toutes les articulations mobiles, sur les côtés spécialement: de là le nom de *ligamens latéraux* sous lequel la plupart sont désignés. Quelques-uns cependant sont étrangers aux articulations, comme

n en voit un exemple dans celui tendu entre les ›ophyses coracoïde et acromion, et dans ceux qui ›mplètent les diverses échancrures osseuses, l'or-ltaire, par exemple.

Ces organes forment des faisceaux tantôt ar-›ndis, tantôt aplatis, fixés ou plutôt entrelacés n périoste par leurs deux extrémités, faciles à en-ver avec lui dans l'enfance, tenant à l'os dans l'a-ılte par l'ossification des lames internes de cette ıembrane.

Leur analogie avec les tendons est très-marquée : l différence extérieure est qu'ils tiennent au pé-oste des deux côtés, tandis que d'un côté les ten-›ns se continuent aux muscles. On voit quelquefois même organe être tendon à un âge, et ligament un autre : cette disposition est remarquable dans ligament inférieur de la rotule. Cependant il y a, ›mme nous l'avons remarqué, des différences de ›mposition entre les uns et les autres.

Tous résultent d'un assemblage de fibres paral-les au milieu, divergentes aux extrémités, unies ır un tissu cellulaire plus lâche que celui des ten-›ns, et qui souvent contient quelques flocons ·aisseux. Cette substance s'y porte quelquefois si ›ondamment qu'ils prennent un aspect analogue celui des muscles graisseux : j'ai fait cette obser-ıtion aux ligamens du genou d'un sujet d'ailleurs ès-maigre.

Il y a quelques vaisseaux sanguins dans les li-amens. Dans certaines maladies des articulations, ·ur système vasculaire se développe d'une ma-ière très-remarquable, et ils sont pénétrés d'une

grande quantité de sang : aucun nerf n'y est se sible.

Quelquefois le tissu ligamenteux se transforn en une matière lardacée où toute espèce de f bres disparaît, qui revient rarement à son ét primitif, et qui se rencontre presque toujou dans des affections organiques mortelles.

Les ligamens unissent fortement les surfac osseuses, empêchent leur déplacement, et cepe dant permettent de faciles mouvemens; doub fonction qu'ils remplissent en vertu d'une doub propriété, de leur résistance d'une part, de le mollesse et de leur flexibilité d'autre part : quelqu fois, en dehors, ils servent à quelques insertio musculaires.

§ II. *Des Ligamens à faisceaux irréguliers.*

Ce sont des fibres irrégulières, parsemées et là sur les surfaces osseuses, sans aucun ordr entrecroisées en divers sens entre le sacrum et l' iliaque, sur le sommet de l'acromion, etc. C voit plusieurs de ces fibres qui se trouvent au çà et là, autour de plusieurs articulations m biles; beaucoup de tissu cellulaire les sépa Elles ne peuvent offrir aucune considération g nérale.

En général, le système fibreux n'est point au régulièrement organisé dans les ligamens qu l'est dans les tendons, que le système musculai l'est dans les muscles, etc. Dans les ligame même à faisceaux réguliers, on voit souvent d

bres se porter en différentes directions, s'écar-
er du faisceau principal, sans aucun ordre bien
istinct (1).

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME FIBREUX.

§ Ier. *Altérations dans les formes extérieures.*

Les ligamens et les tendons sont épaissis, ramollis dans les tu-
ıeurs blanches ; ils deviennent alors fragiles, pour ainsi dire, et
èdent aux moindres efforts dirigés contre eux. Le tissu cellu-
ıire qui les entoure est souvent confondu avec eux et avec celui
es parties voisines, ce qui leur ôte leur mobilité, et rend en
artie raison de la fixité de leur situation et de la gêne des mou-
emens qui accompagne presque toujours ces maladies. Dans
'autres cas, comme dans certaines contractures, les mouve-
ıens sont empêchés par la rigidité qu'acquièrent les tendons,
par la difficulté avec laquelle ils se laissent étendre. Les liga-
ıens offrent une rigidité semblable dans les fausses ankyloses.

§ II. *Altérations dans l'organisation.*

L'inflammation des parties fibreuses est peu connue : celle du
érioste est la plus commune; elle joue un très-grand rôle dans
eaucoup de maladies des os. J'ai vu divers tendons être le siége
'engorgemens lents, qui quelquefois avait été manifestement la
uite d'une inflammation aiguë, telle que celle que produit une
iqûre, par exemple. J'ai eu moi-même une affection de ce
enre, qu'avait déterminée une piqûre à la main : une tumeur
e forma dans le tendon extenseur d'un doigt et subsista fort
ong-temps.

C'est particulièrement dans les ruptures du tendon d'Achille
u'on a eu occasion d'observer le mode de réunion des organes
ibreux divisés. Une matière coagulable, albumineuse ou fibri-

neuse, s'épanche dans cette circonstance, acquiert une densit de plus en plus grande, et finit par unir solidement les deu bouts; molle et extensible dans le principe, cette substance es susceptible de s'allonger à cette époque, comme cela arrive e effet lorsque le membre se meut trop tôt. La rupture des liga mens a presque constamment lieu dans les luxations; mais on n' pas décrit ce qui arrive après la réduction de ces dernières.

L'ossification est peu fréquente dans le tissu fibreux. Raremen l'espèce d'endurcissement qu'éprouve ce tissu chez le vieillar va-t-il jusqu'à y produire cette transformation; elle ne survien guère que dans les tendons, aux endroits de leurs frottemens et dans les ligamens, à leur extrémité attachée aux os. Il n'e est pas de même chez certains animaux : chez les gallinacés, pa exemple, les tendons des muscles des pieds sont constammen osseux à une certaine époque.

Le périoste est quelquefois affecté de cancer, comme on l voit dans ce que les uns appellent *fongus* ou *fongus médullair du périoste*, les autres, *tumeur ossivore*, *tumeur lymphatiqu du périoste*, etc. D'autres organes fibreux, comme la dure mère, présentent des tumeurs analogues. La périostose diffère d ces tumeurs, en ce qu'elle est le résultat d'une exsudation qu se fait au-dessous du périoste détaché de l'os : la matière de cett exsudation devient quelquefois de plus en plus consistante; nou avons vu qu'elle peut devenir osseuse.

§ III. *Altérations dans le développement.*

Certains vices de conformation sont accompagnés d'un relâch ment extrême des ligamens qui unissent les os, comme les pieds bots en fournissent un exemple : ce relâchement n'est, dans c cas, qu'une circonstance secondaire qui dérive de la faiblesse d certains muscles.

Le tissu fibreux se produit dans plusieurs circonstances 1°. Sans parler de sa reproduction quand il est lui-même divisé les cicatrices de divers organes sont essentiellement fibreuses c'est ce que nous avons déjà vu dans quelques circonstance

pour les os, et ce que nous verrons par la suite pour les muscles, pour la peau. 2°. Le tissu cellulaire, la membrane rétine, la substance du testicule, la glande thyroïde, se transforment parfois en tissu fibreux. 3°. Des productions fibreuses diverses se développent au milieu des organes. Elles affectent la forme de membranes, comme dans les kystes, ou de faisceaux, comme dans les ligamens des fausses articulations; ou bien ce sont des masses qu'on désigne sous le nom de *corps fibreux*. Ces corps se rencontrent particulièrement dans l'utérus : Bichat en fait mention (page 242). Ils occupent différens points de l'épaisseur de cet organe. Leur nombre varie ; souvent on en trouve plusieurs. D'abord très-petits, ils augmentent progressivement de volume, et prennent en certains cas un accroissement considérable. Leurs fibres forment des couches à peu près concentriques, et paraissent comme pelotonnées : elles reçoivent des vaisseaux plus ou moins apparens. Ces corps passent souvent à l'état fibro-cartilagineux; mais cet état ne leur est pas propre, comme on l'a dit. L'ossification peut même s'en emparer : ils ressemblent alors à des pierres ou à des concrétions. Quelquefois ils se détachent entièrement, et tombent soit dans la cavité du péritoine, soit dans celle de l'utérus; ils constituent, dans le second cas, les prétendus calculs de la matrice, dont on trouve plusieurs exemples dans un mémoire de Louis inséré parmi ceux de l'Académie de Chirurgie. Les corps fibreux de l'utérus sont connus depuis fort long-temps : Chambon leur avait donné le nom de *sclérôme*. Mais c'est surtout à Bichat, dont les idées sur ce point ont été publiées par M. Roux, et à Bayle, qu'on en doit une description plus exacte. Des corps fibreux analogues ont été trouvés dans d'autres parties, comme au cou, dans l'épaisseur des doigts. Il n'est pas rare de rencontrer autour du vagin, entre la vessie et ce conduit, entre celui-ci et le rectum, ou dans ses parois mêmes, des tumeurs fibreuses, qui, à la vérité, diffèrent un peu des précédentes. Elles n'ont pas l'aspect pelotonné de ces dernières : leur tissu, mou et flexible, a quelque ressemblance avec celui des polypes ordinaires. Mais elles ne naissent pas comme ceux-ci; leur adhérence est faible avec tous les tissus voisins, en sorte que leur extirpation n'offre aucune

difficulté. M. Pelletan cite des exemples de cette affection : M. Dubois l'a observée un grand nombre de fois ; j'ai vu moi-même plusieurs de ces tumeurs. Leur structure mériterait d'être approfondie. Elles sont importantes à connaître dans la pratique, parce qu'on pourrait, si l'on n'y faisait attention, commettre quelque méprise à leur sujet. (BÉCLARD.)

SYSTÈME

FIBRO-CARTILAGINEUX.

Le système fibro-cartilagineux se compose de divers organes que les anatomistes ont placés tantôt parmi les cartilages, et tantôt parmi les ligamens, parce qu'en effet ils participent de la nature des uns et des autres. J'en fais un système moyen aux deux précédens, dont l'intelligence facilitera celle de celui-ci.

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES DU SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

On peut distribuer en trois classes les organes fibro-cartilagineux.

La première comprend ceux qui occupent les oreilles, les ailes du nez, la trachée-artère, les paupières, etc. Ils sont très-minces, comme membraneux, tantôt disposés en un plan uniforme, tantôt recourbés sur eux-mêmes en différens sens. Comme leur position ni leurs fonctions n'ont rien de commun, nous n'en emprunterons point leur

dénomination ; nous la tirerons de leurs formes : on peut désigner ces substances sous le nom de *fibro-cartilages membraneux* (1). Au reste, c'est non-seulement par sa forme, mais encore par sa nature, que cette classe diffère des autres, comme nous le verrons.

Dans la seconde classe se rangent les substances inter-articulaires, qui occupent l'intervalle des articulations mobiles ; soit que, libres en partie dans la cavité, comme celle du genou, de la mâchoire inférieure, etc., elles se portent en différens sens, suivant les mouvemens; soit que, comme celle du corps des vertèbres, elles se fixent d'une manière solide, quoique mobile, sur les surfaces osseuses. Ces organes sont, en général, plus épais que les pré-

---

(1) Sous le nom de *cartilages membraneux*, Bichat désigne ici des corps qui ont tout-à-fait les caractères des cartilages, et qui présentent de spécial ces deux caractères seulement : 1° leur aplatissement très-grand, 2° l'épaisseur remarquable de leur périchondre. C'est cette dernière disposition surtout qui a abusé les anatomistes, et leur a fait croire à une forme fibro-cartilagineuse, dans des parties qui ne présentent point, en réalité, un mélange intime de tissu cartilagineux et de substance fibreuse. Au reste, Meckel, depuis long-temps, et plus récemment Béclard, avaient déjà, à cet égard, rectifié les idées émises par Bichat. Les prétendues lames fibro-cartilagineuses dont il est ici question, sont principalement les corps élastiques qui forment l'oricule, l'aile du nez, l'épiglotte, la trachée, les bronches et le bord libre des paupières ; enfin, c'est encore dans la même classe que vient se ranger cette production que j'ai découverte dans le centre de la langue, et à laquelle j'ai donné le nom de *cartilage lingual*.

(F. Blandin.)

cédens, singulièrement variables dans leur forme, représentant communément des espèces de lames, quelquefois percés à leur milieu dans les cavités articulaires, disposés en faisceaux très-épais, et figurés comme le corps des vertèbres à la colonne vertébrale. On peut les désigner sous le nom de *fibro-cartilages articulaires.*

Je rapporte à la troisième classe certaines portions du périoste où cette membrane change entièrement de nature, se pénètre de gélatine, et offre un aspect d'abord analogue à celui des cartilages, mais où il est facile cependant de distinguer le tissu fibreux. Ces portions se trouvent dans les gaînes tendineuses, où elles facilitent le glissement des tendons, et garantissent les os de leur impression. On peut les nommer *fibro-cartilages des gaînes tendineuses.*

Ces trois classes de fibro-cartilages, quoique très-analogues, n'ont exactement ni la même structure, ni les mêmes propriétés vitales, ni la même vie; en sorte que le système qu'elles forment n'est point aussi homogène dans ses diverses divisions, que les systèmes osseux, musculaire animal, etc., etc. (1).

---

(1) Si, d'après les considérations précédentes, nous rejetons la première classe de fibro-cartilages, il restera les fibro-cartilages articulaires et ceux des gaînes des tendons, qui présentent encore en effet de grandes différences. Ces différences paraissent avoir leur source principalement dans les proportions diverses qu'affectent les tissus fibreux et cartilagineux dans ce système; d'où résulte une ressemblance plus ou moins parfaite avec l'un ou l'autre de ces tissus, une structure fibreuse, une résistance,

une flexibilité plus ou moins marquées, ou, au contraire, une élasticité, une homogénéité plus ou moins grandes. Voici, au reste, le tableau qu'on peut faire du système fibro-cartilagineux, en joignant aux formes indiquées par Bichat celle des anneaux de cette nature dans lesquels glissent l'extrémité supérieure du radius et le tendon du muscle grand oblique de l'œil, et celle des bourrelets également fibro-cartilagineux qui augmentent la profondeur de certaines cavités articulaires.

FIBRO-CARTILAGES

- ARTICULAIRES.
  Ils sont en rapport avec les surfaces articulaires des os, et remplissent à leur égard divers usages. Ceux des articulations diarthrodiales sont embrassés par la synoviale de ces articulations. Ils peuvent être divisés en
  - LIBRES : exemple, celui de la mâchoire inférieure.
  - ADHÉRENS. Ceux-ci le sont :
    - Par leurs extrémités, comme celui de la clavicule, de l'extrémité inférieure du cubitus, ceux du genou, etc.
    - Par une de leurs surfaces, comme les bourrelets qui s'attachent au bord des cavités glénoïde et cotyloïde.
    - Par leurs deux surfaces; telles sont les substances inter-vertébrales, celles du pubis, du sacrum, etc.
- DE GLISSEMENT.
  Leur nom indique leur usage; presque tous répondent à des tendons. Ils sont :
  - APLATIS : ceux des gaînes tendineuses ou de revêtement.
  - CIRCULAIRES : la poulie du grand oblique de l'œil, le ligament annulaire du radius : celui-ci sert en outre à affermir l'articulation de cet os.

(BÉCLARD.)

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

§ Ier. *Tissu propre à l'organisation du Système fibro-cartilagineux.*

Le tissu propre à l'organisation du système fibro-cartilagineux est composé, comme son nom l'indique, d'une substance fibreuse, plus, d'un véritable cartilage.

La substance fibreuse est comme la base de l'organe. On distingue cette base d'une manière très-manifeste dans les fibro-cartilages des coulisses tendineuses et des articulations, dans ceux surtout du corps des vertèbres : elle est bien moins apparente dans les fibro-cartilages membraneux. Elle se trouve tantôt entrelacée, tantôt parallèlement disposée. En général, sa nature est absolument la même que dans le système fibreux, dure, résistante, dense et serrée : de là la force très-grande qu'ont en partage les différens organes de ce système ; de là, 1° la solidité avec laquelle les vertèbres sont maintenues entre elles ; 2° la difficulté de rompre, de déchirer les fibro-cartilages du genou, de la mâchoire, de la clavicule, etc. ; 3° la résistance qu'oppose celui du cubitus aux luxations nférieures de cet os, luxations qui, dans les pronations forcées, ont beaucoup de tendance à se faire, et qui ne sauraient avoir lieu sans la rupture de

ce fibro-cartilage. J'ai vu un exemple d'un déplacement semblable non réduit : le fibro-cartilage avait entièrement disparu. 4°. En ployant les véritables cartilages, ils se cassent à peu près comme une rave; ces organes, au contraire, se ploient en tout sens, résistent aux agens qui les distendent. 5°. On voit des hommes imprudens soulever des enfans par les pavillons des oreilles, dont les fibro-cartilages supportent avec facilité le poids de tout le corps : je suis persuadé que ceux du nez pourraient remplir les mêmes fonctions. 6°. On sait que dans les anévrysmes de l'aorte pectorale ou ventrale, les corps mêmes des vertèbres sont beaucoup plus tôt usés, résistent moins par conséquent que les substances qui les unissent.

La portion cartilagineuse paraît être comme interposée dans les fibres, dont elle remplit les intervalles. Elle est très-manifeste surtout dans les fibro-cartilages articulaires et dans ceux des coulisses : c'est d'elle qu'ils empruntent la couleur blanchâtre qui les caractérise, l'apparence inorganique que leur section offre en plusieurs endroits, l'élasticité qu'ils ont spécialement en partage. Soumis à l'ébullition, les fibro-cartilages articulaires comme ceux des coulisses tendineuses, deviennent jaunâtres, transparens, se fondent en gélatine quoiqu'avec plus de peine que les vrais cartilages.

Quant aux fibro-cartilages membraneux de l'oreille, du nez, de la trachée-artère, de l'épiglotte, des paupières, leur composition paraît être très-différente. L'action de l'eau bouillante ne les réduit point à l'état gélatineux, au moins d'un

nanière sensible ; ils restent blanchâtres, se ramollissent peu, présentent un aspect tout différent de celui d'un organe fibreux ou des autres organes fibro-cartilagineux bouillis, qui se liquéfient après être devenus jaunâtres et demi-transparens. L'inspection des oreilles des animaux qu'on sert sur nos tables le prouve manifestement : je l'ai fréquemment constaté dans mes expériences. Je connais peu de tissus, dans l'économie, qui ressemblent à celui-là. Quand il a bouilli un peu longtemps, l'espèce de périoste qui l'entoure s'en détache ; lui-même se rompt, éclate en plusieurs endroits : les anneaux de la trachée-artère nous offrent surtout un exemple de ce dernier phénomène.

Exposé quelques jours à la macération, ce tissu, de blanc qu'il était, devient d'un rouge très-apparent. Cette couleur est plus foncée que celle qu'acquièrent dans l'eau les cartilages d'ossification : tient-elle aux mêmes causes ? Je l'ignore.

Lorsqu'on fait macérer les fibro-cartilages intervertébraux, leurs lames fibreuses prennent aussi cette teinte rougeâtre, que je n'ai point vue se manifester dans les autres fibro-cartilages articulaires, notamment dans ceux du genou.

La dessiccation rend durs et cassans les fibro-cartilages membraneux ; ils ne prennent point non plus alors la couleur jaunâtre des tendons et des aponévroses desséchés : ils ont un aspect particulier.

Soumises à cette expérience, les substances intervertébrales prennent une transparence remarqua-

ble, différente aussi de celle du système fibreux sans teinte jaunâtre. Dans les premiers jours de leu macération, ces substances, lorsqu'elles ont ét détachées entièrement des vertèbres, se gonflent s'élèvent en formant une espèce de cône creux don le sommet est représenté par le milieu, qui se bour soufle surtout, et la base par la circonférence, qu reste à peu près dans l'état naturel.

La plupart des fibro-cartilages manquent en gé néral de périchondre : cela est manifeste dans ceu des coulisses tendineuses, où l'os d'un côté, la mem brane synoviale de l'autre, revêtent l'organe, dan ceux des articulations que cette membrane entour des deux côtés, dans ceux des vertèbres, auxquel correspondent seulement les ligamens vertébrau antérieurs et postérieurs. Quant aux fibro-carti lages membraneux, il y a sur eux un tissu fibreux extrêmement distinct; il est épais, intimement ad hérent au tissu propre de l'organe, facile à être bien vu par la macération, qui le blanchit d'une manière très-sensible, et qui par là le différencie totalement du tissu fibro-cartilagineux qui est au milieu. En fendant un fibro-cartilage de l'oreille, du nez, celui de l'épiglotte, etc., après qu'ils ont séjourné dans l'eau, ce fait devient très-évident, surtout pendant l'époque où ils ont la rougeur que j'ai indiquée.

Le système fibro-cartilagineux paraît avoir à peu près les mêmes rapports avec les sucs digestifs que les systèmes fibreux et cartilagineux, de la nature desquels il participe; il est difficilement altéré par ces sucs dans l'état de crudité. La

coction, en le ramollissant, donne plus de prise à eur action : il devient alors plus digestible. En général, il donne un aliment moins propre à la nutrition que celui fourni par beaucoup d'autres systèmes.

§ II. *Parties communes à l'organisation du Système fibro-cartilagineux.*

Les organes communs des fibro-cartilages sont assez peu prononcés ; le tissu cellulaire y est en petite proportion, et s'y trouve tellement serré qu'à peine peut-on le distinguer : la macération le rend cependant apparent.

Peu de sang pénètre leur système vasculaire dans l'état ordinaire : je m'en suis assuré en disséquant un animal tué exprès par l'asphyxie, maladie où le sang, s'accumulant dans les capillaires intermédiaires aux artères et aux veines, vers la tête surtout, rend ces capillaires extrêmement apparens ; mais dans l'inflammation, qui du reste est rare dans les fibro-cartilages, ils sont extrêmement injectés. On n'y suit point de nerfs.

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

§ Ier. *Propriétés physiques.*

L'élasticité appartient essentiellement à ce système. Cette propriété est très-manifeste, 1° dans les

fibro-cartilages des oreilles, lorsqu'on les ploie su eux-mêmes; 2° dans ceux du nez, lorsqu'on les tor en divers sens; 3° dans ceux de la trachée-artère lorsqu'on vient à les comprimer, ou qu'après le avoir coupés longitudinalement, on écarte les bord de la division, comme on le pratique dans la tra chéotomie, dont le but est l'extraction d'un corp étranger. Elle remplit un usage important dans l'es pèce de vibration qui se fait dans les premiers lor de la perception des sons, dans les seconds lors d la production de la voix. 4°. C'est en vertu de leu élasticité que les fibro-cartilages articulaires serven comme d'espèces de coussins qui favorisent, en s comprimant et en revenant ensuite sur eux-mêmes le mouvement des surfaces osseuses auxquelles il correspondent; 5° que ceux des vertèbres en par ticulier, affaissés pendant le jour, réagissent duran le repos, et rendent ainsi la stature du matin supé rieure de quelques degrés à celle du soir. 6°. Enfin dans le glissement des tendons sur leurs fibro-car tilages, l'élasticité de ces derniers favorise le mou vement d'une manière manifeste.

Cette élasticité des fibro-cartilages est réunie e eux à une souplesse remarquable; ils se ploien dans tous les sens sans se rompre. Par la premièr propriété, ils tiennent surtout au système cartila gineux; par celle-ci ils se rapprochent du systèm fibreux. Il n'est pas étonnant qu'étant intermédiaire à ces deux systèmes par leur texture, ils le soien aussi par leurs propriétés.

§ II. *Propriétés de tissu.*

L'extensibilité est assez souvent mise en jeu dans e système fibro-cartilagineux. J'ai vu un polype ui avait tellement dilaté les ouvertures antérieures, t par conséquent les fibro-cartilages des narines, ue leur diamètre était au moins triple en étendue. 'extrémité externe et cartilagineuse du conduit uditif présente souvent, par la même cause, ne distension analogue. Dans les torsions diverses le la colonne vertébrale, la portion des fibro-artilages correspondant à la convexité des cour-ures s'allonge bien manifestement; tandis que la ortion opposée se déprime, etc. Cette extensibilité st soumise, au reste, dans beaucoup de cas, à la même loi que dans le système fibreux, c'est-à-dire u'elle ne peut être mise en activité que d'une nanière lente et insensible.

La contractilité de tissu s'observe lorsque, dans es cas dont je viens de parler, la cause de disten-ion disparaît. Ainsi, après l'extraction du polype ité, la narine reprit peu à peu son diamètre natu-el. J'ai enlevé, sur un chien, un tendon de sa cou-isse, en le coupant à une extrémité, et en le tirant ar l'autre, de manière à laisser intacte et vide la aîne qui le contenait : cette gaîne et le fibro-car-ilage sont peu à peu revenus sur eux-mêmes, et la avité a disparu. Dans le carcinôme de l'œil, où l'on 'enlève pas les paupières, les tarses, qui s'étaient rès-allongés avec ces voiles mobiles, reviennent

peu à peu sur eux-mêmes, et reprennent leurs di mensions, après l'extirpation de la tumeur qui le distendait. Au reste, il faut bien distinguer ces phé nomènes de ceux qui sont le produit de l'élasticité ces derniers sont prompts, subits : fortement dis tendu, le fibro-cartilage de l'oreille cède un peu, e revient tout à coup sur lui-même; les autres, au contraire, sont caractérisés le plus souvent par un lenteur remarquable.

§ III. *Propriétés vitales.*

Toutes les propriétés vitales sont très-peu carac térisées dans les fibro-cartilages; point de sensibilit ni de contractilité animales dans l'état naturel la première se développe cependant par l'inflam mation. La sensibilité organique et la contractilit insensible ne s'y trouvent qu'au degré nécessaire à l nutrition. Jamais il n'y a de contractilité organiqu sensible.

Cette obscurité dans les propriétés vitales im prime une lenteur remarquable à tous les phéno mènes de la vie des organes qui nous occupent J'ai observé qu'en faisant aux oreilles d'un chie une section longitudinale, et en réunissant ensuit les bords de la plaie par un ou deux points d suture, la peau, au bout de peu de jours, es exactement recollée; mais ce n'est qu'au bout d'u temps bien plus long que la réunion du cartilag s'opère au-dessous, comme on peut le voir e examinant les parties après la réunion des téguments

e présume que la même chose arrivait dans l'o-
ération autrefois usitée de la trachéotomie, où
es parties molles, formant d'abord la cicatrice,
naintenaient en contact les demi-anneaux car-
lagineux, qui finissaient enfin pas s'agglutiner
ntre eux.

C'est encore à cette obscurité des propriétés vi-
les des fibro-cartilages, à leur peu d'énergie,
u'il faut rapporter sans doute aussi la rareté des
naladies de ces organes. Je connais peu de systèmes
rganiques dans l'économie animale qui soient
lus rarement affectés que celui des fibro-cartilages
lu nez, des oreilles, de la trachée-artère, etc.
a gangrène les attaque difficilement; ils ne sont
resque pas altérés par elle, tandis que les parties
nolles qui les entourent sont déjà toutes noires.
n connaît peu l'espèce de fluide qu'ils rendent
lans leur suppuration. La formation du pus pa-
aît même y être très-rare, vu leur peu d'activité
itale.

Comme ces organes ne sont presque jamais ma-
ades, on ne peut que difficilement connaître leurs
ympathies : je n'en puis citer aucun exemple.

ARTICLE IV.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

§ Ier. *État de ce Système dans le premier âge.*

Dans les premiers temps de l'existence, les fibro-cartilages articulaires sont assez développés, ce qui paraît être l'effet de la largeur des articulations à cette époque. En effet, comme les extrémités des os sont plus grosses à proportion, pendant qu'elles sont cartilagineuses, que lorsque l'état osseux les a envahies, les articulations sont aussi proportionnellement plus larges, et les organes qu'elles renferment plus marqués.

Les fibro-cartilages des coulisses, qui se trouvent presque tous, comme on sait, situés aux extrémités des os longs, ne sont point, dans le premier âge, distincts des cartilages d'ossification qui forment alors ces extrémités. Confondus avec eux, ils n'offent aucune ligne de démarcation lorsqu'on coupe l'os à leur niveau. Cet état subsiste jusqu'à l'entière ossification: alors les fibro-cartilages des coulisses restent isolés comme les cartilages des extrémités osseuses.

Chez l'enfant, la portion gélatineuse interposée paraît prédominer sur la portion fibreuse, dans les fibro-cartilages articulaires et dans ceux des coulisses. Cela est remarquable dans les substances inter-vertébrales, où cette espèce de mucilage qui

occupe le centre est en raison inverse de l'âge pour la quantité, et où les fibres se prononcent aussi toujours davantage. Au pubis, tout est presque homogène chez le fœtus; les fibres transversales ne deviennent bien apparentes que dans un âge plus avancé. Les articulations du genou, de la mâchoire, etc., nous présentent, dans leurs fibro-cartilages, la même disposition. L'ébullition en extrait alors une quantité beaucoup plus grande de gélatine; ils ont plus l'aspect lisse des cartilages.

Les fibro-cartilages membraneux se développent en général de bonne heure, ceux de l'oreille, des yeux et du nez spécialement. On les voit très-prononcés dans le fœtus. J'ai observé, sur deux acéphales, que, comme toutes les autres parties de la face, ils avaient un volume extrêmement remarquable, et bien supérieur à celui de l'état ordinaire. Au reste, tout le système fibro-cartilagineux est, dans le fœtus, extrêmement mou, souple, et peu résistant.

§ II. *État du Système fibro-cartilagineux dans les âges suivans.*

Ce système se fortifie à mesure qu'on avance en âge: dans le vieillard, il devient dur, difficile à céder, par la nature particulière que prennent ses substances nutritives. C'est à cette circonstance qu'il faut attribuer 1° la raideur et l'inflexibilité de la colonne vertébrale, dont les fibro-cartilages maintiennent toutes les pièces dans une espèce d'immobilité; 2° une partie des difficultés que le vieillard

éprouve à entendre les sons, la conque ne pouvant plus vibrer et les réfléchir aussi bien; 3° la moindre susceptibilité de ses narines pour se dilater, leurs fibro-cartilages cédant moins à l'effort musculaire, qui, du reste, est aussi moindre; 4° les difficultés du glissement des tendons, leurs coulisses étant beaucoup moins souples, etc.

Les fibro-cartilages ont, en général, beaucoup moins de tendance à s'ossifier chez le vieillard que les cartilages proprement dits. Les membraneux ne m'ont jamais offert ce phénomène; peut-être cela tient-il chez eux à cette texture particulière, et même à la différence des principes qui entrent dans leur composition, à la petite quantité de gélatine qu'on y trouve. Parmi les articulaires, il n'y a guère que ceux des vertèbres qui quelquefois se pénètrent de phosphate calcaire; ce qui est rare cependant. Ceux des coulisses sont comme les cartilages des articulations mobiles, ils gardent constamment leur nature : seulement, dans l'extrême vieillesse, leur épaisseur paraît un peu diminuer, par l'ossification de leurs lames qui correspondent à l'os; ce qui, du reste, est très-peu sensible (1).

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

§ I$_{er}$. *Altérations dans les formes extérieures.*

On trouve quelquefois, dans les maladies, les substances inter-vertébrales singulièrement gonflées, ramollies, gorgées de fluides; ce qui produit une plus grande mobilité et peu de so-

idité dans la colonne vertébrale. La symphyse du pubis éprouve plus manifestement encore cette altération dans la grossesse.

§ II. *Altérations dans l'organisation.*

Les affections organiques des fibro-cartilages sont peu connues. Cependant on y a vu des ulcérations; Palletta et M. Brodie ont décrit une variété du mal vertébral qui commence par l'érosion des fibro-cartilages inter-vertébraux (1).

On n'a pas observé la manière dont se réparent ces organes lorsqu'ils sont divisés. C'est ce qu'il serait facile de voir, par exemple, après l'opération de la symphyse.

Quant à l'ossification des fibro-cartilages, on peut établir ici, comme dans le système cartilagineux, une distinction fondée sur l'époque à laquelle cette ossification a lieu. Il y a en effet des fibro-cartilages temporaires qui servent de moules à des os, comme il y a des cartilages de ce nom : ceux-là s'ossifient régulièrement, et cette transformation n'est pour eux qu'une suite de leur développement naturel. Ces fibro-cartilages d'ossification se rencontrent là où des os se développent dans des tissus fibreux, comme on l'a vu, à l'article du système osseux, pour les os sésamoïdes : les points osseux des ligamens stylo-hyoïdiens et thyro-hyoïdiens se forment encore de cette manière. Au contraire, les fibro-cartilages permanens passent rarement à l'état osseux. Cela arrive quelquefois pour ceux des vertèbres, comme il a été dit (page 298) : encore souvent, dans ce cas, les couches extérieures sont-elles seules envahies. Au pubis, ce phénomène est extrêmement rare; il l'est un peu moins dans la symphyse sacro-iliaque, dans les articulations sacrées. Les organes fibro-cartilagineux semblent intermédiaires, sous ce rapport, aux tissus cartilagineux et fibreux, comme ils le sont sous beaucoup d'autres; ils s'ossifient moins souvent que les premiers, mais plus fréquemment que les seconds.

(1) Avant la publication du travail de Brodie, M. Marjolin, dans ses cours, avait signalé cette variété du mal de Pott, qui commence par l'inflammation et le ramollissement des substances inter-vertébrales. (F. Blandin.)

§ III. *Altérations dans le développement.*

Il se fait des fibro-cartilages accidentels, 1° dans le mode de guérison de certaines fractures mal maintenues; 2° dans les fausses articulations, à la suite desquelles le périoste prend souvent cette forme; 3° dans les ankyloses fausses, qui sont quelquefois produites par des brides de la même nature; 4° enfin, dans des kystes, dans des tumeurs composées de l'utérus, de la glande thyroïde, etc., et dans lesquelles on trouve souvent des parties fibreuses, d'autres fibro-cartilagineuses, etc. (Béclard.)

SYSTÈME MUSCULAIRE

DE LA VIE ANIMALE.

Le système musculaire général est bien manifestement divisé en deux grandes sections, différentes essentiellement l'une de l'autre par les forces vitales qui les animent, par leurs formes extérieures, par leur mode d'organisation, et surtout par les usages qu'ils remplissent, les uns dans la vie animale, les autres dans la vie organique. Nous ne les considérerons donc point ensemble. Commençons par l'examen des muscles de la vie animale.

Les muscles de la vie animale sont répandus en très-grand nombre dans le corps humain. Aucun système ne forme, par son ensemble, un volume plus considérable; aucun n'occupe plus de place dans l'économie. Outre les régions nombreuses que remplissent les muscles, ils forment un plan généralement répandu sous la peau, qui partage, pour ainsi dire, les fonctions de cet organe, protège comme lui les parties subjacentes, essuie impunément comme lui l'action des corps extérieurs, peut même être divisé dans une étendue plus ou moins considérable, sans que les fonctions générales de la vie en souffrent sensiblement; ce qui le rend très-

propre à défendre les organes plus profonds, dont la lésion serait funeste.

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Sous le rapport de leurs formes extérieures, les muscles peuvent se diviser, comme les os, en muscles longs, larges et courts. Leur disposition varie suivant ces trois formes générales.

§ Ier. *Formes des Muscles longs.*

Les muscles longs occupent en général les membres, à la conformation desquels la leur est accommodée. Séparés de la peau par les aponévroses, de l'os par le périoste, ils se trouvent comme dans une espèce de gouttière fibreuse qui les retient fortement, et où ils sont disposés par couches plus ou moins nombreuses, dont les profondes se trouvent assujetties dans leur place par les superficielles, qui, à leur tour, ont les aponévroses pour les maintenir. Ils sont très-longs dans celles-ci; communément ils y appartiennent aux mouvemens de trois ou quatre os, et même davantage, comme le couturier, les demi-tendineux et membraneux, le biceps, les fléchisseurs, les extenseurs, nous en offrent des exemples. A mesure qu'ils deviennent plus profonds, ils sont aussi plus courts et presque tou-

ours destinés seulement aux mouvemens de deux os, comme le brachial antérieur, les adducteurs, e pectiné, etc., en sont la preuve.

Des couches celluleuses les séparent; elles sont âches là où s'exercent de grands mouvemens, plus errées là où les mouvemens sont moindres, très-paisses là où ces vaisseaux et des nerfs glissent ntre les faisceaux musculaires. Souvent des espaces lus ou moins larges, remplis de tissu cellulaire, loignent ces faisceaux les uns des autres. On disingue les muscles longs en simples et en composés. Ils sont *simples* quand un seul faisceau entre lans leur formation, *composés* quand ils résultent le l'assemblage de plusieurs. Ces faisceaux se comportent alors de deux manières différentes: tantôt n effet c'est en haut du muscle qu'est la division, omme on le voit aux biceps brachial et fémoral; antôt c'est inférieurement, du côté le plus mobile, que cette divison se rencontre, comme aux muscles fléchisseurs et extenseurs de la jambe et de l'avant-bras.

Souvent isolés les uns des autres, les muscles ongs tiennent quelquefois ensemble par des aponévroses moyennes, qui confondent une portion lus ou moins considérable de deux, trois et même quatre de ces organes voisins. L'origine des muscles les tubérosités interne et externe de l'humérus résente cette disposition, d'où résulte un avantage ssentiel dans les mouvemens généraux du membre. Alors, en effet, la contraction de chaque muscle sert et à faire mouvoir en bas le point mobile auquel il s'attache, et à affermir en haut le point

fixe des muscles voisins qui se contractent en même temps que lui.

Tout muscle long est, en général, plus épais dans son milieu qu'à ses extrémités, forme qui tient au mode d'insertion des fibres charnues, lesquelles naissant en haut et se terminant en bas successivement les unes au-dessous des autres, sont d'autant moins nombreuses qu'on les examine plus près de chaque extrémité, tandis qu'au milieu elles se trouvent toutes juxtaposées. Le droit antérieur, le long supinateur, les radiaux externes, etc., présentent d'une manière manifeste cette conformation.

Il est une espèce particulière de muscles longs qui n'a aucune analogie, que l'apparence extérieure, avec celle des muscles des membres : ce sont ceux couchés en avant et surtout en arrière de l'épine. Quoique simples au premier coup d'œil ces muscles présentent autant de faisceaux distincts qu'il y a de vertèbres. Le transversaire épineux, le long du cou, le sacro-lombaire, etc., représentent bien un faisceau allongé comme le couturier, le droit antérieur de la cuisse, etc.; mais la structure de ce faisceau n'a rien de commun avec celle de ces muscles; c'est une suite de petits faisceaux, qui ont chacun leur origine et leur terminaison distinctes, et qui ne paraissent confondus en un seul muscle que parce qu'ils sont juxtaposés.

§ II. *Formes des Muscles larges.*

Les muscles larges occupent, en général, les parois des cavités de l'économie animale, celles de la

oitrine et du bas-ventre spécialement. Ils forment
n partie ces parois, et garantissent les organes in-
ernes, en même temps que par leurs mouvemens
s aident à leurs fonctions.

Leur épaisseur est très-peu marquée ; la plupart
eprésentent des espèces de membranes muscu-
euses, tantôt disposées par couches, comme à l'ab-
omen, tantôt appliquées sur des muscles longs,
omme dans le dos : ils sont, dans le premier cas,
'autant plus étendus qu'on les examine plus super-
ciellement.

Toutes les fois qu'un muscle large naît et se ter-
nine sur une des grandes cavités, il conserve par-
out à peu près sa largeur, parce qu'il trouve pour
es insertions de grandes surfaces. Mais si d'une ca-
ité il se porte à un os long, à une apophyse peu
tendue, alors ses fibres se rapprochent peu à peu ;
perd de sa largeur, augmente en épaisseur, et se
ermine par un angle auquel succède un tendon,
ui concentre en un espace très-petit des fibres lar-
ement disséminées du côté de la cavité. Les grands
orsal et pectoral nous présentent un exemple de
ette disposition, que l'on rencontre aussi dans l'i-
iaque, le moyen et le petit fessiers, etc. Les muscles
arges de la cavité pectorale ont une disposition par-
iculière que nécessitent les côtes : leur origine se
ait par des languettes fixées à ces os, et séparées
ar les intervalles qui se trouvent entre eux.

Les muscles larges sont le plus souvent simples ;
arement plusieurs se réunissent pour former des
nuscles composés. Diverses couches celluleuses les
éparent, comme les muscles longs ; mais ils ne

sont presque jamais comme eux recouverts par de aponévroses; le plus grand nombre est simplemen subjacent aux tégumens: la raison en est que leu forme les met naturellement à l'abri de ces dépla cemens dont nous avons parlé à l'article des aponé vroses, et qui, sans ces membranes, seraient s fréquens dans les muscles longs. Je ne sache pa qu'on ait jamais observé la crampe dans ceux qu nous occupent : lorsque les muscles abdominaux sont à découvert par des incisions faites aux tégumens d'un animal vivant, j'ai remarqué qu'en se contractant la masse de chacun conserve la même place.

§ III. *Formes des Muscles courts.*

Les muscles courts sont ceux dont les trois dimensions, à peu près égales, offrent une épaisseur proportionnée à leur largeur et à leur longueur. Ils se trouvent en général dans les endroits où il faut, d'un côté beaucoup de force, de l'autre peu d'étendue de mouvement : ainsi, autour de l'articulation temporo-maxillaire le masseter et les ptérygoïdiens ; autour de l'ischio-fémorale le carré, les jumeaux, les obturateurs même, etc.; autour de la scapulo-humérale les sus-épineux et petit rond; dans la main les muscles des éminences thénar et hypothénar, au pied divers faisceaux charnus, à la colonne vertébrale les inter-épineux, à la tête les petits et grands droits antérieurs, postérieurs et latéraux, présentent plus ou moins régulièrement la forme qui nous occupe, et rem-

lissent le double but que je viens d'indiquer, 'un côté par le nombre très-considérable, de l'au-'e par la brièveté de leurs fibres.

Les muscles courts sont unis les uns aux autres lus souvent que les larges, soit dans leur ori-ine, soit dans leur terminaison, comme on le oit au pied et à la main. Tantôt ils affectent la orme triangulaire, comme dans ces deux parties; ıntôt ils s'approchent de la forme cubique, comme masseter et les ptérygoïdiens nous en présentent n exemple. En général, ils sont rarement recou-erts par des aponévroses, sans doute parce que la rièveté de leurs fibres les rend peu susceptibles de rands déplacemens.

Au reste, la division des muscles en longs, en ırges et en courts, est, comme celle des os, su-ette à une infinité de modifications. En effet, plu-eurs de ces organes affectent des caractères mixtes: ınsi le sous-scapulaire, le sous-épineux, sont-ils ıtermédiaires à la forme large et à la forme courte; ınsi le crural, les jumeaux de la jambe, etc., ne euvent-ils précisément se rapporter ni aux muscles ongs, ni aux muscles larges. La nature varie, ıivant les fonctions des organes, la conformation es agens de leurs mouvemens; et sa marche ne nous ermet d'établir que des approximations dans nos ivisions anatomiques (1).

---

(1) Dans la considération extérieure des muscles, il ne faut pas nettre de noter avec le plus grand soin, 1° la masse qu'ils repré-ntent, parce que, ainsi qu'on le verra plus bas, elle est l'expression

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

La partie propre au muscle est ce qu'on nomme communément la *fibre musculaire;* les vaisseaux les nerfs, les exhalans et absorbans, le tissu cellulaire, qui est très-abondant autour de cette fibre, forment ses parties communes.

---

de la force absolue qu'ils peuvent déployer; 2° leur direction d'un point d'attache principal à l'autre : car lorsque les fibres sont droites et parallèles entre elles, la force du muscle est exprimée par la somme des forces de toutes les fibres; et s'exerce en outre parallèlement à la direction de ces fibres, tandis que, si les fibres sont obliques à l'axe du muscle, le résultat est différent; 3° leur disposition courbe ou non courbe, celle en anneau; 4° la figure géométrique ou autre, à laquelle on peut rapporter celle qui leur appartient; 5° leur position relativement au reste du corps, et leurs rapports de contiguité; 6° leur état de simplicité ou de complication : et, sous ce dernier point de vue, les muscles varient infiniment; les uns n'ont qu'un seul faisceau distinct à l'extérieur, *uniceps;* les autres en ont deux, *biceps;* ceux-ci en présentent trois, *triceps*; ceux-là en ont un plus grand nombre, *multiceps;* 7° l'arrangement relatif des fibres charnues et des fibres aponévrotiques : celles-ci occupent le plus souvent les extrémités d'insertion, mais quelquefois on les rencontre au centre du muscle, séparant cet organe en deux parties ou ventres (*muscles digastriques*); tantôt c'est un tendon, tantôt c'est une aponévrose, tantôt ce sont des fibres isolées, qui

§ Ier. *Tissu propre à l'organisation du Système musculaire de la vie animale.*

La fibre musculaire est rouge, mollasse, d'une grosseur uniforme dans les grands et dans les petits muscles, tantôt disposée en faisceaux très-apparens et isolés les uns des autres par des sillons remarquables, comme au grand fessier, au deltoïde, etc.; tantôt plus également juxtaposée, comme dans la plupart des muscles larges; toujours réunie à plusieurs autres fibres de même nature qu'elle, facile par cette réunion à être distinguée

---

servent aux insertions musculaires. Lorsque l'on trouve un tendon, il s'épanouit toujours en aponévrose du côté des fibres musculaires pour recevoir leurs insertions; et tantôt vous le trouverez ainsi disposé en dehors des fibres charnues, tantôt ce sera en dedans de leur faisceau, et ce seront elles enfin qui viendront le recouvrir et le dérober aux yeux. Lorsque l'épanouissement tendineux est extérieur, il peut être simple, et alors la membrane fibreuse peut recouvrir une des faces ou l'un des bords du muscle, ou même se placer entre deux faisceaux charnus, dont elle reçoit les insertions par deux côtés opposés. Enfin, cet épanouissement extérieur peut aussi être double : l'aponévrose se sépare en deux lames, qui tantôt renferment les fibres charnues comme dans une espèce de cornet, et qui tantôt leur présentent simplement une anse ou sinus de réception. 8°. Enfin, il faut noter les noms particuliers qui leur ont été appliqués pour les désigner, soit que l'on ait fait entrer plusieurs considérations dans la fixation de leur nomenclature, comme le faisaient des anatomistes encore peu éloignés de nous, soit que l'on ait déduit leurs noms des insertions propres à chacun d'eux, comme l'ont tenté avec quelques variations Dumas, Chaussier et le professeur Duméril. (F. Blandin.)

à l'œil nu, mais se dérobant même aux recherches microscopiques lorsqu'on veut l'examiner d'une manière isolée, tant est grande sa ténuité. Malgré cette ténuité extrême, on a fait dans le siècle passé une infinité de recherches pour déterminer avec précision le volume de cette fibre. On peut lire sur ce point le résultat des travaux de Leuwenoek, Muysk, etc. Je n'exposerai point ici ce résultat, parce que la science ne peut en tirer aucun parti, et qu'on ne saurait compter sur son exactitude. Que nous importe d'ailleurs le volume précis de la fibre musculaire? sa connaissance n'ajouterait rien aux notions physiologiques sur le mouvement des muscles.

Toute fibre musculaire parcourt son trajet sans se bifurquer ni se diviser en aucune manière, quoique plusieurs l'aient prétendu ; elle se trouve seulement juxtaposée à celle qui l'avoisine, et non entrelacée, comme il arrive souvent dans le système fibreux : disposition qui était nécessaire aux mouvemens isolés qu'elle exécute ; car la contraction générale d'un muscle est l'assemblage d'une foule de contractions partielles, toutes distinctes et indépendantes les unes des autres.

La longueur des fibres charnues varie singulièrement. Si l'on examine, en général, la masse qu'elles forment par leur ensemble, on voit que cette masse a tantôt plus d'étendue que la portion tendineuse du muscle, comme au biceps, au coraco-brachial, au droit interne de la cuisse; que tantôt elle lui est bien inférieure en longueur, comme aux plantaire et palmaire grêles, etc.,

:t que quelquefois elle est en proportion presque
'gale, comme aux radiaux externes, etc. Si, de
'examen de la masse charnue, on passe à celui des
ibres isolées qui la composent, on voit que la lon-
;ueur de la première est rarement la même que celle
les secondes. Il n'y a guère que le couturier et quel-
ques muscles analogues où les fibres parcourent
oute l'étendue de la masse charnue; dans presque
ous les autres, elles se trouvent obliquement dis-
posées entre deux aponévroses, ou entre un ten-
lon et une aponévrose; en sorte que, quoique
:hacune d'elles soit assez courte, leur ensemble
:st très-long, comme on le remarque au droit an-
érieur de la cuisse, au demi-membraneux, etc.
Cette disposition peut aussi résulter de diverses in-
ersections tendineuses qui coupent à différentes
listances la longueur des fibres. En général, les
auscles qui doivent leur longueur à de longues
ibres ont beaucoup d'étendue et très-peu de
orce de mouvement; tandis que ceux à fibres
ourtes, mais multipliées de manière à assurer beau-
oup de longueur à leur totalité, sont remarqua-
les par une disposition opposée. En voici la rai-
on : toutes les fibres étant également grosses,
quelle que soit leur longueur, elles ont le même
legré de force : donc, il est évident que cette force,
onsidérée dans un muscle en totalité, est me-
urée par le nombre de ses fibres. D'un autre côté,
lus une fibre est longue, plus elle se raccourcit
ans sa contraction : donc, en se contractant, un
auscle rapproche d'autant plus l'une de l'autre ses
leux attaches, que ses fibres sont plus longues.

Toutes les fibres des muscles volontaires son droites, celles des sphincters exceptées. Elles se trouvent ou parallèles, comme dans les rhomboïdes, ou obliquement situées les unes par rappor aux autres, comme dans le grand pectoral. Quelquefois, dans le même muscle, plusieurs plans se croisent suivant des directions différentes, comme le masseter en offre un exemple; mais cet entrecroisement est tout différent de celui des muscles involontaires, où il y a de plus entrelacement de fibres, tandis qu'ici on ne voit que des faisceaux à direction différente juxtaposés les uns aux autres.

Je ne parlerai point ici de la figure cylindrique selon les uns, globuleuse selon les autres, de la fibre charnue; l'inspection ne nous apprend rien sur ce point : comment donc a-t-on pu en faire un objet de recherches, et émettre une opinion qui ne peut avoir aucune base réelle? Disons-en autant de la nature intime de cette fibre, sur laquelle on a tant écrit. Elle nous est inconnue, et tout ce qu'on a dit sur sa continuité avec les extrémités vasculaires et nerveuses, sur la cavité dont on l'a prétendue creusée, sur la moelle qui, selon quelques-uns, la remplit, etc., n'est qu'un assemblage d'idées vagues que rien de positif ne confirme, et auquel un esprit méthodique ne saurait s'arrêter. Commençons à étudier la nature là où elle commence à tomber sous nos sens. Je compare les recherches anatomiques sur la structure intime des organes aux recherches physiologiques sur les causes premières des fonctions. Dans les unes et les autres, nous

sommes sans guides, sans données précises et exactes : pourquoi donc nous y livrer (1)?

Tout ce que nous pouvons savoir sur la nature de la fibre musculaire, c'est qu'elle est particulière, qu'elle n'est identique ni à celle des nerfs, ni à celle

---

(1) Malgré le peu d'utilité que semblent en effet avoir ces recherches, comme beaucoup de savans s'y livrent encore aujourd'hui, on ne sera pas fâché de trouver ici une courte analyse des travaux et des opinions dont la fibre musculaire a été l'objet.

Les uns la regardent comme divisible presque à l'infini : Muysk disait qu'il fallait diviser et subdiviser chaque faisceau huit fois de suite avant d'arriver à la dernière fibre musculaire. Les autres, à l'exemple de Prochaska, pensent que ce terme est beaucoup moins éloigné. On n'est pas non plus d'accord sur le volume que doit avoir cette fibre : il est inférieur, suivant la plupart, à celui des globules du sang. Sprengel, qui l'a mesurée au micromètre de Banks, lui attribue, au contraire, un diamètre beaucoup plus grand, qu'il porte à un quarantième de ligne dans les mammifères, à un vingtième chez les oiseaux et les poissons.

La fibre musculaire paraît inégale et comme ridée à sa surface, ce qui a été différemment expliqué. On a dit que ces inégalités étaient un simple effet de la contraction musculaire ; qu'elles dépendaient de la contractilité de tissu des parties celluleuses et vasculaires qui entourent la fibre ; que c'était une suite de nœuds et d'étranglemens, dont était composée celle-ci. Cette dernière opinion est la mieux fondée dans les insectes, qui présentent manifestement dans leurs fibres cette sorte d'apparence noueuse ; mais cela n'est pas, à beaucoup près, aussi évident chez l'homme. Meckel, qui a très-bien vu sur les premiers cette disposition, au microscope, n'a pu la reconnaître dans le second. La fibre musculaire lui a paru, chez l'homme, à peu près unie et de la même grosseur dans tous ses points : seulement on y distinguait constamment des globules ou points plus opaques, placés de dis-

des vaisseaux, ni à celle des tendons ou du tissu cellulaire; car où il y a identité de nature, il doit y avoir identité de propriétés vitales et de tissu. Or,

---

tance en distance, et séparés par un milieu plus transparent; ce qui est bien différent des nodosités. Home a également observé des globules dans la fibre musculaire. En prenant cette fibre privée de son tissu cellulaire par l'ébullition, comme on doit toujours le faire quand on veut l'étudier isolément, et en la faisant macérer, il l'a vue se réduire en corpuscules arrondis, parfaitement semblables aux globules du sang.

Divers observateurs ont examiné au microscope la coupe transversale d'un muscle. La surface de cette coupe représente assez exactement celle d'un terrain basaltique : les fibres sont serrées les unes contre les autres, aplaties, et prismatiques plutôt que cylindriques. On en prendra une très-bonne idée dans une figure qu'en a donnée Prochaska.

La fibre musculaire est-elle pleine ou creuse? C'est une question qui a beaucoup occupé les anatomistes, bien qu'il ne soit guère possible d'y répondre par l'inspection. Aussi n'a-t-on presque formé à cet égard que des suppositions. Cependant Lecat, Verheyen, Vieussens, se sont tous trois rencontrés sur ce point, et ont cru pouvoir conclure de leurs observations que chaque fibre d'un muscle était l'assemblage de vaisseaux d'un ordre particulier, continus aux artères et aux veines à l'endroit où ces deux ordres de vaisseaux se confondent, mais placés hors de la circulation de ces derniers. Ces vaisseaux, qu'on pourrait appeler *de dérivation*, sont admis par Mascagni : ce sont les mêmes que Bleuland assure avoir trouvés dans le système capillaire en général, et dans d'autres parties encore que dans les muscles. D'un autre côté, Haller rejette cette opinion. Tous ceux qui, comme lui, distinguent des parties injectables et non injectables, et c'est le plus grand nombre des anatomistes, pensent que la fibre musculaire est pleine et hors de toute circulation des fluides.

(Béclard.)

nous verrons que tous ces systèmes diffèrent essentiellement, sous ce point de vue, les uns des autres: donc il ne peut y avoir entre eux d'analogie sous le rapport de la nature, d'où dérivent toujours les propriétés.

Le tissu musculaire est remarquable par sa mollesse, par son peu de résistance. C'est par là qu'il est essentiellement différent du tissu fibreux. Il se rompt avec facilité sur le cadavre. Sur le vivant, cette rupture est rare, parce que la contraction où il se trouve dans tous les efforts violens lui donne une densité dont il emprunte un surcroît énorme de résistance, mais qu'il perd dès qu'il n'est plus dans cet état de contraction. Cependant il est des exemples de ruptures musculaires: c'est principalement aux muscles droits et carrés de l'abdomen qu'on en a observé. J'en ai vu une à ce dernier. Remarquez que lui et tous ceux placés entre les côtes et le bassin sont très-disposés, par leur position, à ces ruptures. En effet, quand le bassin et la poitrine sont portés en sens inverse, ces muscles sont d'autant plus violemment tendus, que dans ces mouvemens toute la partie supérieure du corps représente, avec la poitrine, un grand levier qui se meut en sens opposé d'un autre grand levier que forment le bassin et toutes les parties inférieures: or, par leur longueur, ces leviers sont susceptibles de recevoir un très-grand mouvement, de le communiquer par conséquent aux muscles abdominaux, qui sont étendus entre eux deux, et qui servent à les unir. Voilà comment, dans une violente inclinaison à droite, le carré du côté gauche peut être

déchiré, etc. Observez que peu de muscles dans l'économie se trouvent entre deux leviers aussi grands, sont susceptibles par conséquent d'en être autant distendus, et surtout de l'être avec une force plus grande que celle de leur contraction; car toute rupture musculaire suppose l'excès du mouvement extérieur qui distend, sur celui des fibres charnues qui se resserrent pour s'opposer à la distension. S les efforts extérieurs se concentraient sur un muscle seul, ils pourraient plus souvent en vaincre la résistance; mais presque toujours plusieurs partagent et l'effort à supporter et la résistance à opposer.

Composition du Tissu musculaire.

Le tissu musculaire a été, pour les chimistes, un objet de recherches plus spécial que la plupart des autres tissus organiques. Ils l'ont examiné sous tous les rapports. Je renvoie à leurs ouvrages, à celui de Fourcroy surtout, pour tout ce qui n'est pas strictement relatif à la nature de ce tissu, pour tout ce qui regarde les conséquences non appliquables à la physiologie qu'on peut tirer de la connaissance des principes qui entrent dans sa composition.

Exposé à l'action de l'air, le tissu musculaire s'comporte de deux manières : 1° il se dessèche, si on le coupe en tranches minces et susceptibles d'une prompte évaporation des fluides qu'il contient. Alors son aspect est d'un brun obscur; ses fibres se serrent les unes contre les autres; il s'amincit; il devient dur et cassant. Si on le replonge dans l'eau quelques jours et même quinze ou trente jours après

a dessication, il reprend sa mollesse et sa forme primitives, il offre une teinte moins foncée. L'eau qui a servi à ce ramollissement est plus ou moins fétide, et semblable à celle des macérations. 2°. Laissé en masses trop épaisses au contact de l'air, le tissu musculaire ne peut se dessécher, il se pourrit. Aussi, pour préparer les pièces anatomiques par dessiccation, a-t-on soin de diminuer l'épaisseur des plans charnus, ou de les disposer de manière à ce que l'air puisse les pénétrer partout. La putréfaction est inévitable si l'air est humide, si l'évaporation des fluides n'est pas assez prompte pour produire la dessiccation. En se putréfiant, le muscle prend une couleur verte, livide; il exhale une odeur infecte. Sous l'influence des mêmes circonstances, il se pourrit beaucoup plus vite que les systèmes fibreux, cartilagineux, fibro-cartilagineux. L'odeur qu'il exhale alors est aussi très-différente de celle de ces systèmes : souvent une lueur phosphorique s'en échappe. Un putrilage épais, où toutes les fibres ont presque disparu, remplace le muscle lorsque la putréfaction est avancée. Peu à peu ce putrilage s'évapore en partie, et il reste un résidu brun-noirâtre qui se dessèche et devient dur et cassant, à peu près comme le muscle desséché dans l'état ordinaire, quoique cependant l'aspect soit bien différent.

Exposé à l'action de l'eau, le muscle éprouve des phénomènes différens, suivant qu'elle est chaude ou froide. L'eau froide lui enlève d'abord sa couleur rouge, dont elle paraît dissoudre le principe. Pour obtenir promptement ce phénomène, il faut exposer la chair, d'abord par couches minces, à l'action

d'une eau qu'on renouvelle souvent, en plaçant, par exemple, ce muscle sous le robinet d'une fontaine, au courant d'une rivière, ou, ce qui vaut encore mieux, en le traitant par l'expression souvent répétée de l'eau dont on l'imbibe; car si on le garde dans un bocal, son extérieur seul blanchit un peu, l'intérieur conserve sa couleur. L'eau qui a servi à laver un muscle est rougeâtre, et ressemble à du sang étendu de ce fluide: elle contient la substance colorante, plus un peu de substance extractive, de la gélatine, etc. Je crois que, de tous les organes, le muscle est celui auquel on enlève le plus facilement sa couleur par les méthodes artificielles. Devons-nous nous étonner, d'après cela, si la nature fait varier si manifestement et si fréquemment cette couleur par les phénomènes de la nutrition, comme nous aurons bientôt occasion de le faire remarquer? Conservé dans l'eau à une température modérée, le tissu musculaire reste longtemps à s'y ramollir; il en vient enfin là, et se change successivement, couche par couche, en une espèce de putrilage, très-différent cependant de celui qui se forme à l'air libre, comme je l'ai fréquemment observé en mettant macérer les muscles dans une cave dont la température est uniforme. D'autres fois, au lieu de se putréfier ainsi, le muscle se change, comme l'a remarqué Fourcroy, en une substance analogue au blanc de baleine: alors sa fibre est dure, solide. Mais il s'en faut de beaucoup que tous les muscles conservés dans l'eau présentent ce phénomène. Quand il a lieu, très-souvent une espèce de produit rougeâtre, disséminé d'espace en

space sur la surface du muscle, et qui est un effet manifeste de la décomposition, annonce et ensuite ccompagne cet état, sans lequel il a aussi souvent eu. Les macérations des amphithéâtres présentent ouvent ce produit.

Lorsqu'on a enlevé aux muscles leur substance olorante par des lotions répétées, il reste un tissu lanc fibreux, dont on peut extraire encore, par ébullition, de l'albumine qui s'élève en écume, e la gélatine qui se prend par le refroidissement, ne portion de matière extractive qui offre une ouleur foncée en se concentrant, et quelques sels hosphoriques. Quand toutes ces substances ont isparu, le résidu du muscle est une substance fireuse, grisâtre, insoluble dans l'eau chaude, soible dans les acides faibles, donnant beaucoup 'azote par l'action de l'acide nitrique, et présenint tous les caractères de la fibrine du sang. Il paît, comme l'a remarqué Fourcroy, que cette ibstance est vraiment la substance nutritive du iuscle, celle qui, exhalée et absorbée sans cesse, oncourt à ses phénomènes nutritifs plus que tous es autres : elle compose l'essence du muscle, et le aractérise spécialement, comme le phosphate calaire est la matière nutritive caractéristique des os. ette substance est-elle formée dans le sang, et de portée dans le muscle? ou bien est-elle formée ans le muscle par la nutrition, et de là reportée ans le sang? Je l'ignore. Quoi qu'il en soit, elle araît éprouver de très-grandes variétés dans son xhalation et dans son absorption. L'état de laxité, e cohésion, les apparences mille fois variées du

tissu musculaire, paraissent tenir en partie à ces variétés de proportion. Ainsi le phosphate calcaire ou la gélatine, diminués par la nutrition, donnent-ils aux os de la mollesse ou de la friabilité. C'est dans cette portion fibreuse et essentielle du muscle que réside particulièrement la faculté de se crisper par l'action du calorique, soit en plongeant un muscle dans l'eau bouillante, soit en l'approchant du feu; car cette crispation est aussi sensible dans le muscle privé de sa substance colorante, de sa gélatine, de son albumine, et même d'une portion de sa substance extractive, que dans le muscle ordinaire. Il y a, en général, un rapport constant entre la quantité de cette substance fibreuse contenue dans les muscles, et la quantité qu'en renferme le sang. Dans les tempéramens forts, vigoureux, sanguins, comme on le dit, les muscles sont épais et bien plus fibreux. Dans toutes les cachexies lentes où le sang est appauvri, où le pouls est petit, faible et où la nutrition musculaire a eu le temps de se ressentir du peu de fibrine du sang, les muscles sont petits, faibles, mous, etc. En général, les muscles et le sang sont toujours en rapport constant; tandis que d'autres systèmes prédominent souvent, pendant que ce fluide semble être, dans l'économie, en moindre quantité.

Exposé longuement à l'ébullition, comme dans le bouilli ordinaire, le tissu musculaire, uni encore aux organes adjacens, à ses parties communes, donne, 1° une écume albumineuse qui paraît dépendre plus de la lymphe des cellules que du muscle lui-même; 2° beaucoup de gouttelettes graisseuses

provenant aussi spécialement du tissu cellulaire, presque étrangères au tissu du muscle par conséquent, et qui nagent à sa surface; 3° de la gélatine formée surtout par les intersections aponévrotiques; 4° une substance extractive qui colore en partie le bouillon, lui donne un goût particulier, et reste en partie adhérente à la chair, à laquelle elle communique une teinte foncée toute différente de celle des chairs crues, teinte qui dépend aussi de la substance colorante du muscle, et qui du reste se change, lorsque le bouillon refroidit, en une teinte moins foncée, et même comme blanchâtre; 5° différens sels qui concourent beaucoup à la saveur du bouillon, et que les chimistes ont désignés : voilà les phénomènes naturels de l'ébullition du muscle.

L'analyse plus étendue du bouilli n'est pas de mon ressort; mais ce qui ne doit pas nous échapper ici, ce sont les phénomènes dont la fibre est le siége pendant que les produits précédens sont extraits, soit d'elle, soit des tissus environnans. Ces phénomènes peuvent se rapporter à trois périodes. 1°. Tant que l'eau n'est que tiède, et même un peu au-dessus de la température du corps, elle laisse le tissu musculaire dans le même état, le ramollit même un peu. 2°. Quand elle approche du degré de l'ébullition, qu'elle commence à se charger d'écume albumineuse, il se crispe, se condense, se resserre, donne au muscle une densité très-supérieure à celle qui lui est naturelle, et augmente beaucoup sa résistance. J'ai observé que les muscles dans cet état supportent des fardeaux bien plus pesans que dans l'état naturel. Ils se rapprochent pour

ainsi dire de cette densité remarquable qui les ca
ractérise pendant qu'ils se contractent sur le vivant
et qui s'oppose si efficacement à leur rupture. Cett
condensation du tissu musculaire, qui est prompte
subite, augmente un peu jusqu'à l'instant de l'é
bullition, où elle est à son plus haut degré; elle s'
tient pendant un certain temps. 3°. Peu à peu ell
diminue; les fibres se ramollissent, deviennent plu
faciles à se déchirer que dans leur état ordinaire
Ce ramollissement, à l'opposé de l'endurcissemen
qui précède, se produit lentement et par gradation
Quand il est à un certain degré, la coction est suffi
sante pour nos tables. Remarquez qu'alors le mus
cle n'est point revenu à l'état où il se trouvait avan
son endurcissement; entre autres phénomènes qu
l'en distinguent, en voici un essentiel: il a perdu
la faculté de se crisper, de se racornir, soit dan
les acides très-concentrés, soit dans l'alcool, soi
surtout sous l'action vive du calorique auquel o
l'expose de nouveau. Il se pourrit en général plu
difficilement. Sa putréfaction ne donne point l
même odeur. On sait combien sa saveur diffère
Les principes qu'il a perdus sont sans doute un
des grandes causes de ces différences.

Quand le muscle est exposé à un feu nu, comm
dans le rôtissage, l'albumine s'y condense, la gé
latine se fond; la fibrine pénétrée de sucs s'atten
drit, la substance extractive s'écoule en partie ave
la gélatine et avec des sels tenus en dissolution
c'est ce qui forme le jus, qui est, comme on sait
très-différent de la graisse fondue. L'extérieur d
la viande reste plus dense que l'intérieur; il ès

oloré par la substance extractive. L'intérieur perd n partie sa couleur naturelle; sa consistance, son oût, sa composition même changent entièrement. es fibres ont, comme dans l'ébullition, perdu la aculté de se resserrer, de se crisper par les forts xcitans et surtout par le feu.

Aucune partie dans l'économie animale n'est plus ltérable par les sucs digestifs que les muscles. resque tous les estomacs supportent le bouilli, andis que plusieurs répugnent à d'autres organes uits. Les animaux carnassiers se jettent plutôt sur es muscles de leur proie, que sur les viscères pecoraux et gastriques. La chair musculaire est, pour a plupart des peuples, l'aliment le plus fréquent, elui dont ils ne se dégoûtent jamais; elle paraît tre le plus nourrissant de tous ceux que fournisent les tissus divers des animaux. Est-ce, comme n le dit, parce qu'il contient, le plus d'azote? uelle qu'en soit la raison, c'est une observation emarquable que ce rôle général que joue le système musculaire dans la digestion de tous les carivores, de l'homme en particulier. Cependant outes les parties de ce système ne paraissent pas galement propres à flatter le goût des animaux. ar exemple, c'est une observation singulière, que s cadavres apportés dans nos amphithéâtres, et ue les rats ont attaqués dans les cimetières, se ouvent toujours presque exclusivement rongés ans les muscles de la face.

Observez, à l'égard de cet usage des muscles dans digestion, que c'est la portion du système fibreux ui est adhérente aux muscles, et qui fait, pour

ainsi dire, corps avec eux, je veux dire les tendons qui est la plus altérable par la macération, par l'é bullition, et sans doute par les sucs digestifs. Re marquez encore que la grande masse que repré sentent les muscles dans le corps de tous les ani maux, dont ils forment plus du tiers, offre au espèces carnivores d'amples matériaux à leur nu trition : ainsi la nature, en multipliant ces or ganes pour les besoins de l'individu qu'ils meu vent, semble-t-elle les multiplier aussi pour ceu des individus que celui-ci doit un jour nourrir. E les formant dans chaque espèce, elle travaille pou les autres espèces autant que pour celle-là. Qui sa si ce but général, que l'observation nous présent dans la série de tous les animaux, n'est pas l cause de cette prédominance remarquable que le muscles présentent sur les autres systèmes? qu sait si la nature n'eût pas diminué les puissances d la mécanique animale, qui sont et si nombreuse et si compliquées en comparaison de celles de no machines artificielles? qui sait si elle n'eût pas sim plifié les moyens en laissant les mêmes résultats si les mouvemens des animaux avaient été l'obje unique de la formation des muscles?

Le sexe influe beaucoup sur la qualité de la cha des animaux. Je ne crois pas qu'on ait aucun donnée sur la nature de l'influence qu'exercen sur elle les parties génitales; mais voici à ce suje plusieurs faits remarquables. Les muscles des ma les, plus forts, mieux nourris, ont plus de saveur résistent plus long-temps à la coction, sont plu fermes, etc. L'eau bouillante altère, au contrair

plut vite le tissu des femelles; il est plus tendre, il donne au bouillon une saveur moins forte. Dans la saison du rut, le système musculaire des premiers se pénètre d'une odeur particulière, qui même souvent le rend désagréable au goût : c'est une observation facile à vérifier dans les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons même qu'on sert sur nos tables. Sans prendre une odeur aussi marquée, les chairs des secondes deviennent à cette époque mollasses, flasques et peu savoureuses.

§ II. *Parties communes à l'organisation du Système musculaire de la Vie animale. — Tissu cellulaire.*

Le tissu cellulaire est très-abondant dans le système musculaire : je ne connais pas même de système qui en soit pourvu en proportion plus grande. Ce tissu forme une couche extrêmement marquée autour de chaque muscle. Cette couche est le plus communément lâche, remplie de graisse, facile à être distendue par l'air dans les emphysèmes, par la sérosité dans l'anasarque. D'autres fois elle est plus dense, plus serrée, véritablement disposée en membrane : telle est, par exemple, celle qui recouvre le grand oblique de l'abdomen, dont la dissection est, à cause de cela, difficile pour les commençans. Les autres muscles abdominaux, le trapèze, le grand dentelé et le grand dorsal présentent aussi cette disposition. On dirait que par elle la nature supplée aux aponévroses, qui manquent sur les muscles larges du tronc. Au reste, cette couche n'a que l'apparence membraneuse, elle n'en a nul-

lement l'organisation; elle disparaît dans les infiltrations, où toutes les membranes véritables restent.

Outre cette enveloppe générale du muscle, chaque faisceau a une enveloppe moindre, chaque fibre une enveloppe encore moins considérable, chaque fibrille une gaîne presque insensible, quoique réelle. On peut donc se représenter le tissu cellulaire des muscles comme formant une série d'enveloppes successivement décroissantes. Ces enveloppes favorisent le mouvement des fibres qu'elles isolent, soit par la sérosité des cellules, soit par la graisse qui s'y trouve, double fluide qui, en les lubrifiant, rend plus facile leur glissement mutuel. Souvent, entre ces fibres, le tissu cellulaire paraît former des espèces de traverses qui les coupent à angle droit. On voit surtout cette disposition dans l'extenseur propre du gros orteil, et dans l'extenseur commun, dont les faisceaux charnus sont larges et minces lorsqu'on les distend. Dans la plupart des muscles épais, rien de semblable ne s'observe.

La quantité de tissu cellulaire inter-musculaire est singulièrement variable. En général, dans tous les muscles larges, dans les grands muscles longs, il est très-abondant; il est moindre proportionnellement entre les fibres de ceux des gouttières vertébrales: derrière le cou, les splénius, les complexus, etc., en ont moins que beaucoup d'autres, surtout dans les espaces qui les séparent (1).

Quelquefois des prolongemens cellulaires assez

---

(1) La laxité du tissu cellulaire inter-musculaire n'est pas moins remarquable que sa quantité. Cette propriété est indis-

considérables se trouvent au milieu des muscles, et semblent les partager en deux; tel est celui qui sépare la portion claviculaire du grand pectoral : cette disposition a même embarrassé quelquefois les anatomistes sur la division de ces organes.

En général, le tissu cellulaire fixe les muscles dans leur position : l'art de la dissection le prouve. Les fusées de pus, qui souvent font l'office du scalpel, rendent aussi très-sensible cet usage, lequel n'exclut point la mobilité en tout sens à laquelle se prête la grande extensibilité du tissu cellulaire. Non-seulement le tissu cellulaire fixe les muscles les uns aux autres, mais encore il attache chacune de leurs fibres aux fibres voisines; il s'affaisse dans leur contraction, s'allonge dans leur distension : si elles en sont privées, leurs mouvemens deviennent irréguliers et vagues. J'ai plusieurs fois isolé, par le scalpel, un muscle mis à découvert sur un animal vivant, en plusieurs petits faisceaux; en faisant ensuite contracter ce muscle par l'irritation de la moelle, au moyen d'un stylet introduit dans son canal, j'ai remarqué manifestement cette irrégularité de mouvement. Fendez longitudinalement un muscle d'un membre depuis son tendon supérieur jusqu'à l'inférieur, de manière à le

---

pensable pour la liberté de glissement des muscles les uns sur les autres. Ce qui le prouve d'ailleurs, c'est que la laxité de ce tissu est en raison directe de l'étendue de contraction des muscles voisins. Comparez en effet, sous ce rapport, les brides cellulaires qui séparent les muscles des gouttières vertébrales, avec celles que l'on rencontre entre les longs muscles de la cuisse, et vous jugerez aisément de la différence. (F. Blandin.)

diviser en deux ou trois portions entièrement isolées ; irritez ensuite une de ces portions, l'autre ou les deux autres resteront presque toujours en repos, tandis qu'une seule fibre irritée dans un muscle sain met en mouvement la totalité de ce muscle. La section des vaisseaux, des nerfs, peut sans doute influer un peu sur ce phénomène; mais certainement celle du tissu cellulaire y concourt aussi.

Souvent, dans les hydropiques, la sérosité du tissu inter-musculaire est rougeâtre; c'est un phénomène cadavérique qui dépend de ce que cette sérosité a agi après la mort sur la substance colorante. Je crois que l'effet de cette lotion ne peut avoir lieu pendant la vie que difficilement. La graisse surabonde quelquefois dans ce tissu, au point que les fibres charnues, étouffées par elle, pour ainsi dire, disparaissent et la laissent voir uniquement; mais souvent aussi on prend pour cet état graisseux des muscles l'aspect jaunâtre de leurs fibres, aspect produit par l'absence de substance colorante. Je n'ai vu le premier état que rarement; le second est extrêmement fréquent. On s'y méprendrait quelquefois au premier coup d'œil; mais l'ébullition et la combustion prouvent facilement que la graisse est absolument étrangère à cette décoloration des muscles examinés dans cet état.

Vaisseaux.

Les artères des muscles sont très-apparentes ; elles viennent des troncs voisins, et pénètrent par toute la circonférence de l'organe, plus cependant

vers son milieu que vers ses extrémités. Elles rampent d'abord entre les faisceaux principaux, se divisent ensuite et se portent par leurs divisions entre les faisceaux secondaires, se subdivisent et serpentent entre les fibres, deviennent enfin capillaires et accompagnent les fibrilles, où elles déposent, par le système exhalant, la matière nutritive.

Il est peu d'organes qui aient, à proportion de leur volume, plus de sang que les muscles. Ce sang est essentiellement nécessaire à entretenir leur excitation, comme nous le verrons : c'est lui qui colore le tissu musculaire, mais non, comme il le semble d'abord, en circulant dans ce tissu. La portion circulante ou libre n'y concourt que peu. C'est la portion combinée avec le tissu musculaire, celle qui concourt à sa nutrition, qui lui donne sa couleur : en voici les preuves : 1° les fibres des intestins sont aussi et même plus pénétrées du sang circulant que celles des muscles de la vie animale, et cependant leur tissu est manifestement blanchâtre là où ces vaisseaux ne se trouvent pas. 2°. Plusieurs animaux à sang rouge et froid, les grenouilles en particulier, ont des muscles presque blancs, et cependant beaucoup de vaisseaux rouges parcourent ce tissu blanc. 3°. J'ai observé que, dans les animaux asphyxiés, la substance colorante ne change point de couleur; sans doute parce qu'elle est lentement combinée avec le muscle par la nutrition; qu'au contraire, si on coupe alors un muscle dans les derniers instans de la vie, pendant que le sang veineux circule encore dans le système artériel, ce sang s'écoule par des jets noirs

des artères musculaires, le tissu musculaire lui-même restant rouge. Cette expérience curieuse, que j'ai indiquée dans un autre ouvrage, se fait en asphyxiant exprès un animal par une compression sur la trachée-artère, ou par tout autre moyen d'intercepter l'air dans ce conduit, pendant qu'on examine le système des muscles (1). Lorsqu'un muscle a resté exposé pendant quelque temps au contact de l'air, à celui de l'oxygène spécialement, sa couleur rouge devient sensiblement plus brillante.

Les vaisseaux musculaires laissent dans certaines circonstances échapper le sang qu'ils contiennent; de là diverses espèces d'hémorrhagies remarquables surtout dans le scorbut, quelquefois dans les fièvres putrides, rarement et même jamais dans les maladies que l'accroissement de vitalité caractérise. Infiltré de sang dans les hémorrhagies acci-

---

(1) Ajoutez à toutes ces preuves que la matière colorante retirée de la chair musculaire par des lotions répétées est différente de celle du sang libre dans le système circulatoire. Une expérience, pourtant, semble opposée à cette opinion, savoir, que la couleur des muscles ne dépend point des fluides qui y circulent. Elle consiste à pousser de l'eau chaude dans l'artère coronaire : le sang sort d'abord par la veine correspondante, puis l'eau; le cœur conserve sa couleur rouge dans les premiers instans; mais il finit par la perdre et devient tout-à-fait incolore. On serait tenté de croire, d'après cette expérience, si elle est exacte, que la substance colorante des muscles, tout en étant située hors du grand mouvement circulatoire du sang, est cependant soumise, dans ces organes, à une circulation particulière.

(Béclard.)

dentelles, spécialement dans les anévrysmes faux par diffusion, les muscles perdent en partie leur mouvement; cela arrive aussi dans les contusions, où de semblables infiltrations s'observent.

Les veines suivent partout les artères dans les muscles; elles ont les mêmes distributions, et reçoivent des contractions de ces organes un secours essentiel à leur action. Le jet de sang est plus fort quand le malade qu'on saigne contracte ses muscles que quand il les relâche; il y a pour ainsi dire expression du fluide, comme d'une éponge humide qu'on serre. La circulation artérielle ne présente point ce phénomène. J'ai observé que, si on ouvre l'artère du pied d'un animal, et qu'on fasse contracter fortement, par l'irritation des nerfs, les muscles de la jambe et de la cuisse à travers lesquels cette artère passe avant d'arriver au pied, le jet n'est pas plus fort que pendant le relâchement.

J'ai plusieurs fois injecté les veines des muscles de la vie animale, avec facilité, des troncs vers les branches; ce qui me fait croire, malgré ce qu'a dit Haller, que, dans ces organes comme dans le cœur, les valvules sont moins nombreuses que dans plusieurs autres. Sans doute que les secours que les veines empruntent de leurs organes environnans suppléent à ces replis, ou plutôt les rendent inutiles, le poids de la colonne de sang ne faisant pas un grand effort contre les parois veineuses. Les varices des veines musculaires sont, comme on le sait, extrêmement rares. Ces veines sont de deux ordres : les unes accompagnent les ar-

tères, et suivent le même trajet, les autres rampent superficiellement à la surface de l'organe, sans avoir d'artères correspondantes.

Il y a des absorbans et des exhalans dans les muscles, mais on ne peut que difficilement suivre les premiers, et les seconds ne s'aperçoivent point.

Nerfs.

Les nerfs des muscles de la vie animale viennent presque tous du cerveau; les ganglions en fournissent peu : quand cela arrive, comme au cou, au bassin, etc., outre les filets provenant de ces centres nerveux, il y a toujours des filets de nerfs cérébraux; sans cela ces muscles seraient involontaires. Peu d'organes reçoivent plus de nerfs à proportion de leur volume, que les muscles. En général, les extenseurs paraissent en avoir un peu moins que les fléchisseurs; mais la différence est très-peu sensible. Il est vrai que tous les gros troncs nerveux sont dans le sens de la flexion; que, dans celui de l'extension, il n'y a que des branches ou des rameaux, comme on le voit à la partie postérieure du bras, de l'avant-bras, de la colonne vertébrale, etc. Il est vrai aussi que cette remarque est encore applicable à l'existence des vaisseaux, qui sont et plus gros et plus nombreux dans le premier que dans le second sens; mais ce nombre plus grand de vaisseaux et de nerfs vient de ce qu'il y a bien plus de fléchisseurs que d'extenseurs, de ce que les premiers sont plus forts, à fibres plus multipliées; en sorte

que chacune de ces fibres ne reçoit guère plus de filets nerveux ou vasculaires dans les uns que dans les autres muscles. Je crois peu fondé ce qu'on a dit sur la différence de force des fibres des fléchisseurs et des extenseurs, sur la prédominance des premiers, etc. Si ceux-ci l'emportent, c'est qu'ils sont où plus nombreux, comme au pied, à la main, etc., ou plus avantageusement disposés, comme au tronc, sur lequel les muscles abdominaux agissent très-loin du point d'appui pour fléchir l'épine, tandis que pour l'étendre les muscles dorsaux exercent leur action immédiatement à côté de ce point d'appui; comme encore au cou, où les muscles qui abaissent la mâchoire inférieure et la tête, lorsque cet os est fixe, sont bien plus éloignés des condyles occipitaux que les muscles qui agissent pour produire l'extension. Quelle que soit la cause de la supériorité des fléchisseurs, on ne peut la révoquer en doute (1). Dans les convulsions hystériques, dans celles des enfans, etc., dans tous les mouvemens spasmodiques où la volonté est nulle, les contractions ont lieu bien plus dans le sens de la flexion que dans celui de l'extension, ce qui arrive cependant. 2°. Chez les vieillards, les fléchisseurs finissent par l'emporter

(1) Enoncée d'une manière générale, comme elle l'est ici, cette proposition demande *distinction*; en effet, dans certains lieux, les muscles extenseurs l'emportent sur les fléchisseurs; mais ailleurs on observe un état inverse. Ainsi, chez l'homme en particulier, dont la destination pour l'attitude verticale ne pourrait être mise en doute que par des sophistes ou d'ignorans phy-

sur les extenseurs; par exemple, les doigts se courbent presque constamment au pied et à la main. 3°. Dans tous les mouvemens, la force est toujours du côté de la flexion.

---

siologistes, les muscles postérieurs du tronc sont plus nombreux et plus forts que les fléchisseurs; et il en est de même de ceux qui servent à l'extension du bassin sur les fémurs, du pied sur la jambe. Que si on opposait les raisons données par Bichat, que chez les enfans et les vieillards ce sont les mouvemens de flexion qui prédominent; je répondrais que cela ne prouve rien pour l'homme adulte, dont il est ici question. On voit seulement par là, ce qui était connu depuis long-temps, que les deux âges extrêmes de la vie se ressemblent sous le rapport de la difficulté apportée à l'extension du tronc; or cette difficulté dépend, chez les enfans, de l'état rudimentaire des apophyses épineuses du rachis, et par suite de la brièveté du bras de levier qu'elles fournissent aux muscles dorsaux; chez les vieillards, de la courbure de l'épine en avant, sous l'influence du poids des organes antérieurs du tronc, courbure en arc qui rend moins oblique l'insertion des muscles fléchisseurs; circonstances diverses qui sont étrangères aux muscles eux-mêmes, et qui rendent impossible à ces âges la station sur deux pieds. Au reste, chez les adultes, s'il est vrai que la force effective des muscles extenseurs soit, dans plusieurs points, beaucoup supérieure à celle des fléchisseurs, la chose est bien plus réelle encore pour la force absolue; en effet, les extenseurs du tronc en particulier, les muscles des gouttières vertébrales, agissent sur le rachis, pour l'étendre, par un bras de levier infiniment plus court que celui à l'aide duquel les muscles abdominaux, par exemple, l'entraînent dans la flexion. Cette circonstance, qui frappe tous les yeux, suffit sans doute pour montrer la nécessité d'un grand appareil d'extension supérieur de beaucoup en force absolue à celui de flexion. Voyez d'ailleurs combien la nature a favorisé la flexion du rachis, et par suite soulagé l'action musculaire propre à ce mouvement : les ligamens postérieurs de cette tige osseuse sont formés d'un tissu très-exten-

En pénétrant les muscles, les nerfs les coupent, ux membres, à angle très-aigu, parce que les roncs nerveux sont dans la direction naturelle le ces organes. Au tronc, au contraire, les nerfs ortant de l'épine, les cervicaux surtout, pénè-rent leurs muscles à angle presque droit ou moins ensiblement aigu : cette circonstance est indiffé-ente. Chaque branche, arrivée dans les fibres charnues, se divise d'abord et se subdivise dans eurs interstices, puis se perd dans leur tissu (1). Chaque fibre reçoit-elle un ramuscule nerveux ? On serait porté à le croire, lorsqu'on observe que, a branche principale étant irritée, toutes les fibres ntrent en action, aucune ne reste inerte. Mais, l'un autre côté, si on en irrite une, toutes se men-vent aussi, ce qui est certainement un phénomène sympathique ou dépendant des communications cellulaires.

---

ible, de tissu fibreux jaune ; au contraire, n'êtes-vous frappés, en considérant la résistance et le peu d'extensibilité du ligament ver-ébral commun antérieur, des obstacles qui ont été mis à l'exten-ion du tronc, et par suite de l'énergie qu'il a fallu déployer dans es forces destinées à produire cet effet. (F. Blandin.)

(1) Suivant MM. Prevost et Dumas, en plaçant sur l'objectif l'un microscope solaire une tranche de muscle, le sterno-pubien l'une grenouille, par exemple, il est facile de voir que les nerfs présentent, en se terminant dans les muscles, la disposition suivante : eurs derniers rameaux s'insèrent entre les fibres musculaires, lont ils croisent la direction à angle droit ; et, chose remarquable, si le muscle est contracté, on voit que les dernières fibrilles transverses du nerf répondent précisément au sommet des angles ou flexuosités des fibres musculaires. (F. Blandin.)

Les nerfs se dépouillent-ils de leurs enveloppe celluleuses? deviennent-ils pulpeux en entrant dan les muscles? La dissection ne m'a montré rien d semblable.

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Il est peu de systèmes dans l'économie où le propriétés vitales et de tissu se trouvent à u degré aussi énergique et aussi prononcé que dan celui-ci. C'est dans les muscles qu'il faut choi sir des exemples de ces propriétés pour en don ner une idée précise et exacte. Les propriétés phy siques, au contraire, y sont peu sensibles : un mollesse remarquable les caractérise; point d force élastique dans leur tissu; très-peu de résistanc de la part de ce tissu dans l'état de mort : ce n'es que de la vie qu'il emprunte la force qui le carac térise dans ses fonctions.

§ Ier. *Propriétés de tissu. — Extensibilité.*

L'extensibilité se manifeste, dans le système musculaire animal, en une foule de circonstances. Les mouvemens divers de nos parties rendent évidente cette propriété. Telle est en effet la disposition du système musculaire, qu'une de ses portions ne peut être contractée sans que l'au-

re ne soit distendue : la cuisse, fortement fléchie, llonge les demi-nerveux, demi-tendineux et bieps; le bras, porté en dehors, met en extension e grand pectoral; élevé, il distend le grand dorsal et le grand rond. Toutes les grandes flexions nettent en jeu cette propriété dans les extenseurs; outes les extensions la rendent sensible dans les léchisseurs. Un muscle qui est étendu par son anagoniste est dans un état purement passif; il est pour ainsi dire momentanément abandonné de sa ontractilité; ou plutôt il la possède, mais elle n'y st point en action; il ne fait qu'obéir au mouvenent qui lui est communiqué. Remarquez que, lans ces cas, la distension porte exclusivement sur a portion charnue, que le tendon y est étranger, et u'il reste le même, quelle que soit la distance des oints d'attache, que ces points s'éloignent ou qu'ils e rapprochent. Dans les diverses extensions auxuelles les muscles sont exposés, les plus longs sont es plus susceptibles de s'y prêter : le couturier, les nuscles postérieurs de la cuisse, etc., présentent e phénomène d'une manière sensible; aussi leur osition y est-elle accommodée. En général, tous les nuscles remarquables par leur longueur sont suerficiels, et passent le plus communément sur eux articulations, quelquefois même sur trois ou uatre, comme aux membres. Or, le nombre de es articulations rend susceptible de très-grandes ariations l'espace compris entre les deux points 'attache, variations auxquelles se prête la grande xtensibilité de ces muscles. On conçoit, d'après ce ui a été dit plus haut, que c'est à la longueur des

fibres charnues, et non à la longueur totale du muscle, que son degré d'extensiblité est relatif. Ceux auxquels beaucoup d'aponévroses sont entremêlées, et qui empruntent en partie de ces membranes ou des tendons leur étendue, jouissent moins de cette propriété. Voilà pourquoi, dans les mêmes mouvemens, des muscles de même longueur totale deviennent plus ou moins courts, plus ou moins allongés dans leur portion charnue. Observons cependant que, quand la portion tendineuse prédomine beaucoup d'une part, et que de l'autre elle est très-mince, elle prête un peu de son côté, comme on le voit aux plantaires et aux palmaires grêles.

Si, de l'état naturel, nous passons à l'état pathologique, nous voyons l'extensibilité musculaire se manifester à un degré bien plus sensible encore. A la face, l'air accumulé dans la bouche la gonfle en allongeant les buccinateurs; les tumeurs diverses de cette cavité, les fongus, les sarcômes distendent souvent les petits muscles faciaux d'une manière qui nous frapperait, si nous avions égard, dans ce phénomène, au peu d'étendue naturelle de ces muscles, qu'ils triplent et quadruplent même. Les muscles des paupières et de l'œil, dans les carcinômes volumineux de cet organe, ceux de la partie antérieure du cou dans les grands engorgemens de la thyroïde, le grand pectoral dans les anévrysmes considérables ou dans les autres tumeurs de l'aisselle, les muscles abdominaux dans la grossesse, dans l'hydropisie, dans les tumeurs diverses du bas-ventre, etc., les muscles superficiels et larges du dos dans certains li-

pômes qui leur sont subjacens, nous présentent ces phénomènes de distension d'une manière remarquable. Les muscles des membres y sont moins sujets, parce que, d'un côté, moins de causes développent des tumeurs au-dessous d'eux, et que, d'un autre côté, les aponévroses ne se prêteraient point aussi aisément à ces phénomènes.

Contractilité de tissu.

La contractilité de tissu est portée au plus haut point dans les muscles. Ces organes sont dans une tendance continuelle à la contraction, surtout quand ils ont dépassé, en s'allongeant, leur grandeur naturelle. Cette tendance est indépendante de l'action des nerfs et de la propriété irritable du tissu musculaire. Elle est influencée par la vie, mais elle n'y est pas spécialement liée : c'est de la structure des muscles qu'elle dépend essentiellement. Le phénomène remarquable des muscles antagonistes en résulte. Voici ce phénomène.

Chaque point mobile de la charpente animale est toujours entre deux forces musculaires opposées, entre celles de flexion et d'extension, d'élévation et d'abaissement, d'adduction et d'abduction, de rotation en dehors et de rotation en dedans, etc. Cette opposition est une condition essentielle aux mouvemens; car, pour en exercer un, il faut que le point mobile soit dans le mouvement opposé; pour se fléchir, il faut qu'il soit préliminairement étendu, et réciproquement. Les deux positions opposées que

prend une partie mobile sont alternativement, pour elle, et le point de départ et le point d'arrivée ; les deux extrêmes de ces positions sont les deux bornes entre lesquelles elle peut se mouvoir. Or, entre ces deux bornes, il a un point moyen ; c'est le point de repos de la partie mobile : quand elle s'y trouve, ses muscles sont dans leur état naturel ; dès qu'elle le franchit, les uns sont tendus, les autres contractés ; et telle est leur disposition, que la contraction et l'extension qui ont lieu en sens opposé sont exactement en raison directe. D'après cela, dans l'influence réciproque que les muscles exercent les uns sur les autres, ils sont donc alternativement actifs et passifs, puissance et résistance, organes mus et organes qui font mouvoir. L'effet de tout muscle qui se contracte n'est donc pas seulement d'agir sur l'os auquel il s'implante, mais encore sur le muscle opposé. Souvent même entre deux muscles ainsi opposés il n'y a point d'organes solides intermédiaires, comme aux lèvres, sur la ligne blanche, etc. Le muscle d'un côté agit alors directement sur celui qui lui correspond, pour le distendre. Or, cette action des muscles les uns sur les autres est précisément le phénomène des antagonistes : deux muscles sont tels, quand l'un ne peut pas se contracter sans que l'autre ne s'allonge, et réciproquement. Examinons dans ce phénomène le rôle de la contractilité de tissu : il faut bien distinguer son influence de celle des forces vitales, ce qu'on n'a point fait assez jusqu'ici.

Un muscle, une fois placé dans sa position moyenne, ne peut s'en éloigner que par l'influence

des forces vitales, que par la contractilité animale ou par l'organique sensible; parce que, dans cette position, la contractilité de tissu de son antagoniste fait équilibre à la sienne, et qu'il faut par conséquent une force ajoutée à celle-ci pour surmonter celle qui lui est opposée. Mais si ce muscle se trouve dans une des deux positions extrêmes de la précédente, par exemple, dans l'adduction, l'abduction, la flexion, l'extension, etc., alors il y aura inégalité d'action dans les antagonistes, sous le rapport de la contractilité de tissu; le plus tendu fera pour se contracter un effort bien plus grand que celui qui est déjà raccourci. Pour maintenir l'équilibre, il faut donc que les forces vitales continuent à influencer les muscles contractés. Aussi toute position extrême des membres, et d'une partie mobile quelconque, ne peut, dans l'état ordinaire, être maintenue que par l'influence des forces vitales. Que ces forces cessent d'être en action, aussitôt la contractilité de tissu du muscle allongé, qui tendait à s'exercer, mais qui en était empêchée, s'exerce en effet, devient efficace, et ramène la partie mobile à sa position moyenne, position où l'équilibre se rétablit. Voilà pourquoi, dans tous les cas où l'influence cérébrale est nulle sur les muscles, où ils ne sont point irrités par des stimulans, les membres se trouvent constamment dans une position moyenne à l'extension, etc. C'est ce qui arrive dans le sommeil, chez le fœtus, etc. J'ai montré ailleurs comment la disposition osseuse de chaque articulation est accommodée à ce phénomène, comment toute espèce de rapport entre les surfaces arti-

culaires, autre que celui de cette position moyenne, présente un état forcé où certains ligamens sont nécessairement plus tiraillés que les autres, et où jamais les surfaces ne sont en contact aussi général que dans cette position. Dans certaines fièvres qui portent sur la vie et la texture musculaires une influence comme délétère, la prostration horizontale et l'extension des membres ne viennent pas d'un surcroît d'action des extenseurs, mais du peu d'énergie des fléchisseurs, qui n'ont point la force de surmonter le poids du membre : aussi remarquez que toute attitude analogue coïncide toujours avec des signes de faiblesse générale : c'est celle des fièvres putrides, etc.

La section d'un muscle vivant nous offre deux phénomènes qui sont manifestement le produit de la contractilité de tissu :

1°. Les deux bouts se rétractent en sens opposé; il reste entre ces bouts divisés un intervalle proportionné à la rétraction. Cette rétraction n'est pas mesurée, comme on l'a cru, par les degrés de contractions du muscle : si cela était, il suffirait, dans une plaie transversale, de mettre le membre dans le plus grand relâchement possible, pour affronter les bouts divisés : or, souvent, dans ce cas, ces bouts restent encore écartés; donc la rétraction est souvent supérieure à la plus grande contraction du muscle considéré dans son état naturel.

2°. L'antagoniste du muscle coupé, qui n'a plus d'effort à surmonter, se contracte et fait pencher de son côté la partie mobile, s'il n'y a pas d'autres muscles qui, agissant dans le sens du premier,

suppléent à ses fonctions. Ce dernier phénomène a lieu aussi jusqu'à un certain point dans les paralysies de la face : la bouche se tourne alors du côté sain. J'observe cependant, à cet égard, que cette déviation n'est jamais aussi sensible qu'elle le serait par la section du muscle devenu paralytique, lequel a conservé sa contractilité de tissu. Cette contractilité restante fait en partie équilibre avec celle des muscles du côté sain pendant l'absence des mouvemens : aussi la déviation ne devient très-marquée que lorsque les malades veulent parler, que lorsque, par conséquent, les forces vitales mettent en jeu les muscles sains, auxquels les autres ne peuvent s'opposer. La paralysie du sterno-mastoïdien présente, pour toute la tête, un phénomène analogue à celui que les muscles précédens inactifs déterminent sur la bouche. Souvent le strabisme tient encore à cette cause.

En général, dans tous ces phénomènes, il faut bien distinguer ce qui appartient aux forces vitales, de ce qui dépend de la contractilité de tissu. Les muscles sont antagonistes sous le rapport de ces forces, comme sous le rapport de cette contractilité ; or, comme la contraction dépendante de l'influence nerveuse ou de l'irritabilité est bien plus marquée que celle provenant du tissu organique, les phénomènes des antagonistes sont bien plus frappans dans la paralysie, lorsque les muscles sains sont mis en jeu de la première manière. Il paraît que, dans beaucoup de paralysies, la contractilité de tissu est aussi un peu altérée du côté affecté ; mais jamais elle n'est totalement détruite,

de manière à ce que, dans l'amputation d'un membre paralysé, il n'y ait point de rétraction musculaire. J'ai fait cette expérience sur un chien : les nerfs ayant été coupés dix jours auparavant, et le membre étant resté immobile depuis cette époque, la section des muscles produisit un écartement manifeste entre leurs bords; et même, en coupant ensuite comparativement le membre resté sain, je ne trouvai aucune différence.

C'est surtout lorsque les muscles ont été préliminairement distendus, et qu'on fait cesser leur distension, que la contractilité de tissu se prononce. La ponction dans l'ascite et l'accouchement pour les muscles abdominaux, l'ouverture des dépôts profonds pour ceux du tronc, l'extirpation d'une tumeur située sous un muscle quelconque, etc., nous montrent cette propriété en action d'une manière extrêmement marquée. Il est cependant une observation à cet égard, savoir, que, si l'extension a été de longue durée, ou bien si elle s'est fréquemment répétée, la contraction consécutive est bien moindre, parce que le tissu musculaire a été affaibli par l'état pénible où il s'est trouvé : de là, 1° la flaccidité du ventre à la suite des grossesses multipliées ; 2° la laxité du scrotum après la ponction d'une ancienne hydrocèle. 3° J'ai vu chez Desault un homme opéré en Allemagne d'un fongus de la bouche, et qui avait conservé, du côté où était la maladie, des rides remarquables, dépendant de l'étendue plus grande du plan charnu de ce côté, qui ne pouvait plus se contracter comme l'autre: la mastication ne se faisait à cette époque

ue du côté sain. 4°. Quand les femmes ont fait eaucoup d'enfans, le diaphragme s'affaiblit par es pressions répétées, et de là en partie la mobi-té plus grande des côtes, qui supplée plus, chez sexe, au défaut d'action de ce muscle. Je crois ue, dans diverses affections chroniques de la poi-ine et du bas-ventre où il y a distension prolon-ée de ce muscle, les médecins devraient, plus u'ils ne le font, avoir égard à cette cause de la dif-culté de respirer, lorsque le principe de la dis-ension n'existe plus, comme à la suite de l'évacua-on des hydropisies, etc.

L'étendue de la contractilité de tissu est, dans les uscles, proportionnée à la longueur des fibres : oilà pourquoi, dans les amputations, le plan su-erficiel se rétracte plus que le profond ; pourquoi, ans le sommeil, les phénomènes de contractilité e tissu sont très-apparens dans les membres, dont s muscles sont très-longs; pourquoi, en général, ans les antagonistes, la nature a opposé l'un à autre des muscles proportionnés ; pourquoi, par onséquent, un muscle à longues fibres a rarement our l'équilibrer un muscle à fibres courtes, et ré-proquement. Les fléchisseurs et les extenseurs du ras, de l'avant-bras, de la cuisse, de la jambe, ont à peu près de même étendue ; les rotateurs e l'humérus en dehors, et ceux en dedans, im-lantés les uns dans la fosse sous-épineuse, les utres dans la sous-scapulaire, se ressemblent aussi ous ce rapport. La proportion entre les antago-istes est encore plus remarquable à la face, où es mêmes muscles agissent le plus communément

en sens inverse de chaque côté de la ligne média

La vitesse des contractions née de la contractil de tissu n'est point comme celle produite par contractilité animale, ou celle produite par l'or nique sensible, qui sont constamment plus moins marquées, suivant que l'influence nerveu ou le stimulant agissent plus ou moins forteme Tout mouvement dépendant de la contractilité tissu est lent, uniforme, régulier; ce n'est q quand le tissu musculaire est affaibli qu'il din nue; il n'augmente que quand ce tissu est pl prononcé : d'où il suit que les variétés de vites ne peuvent s'observer que dans différens indi dus, ou sur le même à différentes époques, et no comme dans l'exercice des forces vitales, d'u instant à l'autre. C'est là une grande et rema quable différence entre l'une et l'autre espèces propriétés.

La mort affaiblit la contractilité de tissu, ma elle ne l'anéantit point : un muscle étant cou se rétracte long-temps après que la vie ne l'anim plus. La putréfaction seule met un terme à l'exi tence de cette propriété. Il en est de même de l'e tensibilité. J'observe cependant que, tant que chaleur vitale pénètre encore les muscles, ils so plus rétractiles que quand le froid de la mort s'e est emparé.

Haller place sur la même ligne, et fait dériv des mêmes principes, les phénomènes résultant c la contractilité de tissu, qui, à certaines différenc près, répond à sa force morte, et ceux produits pa l'action des acides concentrés, de l'alcool, d

u, etc., sur les substances animales, qui se cris-
ent, se resserrent, se racornissent par l'effet de
s différens agens. Mais voici plusieurs différences
ui isolent essentiellement les uns des autres ces
hénomènes. 1°. La contractilité de tissu est très-
eu prononcée dans des organes où la faculté de se
acornir est très-sensible, par exemple, dans tous
s organes des systèmes fibreux, fibro-cartilagi-
eux, séreux, etc., etc. 2°. La contractilité de tissu
st répandue, à des degrés très-variables, dans les
arties: depuis les muscles et la peau, qui en jouis-
ent au plus haut degré, jusqu'aux cartilages, qui
n semblent dépourvus, il est une foule de varia-
ons; la faculté de se racornir par les agens indi-
ués est, au contraire, presque uniformément dis-
ribuée, ou au moins ses différences sont bien
oins sensibles. 3°. L'une devient nulle dans les
rganes desséchés, l'autre s'y conserve manifeste-
ent après des années entières, comme le parche-
in en est la preuve. 4°. Le première reçoit d'une
anière évidente un surcroît d'énergie de la vie,
urtout dans les muscles; la seconde ne paraît
resque pas être modifiée par elle. 5°. Celle-ci offre
oujours des effets subits, des contractions rapides.
entir le contact du feu, des acides ou de l'alcool
oncentrés, et se racornir, sont deux phénomènes
ue la même seconde rassemble dans les parties
nimales; au contraire, la contractilité de tissu ne
'exerce que lentement, comme nous avons dit.
°. Cette dernière ne peut jamais donner aux par-
ies, aux muscles spécialement, cette remarquable
lensité qu'ils nous offrent dans leur racornisse-

ment. 7°. Le défaut d'extension des fibres est l seule condition nécessaire à la contractilité de tissu qui tend sans cesse à entrer en activité ; il faut a contraire, pour crisper les fibres, qu'il y ait con tact d'un corps étranger sur elles. Je pourrais ajou ter beaucoup de preuves à celles-ci, pour établi une démarcation essentielle entre des phénomène confondus par l'illustre physiologiste d'Helvétie.

§ II. *Propriétés vitales.*

La plupart de ces propriétés jouent un rôle très important dans les muscles. Nous allons d'abor examiner celles de la vie animale ; nous traiteron ensuite de celles de la vie organique.

Propriétés de la Vie animale. — Sensibilité.

La sensibilité animale est celle, de toutes le propriétés vitales, qui est la plus obscure dans ce organes, au moins si on les considère dans l'éta ordinaire. Coupés transversalement dans les amputations, dans les expériences sur les animaux vivans, ils ne font éprouver aucun sentiment pénible bien remarquable: ce n'est que lorsqu'un filet nerveux se trouve intéressé que la douleur se manifeste. Le tissu propre du muscle n'est que très-peu sensible; l'irritation par les stimulans chimiques n'y montre pas plus à découvert la sensibilité.

Cependant il est un sentiment particulier qui,

ans les muscles, appartient bien évidemment à ette propriété : c'est celui qu'on éprouve après des ontractions répétées, et qu'on nomme *lassitude*. . la suite d'une longue station, c'est dans l'épais aisceau des muscles lombaires que ce sentiment e rapporte surtout. Après la progression, la ourse, etc., si c'est sur un plan horizontal qu'elles nt eu lieu, ce sont tous les muscles des membres nférieurs ; si c'est sur un plan ascendant, ce sont urtout les fléchisseurs de l'articulation ilio-fémoale; si c'est sur un plan descendant, ce sont les nuscles postérieurs du tronc qui se fatiguent plus articulièrement. Dans les métiers qui exercent urtout les membres supérieurs, souvent on y prouve ce sentiment d'une manière remarquable, equel sentiment n'est certainement pas dû à la ompression exercée par les muscles en contraction ur les petits nerfs qui les parcourent. En effet, il eut avoir lieu sans cette contraction antécédente, omme on l'observe dans l'invasion de beaucoup le maladies, où il se répand en général sur tout le ystème musculaire, et où les malades sont, comme ls disent, fatigués, lassés, de même qu'à la suite l'une longue marche. Ce sentiment paraît dépenlre du mode particulier de sensibilité animale des nuscles, sensibilité que les autres agens ne dévoloppent point, et que la permanence de contraction rend ici très-apparente. Ainsi le système fibreux, sensible seulement aux moyens de distension qui agissent sur lui, ne reçoit-il point une influence douloureuse des autres agens d'irritation. Remarquez que ce sentiment pénible qu'un mouvement trop

prolongé fait naître dans les muscles est un moyen dont se sert la nature pour avertir l'animal d'y mettre des bornes, sans quoi il finirait par lui devenir funeste. Ainsi le sentiment particulier que font naître les ligamens distendus est-il destiné à prévenir l'animal de mettre des bornes à leur extension. Voilà comment chaque organe a son mode propre de sensibilité; comment on aurait une fausse idée de l'existence de cette propriété, si on ne la jugeait que d'après les agens mécaniques et chimiques; comment surtout la nature accommode aux usages de chaque organe son mode de sensibilité animale.

Dans les phlegmasies du tissu musculaire propre, souvent la sensibilité animale s'exalte à un point très-marqué; le moindre contact sur la peau devient douloureux; à peine le malade peut-il supporter le poids des couvertures: souvent la moindre secousse qui le fait vaciller lui cause dans les membres les plus vives douleurs. Mais, en général, ces douleurs-là sont toutes différentes du sentiment pénible que nous nommons *lassitude:* ainsi la douleur d'un ligament distendu, dans l'état sain, n'est-elle point celle qui naît d'un ligament ou de tout autre organe fibreux enflammé.

J'ajoute à ce que j'ai dit plus haut sur ce sentiment, que quelques organes se fatiguent comme les muscles, par la durée trop prolongée de leurs fonctions : tels sont les yeux par le contact de la lumière, les oreilles par celui des sons, le cerveau par les méditations, etc., et en général tous les organes de la vie animale : c'est même cette lassitude générale qui amène le sommeil, comme je l'ai prouvé

ns mes *Recherches sur la Vie*. Mais remarquez e le sentiment que font éprouver l'œil, l'oreille, cerveau, et tous les organes externes ainsi fatigés, n'est point le même que celui des muscles i ont beaucoup agi : autre preuve du mode particier de sensibilité de ceux-ci, et en général de ute partie vivante.

Contractilité animale.

Cette propriété animale sur laquelle roulent us les phénomènes de la locomotion et de la voix, i aide à beaucoup de ceux des fonctions intérieu- et extérieures, a exclusivement son siége dans système musculaire animal ; c'est elle qui le disgue de l'organique, et même de tous les autres. e consiste dans la faculté de se mouvoir sous l'inence cérébrale, soit que la volonté, soit que utres causes déterminent cette influence. La ntractilité animale porte donc, comme la sensiité de même espèce, un caractère propre et distctif des deux contractilités organiques, caractère i consiste en ce que son exercice n'est pas concenté dans l'organe qui se meut, mais qu'il nécessite core l'action du cerveau et des nerfs. Le cerveau t le principe d'où part, pour ainsi dire, cette proiété, comme il est celui où arrivent toutes les senstions : les nerfs cérébraux sont les agens qui la ansmettent, comme ils sont, quoiqu'en sens oppsé, les conducteurs des phénomènes sensitifs. où il suit que, pour bien concevoir cette pro-

priété, il faut l'examiner dans le cerveau, dans le nerfs, et dans le muscle lui-même.

Contractilité animale considérée dans le Cerveau

Tout dans les phénomènes de contractilité animale annonce l'influence du cerveau.

Dans l'état ordinaire, si plus de sang est porté à cet organe, comme dans la colère; si l'opium pris à dose modérée, l'excite légèrement; si le vin produit le même effet, l'action musculaire croît en énergie à proportion que celle du cerveau est aussi accrue. Si la terreur, en ralentissant le pouls en diminuant la force du cœur, et par là même la quantité de sang poussée au cerveau, le frappe comme d'atonie; si les narcotiques divers, porté à l'excès, produisent le même effet; si le vin empêche son action par sa quantité trop grande, alors voyez ces muscles languir dans leur mouvement éprouver même une intermittence remarquable. Si le cerveau est tout concentré dans ses rapports avec les sens, ou dans ses fonctions intellectuelles, il oublie les muscles pour ainsi dire; ceux-ci restent inactifs: l'homme qui regarde ou entend avec attention ne se meut point; celui qui contemple, médite, réfléchit, ne se meut point non plus. Les phénomènes de l'extase, l'histoire des études des philosophes, nous présentent fréquemment ce fait important, cette inertie musculaire, dont le principe est dans la distraction de l'influence cérébrale qui n'augmente dans d'autres fonctions qu'en diminuant dans la locomotion.

Dans les maladies, toutes les causes qui agissent ortement sur le cerveau réagissent subitement sur e système musculaire animal : or, cette réaction se nanifeste par deux états opposés , par la paralysie t par les convulsions. Le premier est l'indice de l'é-ıergie diminuée, le second celui de l'énergie aug-nentée : l'un a lieu dans les compressions par du ous, par du sang épanché, par des os enfoncés au-lessous de leur niveau naturel, par les suites de l'a-oplexie ; il se montre dans l'invasion de la plupart les hémiplégies, invasion subite dans laquelle le nalade tombe, perd connaissance, et a tous les si-gnes d'une lésion cérébrale. Cette lésion disparaît, nais son effet reste, et cet effet est l'immobilité l'une division du système musculaire. L'autre état, ou le convulsif, dépend des irritations diverses de l'organe cérébral par des esquilles osseuses enfoncées dans sa substance, par son inflammation ou par celle de ses membranes, par les tumeurs diverses dont il peut être le siége, par les lésions organiques qu'il peut éprouver, lésions que j'ai rarement observées dans l'adulte, mais que l'enfance offre quelquefois, par les causes mêmes de compressions ; car souvent nous voyons coïncider cet état convulsif avec les épanchemens divers, avec l'hydrocéphale, etc (1).

---

(1) Sans doute, l'état convulsif du système musculaire peut se rencontrer dans l'hydropisie encéphalique, mais au début, alors que l'épanchement aqueux est encore peu considérable, et que subsiste encore, à un certain degré d'acuité, l'irritation inflammatoire qui le produit. Au reste, ces phénomènes, plus communs chez les enfans, sont loin d'être étrangers aux adultes, comme cela

L'état du système musculaire animal est vraiment le thermomètre de l'état du cerveau; le degré de ses mouvemens indique le degré d'énergie de cet organe. Ceux qui font la médecine dans une salle de fous ont occasion de consulter souvent ce thermomètre : à côté du furieux, dont la force musculaire est doublée, triplée même, est un homme dont tous les mouvemens languissent dans une inertie remarquable. Mille degrés divers s'observent dans ces mouvemens : or, ces degrés ne dépendent pas des muscles; le fou le plus furieux est souvent celui dont les formes extérieures les plus grêles indiquent la plus faible constitution musculaire; comme le plus automate est parfois celui dont les muscles sont le plus énergiquement développés. Les muscles sont au cerveau ce que les artères sont au cœur; le médecin reconnaît par ces vaisseaux l'état de l'organe central de la circulation qui leur communique l'impulsion; par les muscles de la vie animale, il reconnaît comment est l'organe central de cette vie. Voyez les malades dans une foule de fièvres essentielles : le matin il y avait prostration, le soir vous trouvez une agitation extrême dans les muscles. Or, quel est le siége de cette révolution ? ce ne sont pas les muscles; c'est le cerveau : il y a un transport à la tête, comme on le dit vulgairement.

Si, du lit des malades, nous nous transportons

---

semblerait résulter des observations de Bichat; et, en outre, ils deviennent de nouveau très-fréquens dans la vieillesse.

(F. Blandin.)

dans le laboratoire du physiologiste, nous voyons les expériences parfaitement d'accord avec les observations précédentes. La ligature de toutes les artères qui vont au cerveau interrompt tout à coup les mouvemens de cet organe, mouvemens nécessaires à son action; elle fait cesser subitement la motilité volontaire, et ensuite la vie. En injectant, par la carotide et vers la tête, de l'encre, des dissolutions de sels neutres ou d'acides, des substances dont le contact est funeste à l'action cérébrale, j'ai toujours vu périr l'animal avec des mouvemens convulsifs préliminaires. L'injection de l'eau ne produit point cet effet : elle peut impunément pour la vie du cerveau être introduite dans le sang artériel, si elle est injectée modérément; mais poussez-la avec force, vous irritez vivement cet organe, et à l'instant l'animal est pris de violentes agitations; ralentissez l'impulsion, le repos succède. J'ai déjà rapporté ailleurs cette expérience. Si on met à découvert la masse céphalique, et qu'on l'irrite avec un agent mécanique ou chimique, etc., à l'instant le système musculaire animal entre en action. Cependant il est à observer que, dans ces expériences, la convexité de l'organe paraît bien moins liée aux mouvemens que sa base. Bornée à la substance corticale, aux couches superficielles de la médullaire, l'irritation est presque nulle; ce n'est que quand on arrive vers les couches inférieures que les convulsions surviennent. J'ai voulu essayer plusieurs fois de déterminer avec précision l'endroit où l'irritation devient une cause de convulsion; mais cela m'a paru toujours très-difficile, et les résultats ont été infiniment

variables. Je crois qu'on ne peut guère établir qu'un donnée générale, savoir, que plus on se rapproche dans les expériences, de la protubérance annulaire et en général de la base cérébrale, plus les phénomènes convulsifs sont apparens (1) : ils sont d'autan moindres qu'on s'en éloigne davantage, ils sont nul à la surface convexe. Remarquez que c'est du côt de sa base, c'est-à-dire, du côté de sa partie essen tielle, que le cerveau reçoit les nombreux vaisseau qui y portent l'excitation et la vie, soit par le mou vement qu'ils lui communiquent, soit par la natur du sang rouge qu'ils lui apportent, comme mes ex périences l'ont, je crois, démontré.

---

(1) Ces remarques de Bichat sont en rapport avec les recherches ultérieures des physiologistes sur les fonctions de l'axe nerveux cérébro-spinal. Il résulte, en effet, des travaux les plu récemment entrepris à cet égard par MM. Magendie, Flourens, etc qu'à la protubérance annulaire et aux tubercules quadrijumeaux s termine supérieurement, la portion des centres nerveux destiné à influencer directement la contraction musculaire. Et M. Magendie, en particulier, a établi que la protubérance annulaire et l moelle président aux mouvemens, seulement par la partie à l'aid de laquelle elles se trouvent en rapport avec la base du crân et avec les corps des vertèbres, qui sont la base du canal rachidien En un mot, les phénomènes convulsifs, dans les expériences o l'axe cérébro-spinal est artificiellement irrité, sont de plus e plus apparens, à mesure que l'irritation agit plus près de l base du crâne et de la protubérance annulaire, comme le di Bichat; mais en outre (et ce physiologiste l'ignorait), l même chose s'observe pour la partie antérieure de la moelle, qu est l'analogue de la partie inférieure ou de la base du cerveau

(F. Blandin.)

Ajoutez à ces expériences celles des commotions rtificielles. Les muscles du bœuf vacillent, et cesent de se soutenir dès l'instant où le coup lui est orté. D'autres fois les animaux expirent en agitant onvulsivement leurs membres sous le coup qui les rappe à l'occipital : les lapins offrent souvent ce phé nomène. Les pigeons meurent avec des mouvemens onvulsif des ailes. Toujours des agitations irrégulières, déterminées par un influx irrégulier du cerveau, précédent l'instant de la mort que la commotion a produite.

Concluons de toutes ces expériences, et des obervations qui les précèdent, que l'action du système nusculaire animal est toujours essentiellement liée l'état du cerveau, que quand il augmente ou diminue cette action, il y a presque toujours augmentation ou diminution de l'action cérébrale.

N'exagérons pas cependant le rapport qui lie aux hénomènes cérébraux les phénomènes musculaies : l'observation nous démentirait. Il est divers xemples de congestions aqueuses, sanguines, puruentes même dans le cerveau, sans que le mouvement nusculaire en ait été altéré. Diverses tumeurs, des ices divers de conformation, ont donné lieu au rouble des fonctions intellectuelles, sans troubler elles des muscles : combien de fois le cerveau n'est-il as dérangé dans les diverses espèces d'aliénations! ombien de fois l'intelligence, la mémoire, l'attenion, l'imagination n'indiquent-elles pas ces dérangemens, par leurs irrégulières aberrations, sans que le ystème musculaire s'en ressente ! Le sentiment xtérieur n'est-il pas souvent altéré sans que le

mouvement le soit? En général, le cerveau a troi grandes fonctions. 1°. Il reçoit les impressions de sens externes : il est sous ce rapport le siége de l perception. 2°. Il est le principe, le centre des mou vemens volontaires, qui ne s'exercent que par so influence. 3°. Les phénomènes intellectuels son essentiellement liés à la régularité de sa vie ; il en es pour ainsi dire le siége. Or, il peut être dérang pour l'une de ses fonctions, et rester intact pour le autres, être un principe régulier des mouvemens, e un centre irrégulier des phénomènes de l'intelli gence, ne point communiquer avec les objets ex térieurs par les sens, et déterminer des mouvemens ou présider aux fonctions intellectuelles, comme i arrive dans le sommeil qu'agitent les rêves, etc (1).

---

(1) Au temps de Bichat, les faits pathologiques avaient bie déjà, comme on le voit, jeté une vive lumière sur les fonction cérébrales ; ils avaient bien appris que certaines lésions de l'en céphale peuvent troubler les mouvemens sans gêner les fonc tions intellectuelles, et réciproquement ; mais c'est seulement d nos jours que l'on est parvenu à montrer les points de cette mass nerveuse dont l'intégrité est nécessaire à la régularité des fonction intellectuelles, et ceux qui ont des rapports immédiats avec le mouvemens ; questions fort importantes, non-seulement pour l physiologie, mais encore pour la pathologie. En effet, pour n citer qu'un seul exemple, on a de fortes raisons de croire aujourd'hui que le malade chez lequel on reconnaît une perversion des fonctions intellectuelles offre une altération plus ou moin patente de la surface des lobes cérébraux, tandis que cet autre qui est devenu paralytique, ou chez lequel des convulsions variées se sont manifestées, présente plus spécialement une affection du centre des lobes cérébraux ou des masses nerveuses appliquées sur la base du crâne et du canal rachidien. (F. Blandin.)

On conçoit, d'après ce qui vient d'être dit, que
es fœtus complétement acéphales ne sauraient vivre
ors du sein de leur mère. Comme la vie animale est
ulle chez le fœtus, que la respiration ne s'y fait pas,
ue les fonctions sont bornées à la grande circulation,
ux sécrétions, aux exhalations et à la nutrition, les
céphales peuvent vivre dans le sein de leur mère,
prendre même des dimensions très-marquées:
nais, à la naissance, ils ne sauraient respirer, les
ntercostaux et le diaphragme ne pouvant agir; les
iscères gastriques ne reçoivent aucune influence
e leurs parois musculaires; tous les membres sont
nmobiles; la vie animale, qui commence pour les
utres à la naissance, ne peut commencer pour eux,
uisqu'ils n'ont point le centre de cette vie; ils ont
es sens, mais rien pour recevoir leur impression;
es muscles, mais rien pour les faire mouvoir; ils ne
euvent que continuer un peu à vivre en eux-mêmes,
ans commencer à vivre au dehors. Mais comme,
n général, il paraît que, dès que l'enfant quitte la
natrice, le sang rouge lui devient nécessaire, qu'il
aut, pour l'avoir, qu'il respire, et que cette fonction
e peut commencer, il perd la vie intérieure qu'il
vait dans le sein de sa mère. Il est des acéphales
ui ont à l'origine des nerfs un petit renflement
nédullaire; chez d'autres la moelle est plus pro-
oncée. Si ces renflemens médullaires, si la moelle
pinière, par sa texture particulière, remplacent le
erveau, la vie peut avoir lieu, et c'est comme
ela qu'on pourrait expliquer quelques exemples
'acéphales qui ont vécu un certain temps. Mais
ertainement un acéphale organisé comme nous, et

chez qui rien ne remplace le cerveau, ne peut vivr Aussi, dans tous les exemples de cette monstruc sité rapportés par les auteurs, par Haller surtout l'individu est-il mort à sa naissance.

Contractilité animale considérée dans les Nerf.

Éloigné de presque tous les muscles, le cerveau communique avec eux par le système nerveux, e leur transmet par eux son influence : or, cett communication se fait de deux manières : 1° il es des nerfs qui vont directement du cerveau au muscles de la vie animale; 2° le plus grand nom bre ne partent point de cet organe même, mais d la moelle épinière. Presque tous les muscles du cou tous ceux de la poitrine, de l'abdomen et des mem bres, reçoivent leurs nerfs de cette dernière source La moelle épinière est, pour ainsi dire, un ner général, dont les autres ne sont que des division et des branches principales.

Toutes les lésions de ce nerf principal sont ressenties par les muscles qu'il a sous son influence les compressions qu'il éprouve par une fracture des vertèbres, par un déplacement quelconque, pa un épanchement de sang, de sérosité, de pus, etc. dans le canal vertébral, les commotions qui arrivent par un coup violent reçu sur toute la région de l'épine, par une chute sur les lombes, sur la partie supérieure du sacrum, sont suivies d'un engourdissement, d'une paralysie des muscles subjacens. Coupez la moelle, en introduisant un scal-

ɔel dans le canal, tout mouvement cesse aussitôt ıu-dessous de la section. Voulez-vous, au con- raire, faire naître les convulsions, introduisez ın stylet dans le canal; irritez la moelle, soit avec ;e stylet, soit avec différens agens chimiques, que vous y porterez par son moyen; aussitôt vous ver- ·ez frémir et s'agiter tout ce qui est inférieur dans e système musculaire animal.

Plus la lésion de la moelle est supérieure, plus ɜlle est dangereuse. Dans la région lombaire, elle ıe porte son influence que sur les membres infé- ·ieurs, et sur les muscles du bassin; au dos, elle ɔaralyse et ces muscles et ceux de l'abdomen : or, ;omme ces derniers concourent indirectement à la ·espiration, cette fonction commence à devenir gê- ıée. Si la lésion est au-dessus de la région dorsale, a respiration devient encore plus pénible, parce que les intercostaux perdent leur action : seul alors, e diaphragme en continue les phénomènes, parce que le nerf diaphragmatique reçoit et transmet en- core l'influence cérébrale. Mais que la lésion ar- rive au-dessus de l'origine de ce nerf, alors plus d'action du diaphragme, plus de contraction des intercostaux, ni des muscles abdominaux : la res- piration cesse; par là même la circulation s'inter- rompt : le sang n'étant plus porté au cerveau, l'ac- tion de cet organe s'anéantit. Voilà pourquoi les luxations de la première vertèbre sur la seconde sont subitement mortelles, quand le déplacement est très-grand; pourquoi les chirurgiens instruits n'osent quelquefois pas courir les hasards de la ré- duction, quand elles sont incomplètes, de peur de

les rendre complètes, et de voir périr entre leur mains le malade qu'ils veulent secourir ; pourquoi quand on veut assommer un animal, c'est toujour à la partie supérieure et postérieure de l'épin qu'on porte le coup ; pourquoi un stylet enfonc entre la première et la seconde vertèbre tue tou à coup, etc.

On voit surtout très-bien l'influence successiv des diverses parties de la moelle sur les muscles e sur la vie générale, en introduisant une longue tig de fer dans la partie inférieure du canal vertébra d'un animal, d'un cochon d'Inde, par exemple, e en la faisant remonter par ce canal jusque dans l crâne à travers la moelle épinière qu'elle déchire On observe sensiblement, à mesure qu'elle monte, d'abord les convulsions des membres inférieurs, puis celles des muscles abdominaux, puis le trouble de la respiration, puis sa cessation, puis la mort qui en est le résultat.

D'après tous ces faits, on ne peut, je crois, révoquer en doute l'influence de la moelle épinière sur le mouvement, dont elle reçoit du cerveau le principe, qu'elle transmet ensuite aux nerfs. Ces derniers portent sur les muscles ce principe qu'ils ont reçu ou par l'intermède de la moelle, comme dans presque tous ceux du tronc et des membres, ou directement du cerveau, comme dans ceux de la face, de la langue, des yeux, etc. Mêmes preuves pour cette influence nerveuse que pour celle des organes sensitifs précédens. La ligature, la section, la compression d'un nerf paralysent le muscle correspondant : irritez avec un agent quelcon-

ue un nerf mis à découvert sur un animal, aussitôt es contractions convulsives se manifestent dans le uscle. Ces expériences ont été tant et si exactement épétées par une foule d'auteurs, que je crois inutile 'en présenter avec étendue le détail, que le lecteur rouvera partout. L'irritation, continuée quelque emps sur un point du nerf, épuise son influence ur le muscle, celui-ci reste immobile; mais il se ieut de nouveau si on transporte l'irritation sur ne partie plus inférieure du nerf. Si on lie celui-i, le mouvement cesse en irritant au-dessus de la gature; il revient lorsqu'on le détache, ou qu'on irrite au-dessous.

Je remarque que tous les nerfs de la vie animale e paraissent pas aussi susceptibles les uns que les utres de transmettre aux muscles les diverses irra-liations du cerveau. En effet, tandis que, dans les naladies, dans les plaies de tête, dans nos expé-iences, etc., les muscles des membres entrent en convulsion ou sont paralysés avec une extrême fa-cilité, ceux du ventre, du cou, et surtout de la poitrine, ne présentent ces phénomènes que quand es causes d'excitation ou d'affaiblissement sont por-tées au plus haut point. Rien de plus fréquent que le voir le ventre et la poitrine dans leur degré or-dinaire de contraction musculaire, tandis que les membres ou la face sont agités de mouvemens con-vulsifs. Réciproquement, examinez la plupart des hémiplégies : la bouche se tord, le membre supé-rieur et le membre inférieur d'un côté deviennent immobiles, et cependant les mouvemens pectoraux et abdominaux continuent. Ceux du larynx sont plus

faciles à s'interrompre que ceux-ci, dans les paralysies; de là les lésions diverses de la voix. On pourrait faire une échelle de la susceptibilité des muscles pour recevoir l'influence cérébrale, ou de nerfs pour la propager (car il est difficile de déterminer à laquelle de ces deux causes est dû ce phénomène); on pourrait, dis-je, faire une échelle au haut de laquelle on placerait les muscles des membres, puis ceux de la face, puis ceux du larynx, ensuite ceux du bassin et du bas-ventre, enfin les intercostaux et le diaphragme. Ces derniers sont, de tous, ceux qui entrent le plus difficilement en convulsion et en paralysie. Observez combien cette échelle est accommodée à celle des fonctions. Que serait devenue la vie, qui est toujours actuellement liée à l'intégrité de la respiration, si toutes les lésions cérébrales étaient aussi facilement ressenties par le diaphragme et les intercostaux que par les muscles des membres? La paralysie, dans ces derniers, n'ôte à l'animal qu'un moyen de communication avec les objets extérieurs; dans les autres, elle interromprait tout à coup et sa vie interne et sa vie externe.

L'influence nerveuse ne se propage que de la partie supérieure à l'inférieure, et jamais en sens inverse. Coupez un nerf en deux, sa partie inférieure irritée fera contracter les muscles subjacens; on a beau exciter l'autre, elle ne détermine aucune contraction dans les muscles supérieurs; de même la moelle, divisée transversalement et agacée en haut et en bas, ne produit un effet sensible que dans le second sens. Jamais l'influence nerveuse ne

monte pour le mouvement, comme elle le fait pur le sentiment.

Contractilité animale considérée dans les Muscles.

Les muscles, essentiellement destinés à recevoir nfluence cérébrale par le moyen des nerfs, ont cendant une part active à leur contraction propre. faut qu'ils soient dans l'état d'intégrité pour exer- er cette propriété, pour répondre à l'excitation du erveau. Dès qu'une lésion quelconque affecte leur ssu, que ce tissu n'est plus comme à l'ordinaire, muscle reste immobile, ou se meut avec irrégu- rité, quoiqu'il reçoive un influx nerveux régulier. oici diverses circonstances relatives au muscle lui- même qui empêchent ou altèrent ses contractions.

1°. Un muscle enflammé ne se contracte point; sang qui l'infiltre alors et qui pénètre ses fibres, éréthisme où elles se trouvent, l'accroissement e ses forces organiques, ne lui permettent point 'obéir à l'excitation qu'il reçoit. Dans les esqui- ancies, la déglutition est empêchée autant par inaction des muscles que par l'inflammation de la nembrane muqueuse. On sait que l'inflammation e la vessie est une cause de rétention d'urine ; elle du diaphragme rend très-pénible la respira- ion, qu'exécutent presque seuls les intercos- aux, etc., etc. (1)

(1) L'inflammation n'abolit la faculté contractile dans les mus-

2°. Tout ce qui tend à affaiblir, à relâcher tissu musculaire, comme les coups extérieurs, l meurtrissures, les contusions, les infiltrations sérosité dans les membres hydropiques, la diste sion long-temps continuée par une tumeur subj cente, altère, dénature, peut même annihiler contractilité animale.

3°. Toutes les fois que le sang cesse d'abord aux muscles par les artères, ces organes restent im mobiles. Sténon a observé, et j'ai toujours vu qu'en liant l'artère aorte au-dessus de sa bifurc tion en iliaques primitives, la paralysie des mem

---

eles que lorsqu'elle est portée au point de désorganiser l'organ ou bien lorsqu'elle a déterminé un état d'engorgement chroniq de son tissu inter-fibrillaire, engorgement par suite duquel l nerfs moteurs se trouvent eux-mêmes comprimés. Dans tou autre circonstance, le muscle enflammé se contracte même lors qu'il y est excité plus légèrement que de coutume; mais instin tivement nous empêchons autant qu'il est en nous, cette con traction, qui occasione de vives douleurs : on peut citer à l'app de ce que j'avance les phénomènes observés chaque jour da le lumbago, le torticolis, ou la pleurodynie, etc. La vess elle-même ne fait pas exception à cette règle. C'est, en effet, u opinion trop légèrement professée par Bichat, à mon avis a moins, que la cystite détermine toujours la rétention d'urin Je pense, au contraire, que toujours, sauf les cas de gonflemen de la prostate, et d'inflammation spécialement développée ve le col de ce viscère, je pense que la cystite aiguë est la cause l plus commune de la strangurie sans rétention. Une vessie vive ment phlogosée ne peut retenir un instant le fluide urinaire, et presque aussitôt qu'une goutte arrive dans sa cavité par les ure tères, elle se soulève avec douleur, et d'une manière presqu convulsive, jusqu'à ce qu'elle l'ait chassée dans l'urètre ; seu

les inférieurs survient tout à coup (1). On sait que, dans l'opération de l'anévrysme, un engourdissement plus ou moins marqué suit presque toujours la ligature de l'artère. Cet engourdissement dure jusqu'à ce que les collatérales suppléent à l'artère qui n'apporte plus de fluide. Le mouvement intestin né dans le muscle par l'abord du sang est donc une condition essentielle à la contraction musculaire. Ainsi le mouvement habituel imprimé à tous les autres organes, et spécialement au cerveau, entretient-il leur excitation et leur vie.

4°. Non-seulement il faut que, pour obéir à l'influence cérébrale, le muscle reçoive le choc du sang, mais encore du sang rouge, du sang artériel. Le sang noir ne peut, par son contact, entretenir le mouvement. Une faiblesse générale, la chute de l'animal, sont les premiers symptômes de l'asphyxie, maladie dans laquelle ce sang noir pénètre dans tous nos parties. Je ne retracerai pas ici les preuves de cette assertion, que mes recherches sur les diverses espèces de mort me paraissent avoir amplement démontrée. Je renvoie à mon ouvrage sur ce point.

---

ment alors, la contraction cesse, pour recommencer bientôt sous la même influence, et avec les mêmes phénomènes.

(F. Blandin.)

(1) La paralysie est loin d'être complète dans cette expérience que j'ai répétée bien des fois ; mais cela n'infirme en rien la règle dont il est ici question ; c'est parce que le sang passe par les voies collatérales que les muscles continuent à se mouvoir : si la suspension de la circulation pouvait être complète, la paralysie le serait aussi. (Béclard.)

5°. Un fluide différent du sang, l'eau, les fluid huileux, albumineux, etc., à plus forte raison l fluides âcres, irritans, l'urine, les dissolutions d acides, des alcalis, etc., ne sont point propres à en tretenir l'action musculaire; ils la paralysent a contraire. Injectés par les artères crurales dans u animal vivant, en place du sang, qu'on arrête e haut par une ligature, ils affaiblissent, anéanti sent même les mouvemens, comme je m'en su fréquemment convaincu. Le résultat varie dans c expériences, suivant le fluide qu'on emploie po les faire: la rapidité de la cessation des mouveme est plus ou moins marquée: ils sont ou affaiblis, c totalement suspendus; mais il y a toujours ur différence frappante de l'état naturel.

6°. Le contact des différens gaz sur les muscl modifie-t-il leurs contractions? Depuis la publica tion de mon *Traité des Membranes*, je n'ai fait su ce point aucune expérience. Celles qui y sont co signées offrent les résultats suivans: les grenouill et les cochons d'Inde rendus emphysémateux p l'insufflation dans le tissu sous-cutané de l'ai qui pénètre ensuite les interstices cellulaires et met partout en contact avec le système musc laire, se meuvent presque comme à l'ordinair Si on emploie de l'oxygène pour l'insufflation, l mouvemens de l'animal emphysémateux ne so pas plus accélérés: ils ne sont pas diminués si c le souffle avez du gaz acide carbonique, avec l'hydrogène, etc. En général, tous les emphysèm artificiels que j'ai faits sur les deux espèces ind quées, pour avoir un exemple dans chaque clas

es animaux à sang rouge et froid, et de ceux à ng rouge et chaud, réussissent très-bien, ne paissent causer aucune gêne sensible à l'animal, ui en est peu à peu débarrassé. L'emphysème avec gaz nitreux est constamment mortel; le contact e ce gaz semble presque subitement frapper les uscles d'atonie.

7°. Si, au lieu de souffler des gaz dans le tissu ellulaire d'un animal vivant, on y fait passer difrentes substances fluides, elles produisent des ffets différens sur les muscles, suivant leur naire, leur qualité âcre, douce, styptique, etc. Aune injection ne produit un effet plus prompt, lus frappant que celle de l'opium étendu d'eau, u que celle de ses diverses préparations: dès que s muscles en ressentent le contact, leurs mouveens cessent; ils tombent comme en paralysie.

En général, j'observe qu'il vaut infiniment mieux ire les expériences du contact des gaz et des fluies divers sur les muscles, en soufflant les uns, ou n injectant les autres dans le tissu inter-musculaire d'un animal vivant, qu'en arrachant un muscle, et en le plongeant ensuite tout pénétré de vie ans les uns ou les autres, comme ont fait beaucoup d'auteurs; ou bien en mettant un muscle à découvert, pour diriger sur lui le courant d'un az, ou pour l'humecter d'un fluide, afin d'obser-er les phénomènes du contact.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire, ° que, pour répondre à l'excitation cérébrale en e contractant, le muscle doit être en général dans n état déterminé par les lois de son organisation;

que, hors de cet état, il n'est plus susceptible d contraction, ou du moins il n'en exerce que d faibles et d'irrégulières; 2° que le contact d différentes substances étrangères produit sur l muscle un effet très-variable. Au reste, beaucou de causes, autres que celles exposées plus haut, m paraissent encore altérer les contractions, en agi sant directement sur les muscles : tel est l'usage d mercure pris en frictions pour la maladie vén rienne, l'influence de ce métal, du cuivre et d plomb, sur les ouvriers qui y travaillent, l'a tion du froid, celle de certaines fièvres, etc. L tremblement musculaire né de ces différent causes ne paraît point provenir du cerveau; c organe au moins ne donne le plus communémen aucun signe d'affection dans ce cas : cependa j'avoue que, dans ces diverses espèces de trembl mens, il n'est point facile de bien assigner ce q tient à l'affection propre du muscle, d'avec ce q dépend de celle des nerfs; peut-être ceux-ci son ils affectés spécialement, mais certainement le ce veau n'y est pour rien.

Causes qui mettent en jeu la Contractilité animal

Nous venons de voir que, dans l'état nature cette propriété exige constamment trois actions 1° celle du cerveau, 2° celle des nerfs, 3° cel des muscles; que c'est du cerveau que part le prin cipe du mouvement, qui se propage par les nerfs et que les muscles reçoivent. Mais il faut qu'u agent quelconque ébranle le cerveau pour le déte

iner à exercer son influence. En effet, la contrac-
lité animale étant essentiellement intermittente
ans son exercice, chaque fois qu'après s'être exer-
ée elle a été suspendue, il est nécessaire qu'une
ause nouvelle la remette en activité : or, cette cause
git d'abord sur le cerveau dans l'état naturel.

Je rapporte à deux classes les causes qui excitent
cerveau pour produire la contractilité animale.
ans la première est la volonté, dans la seconde
ont toutes les impressions que reçoit cet organe,
qui échappent à l'empire de l'âme.

Le cerveau n'est qu'un intermédiaire à l'âme et
ux nerfs, comme les nerfs le sont aux muscles et
u cerveau : le principe qui veut agit d'abord sur
t organe, lequel réagit ensuite. Quant ils sont
nsi produits, nos mouvemens sont tantôt précis
réguliers; c'est lorsque les fonctions intellec-
elles sont intactes, lorsque la mémoire, l'imagi-
ation, la perception s'exercent pleinement, que
jugement, étant droit, dirige avec régularité les
tes de la volonté : tantôt ils sont irréguliers, bi-
rres; c'est lorsque les fonctions intellectuelles,
oublées, agitées en divers sens, font naître une
olonté bizarre et irrégulière, comme dans les di-
rses aliénations mentales, dans les rêves, dans
délire des fièvres, etc. Mais, dans tous ces cas,
sont toujours des mouvemens volontaires; ils
rtent du principe immatériel qui nous anime.

Dans la seconde classe de causes qui influencent
cerveau, la contractilité animale devient invo-
ntaire; elle s'exerce sans la participation du prin-
pe intellectuel, souvent même contre son gré.

Voyez l'animal dont on irrite artificiellement l
cerveau dans les expériences; il veut se raidir pou
empêcher les contractions, elles arrivent malgr
lui: piquez un nerf dans une opération, le musc
se contracte subitement au-dessous, sans que l'âm
participe à ce mouvement; le malade n'en a pa
même la conscience, il n'a que celle de la douleu
Que beaucoup de sang afflue au cerveau dans
transport des fièvres inflammatoires, cet organe
excité par le fluide, réagit aussitôt sur les muscles
sans que la volonté y soit pour rien. Tous les phé
nomènes de contraction ou de relâchement nés de
accidens divers qui accompagnent les plaies d
tête, les inflammations cérébrales, etc., sont égal
lement involontaires, quoiqu'ayant leur siége dan
des muscles que la volonté dirige habituellemen
Voilà différentes circonstances où l'action d'u
agent quelconque sur le cerveau est directe et im
médiate, où il y a une cause mécanique appliqué
sur cet organe.

Dans d'autres circonstances, le cerveau n'est a
fecté que sympathiquement. Dans une foule d'affe
tions aiguës, ce qu'on appelle *transport au cerveau*
ne vient point de ce que plus de sang s'y porte;
pouls n'est pas plus plein, la face pas plus colorée
souvent même il y a des signes de ralentissemen
dans l'action du système vasculaire. Le cerve
s'affecte, comme tous les autres organes, par *sympa*
thie, mot heureux qui sert de voile à notre igno
rance sur les rapports des organes entre eux :
cerveau s'affecte donc comme le cœur, le foie, et
Soit, par exemple, une péripneumonie, le po

ion est alors l'organe lésé essentiellement; de
ette lésion essentielle et locale en naissent une
oule de sympathiques plus ou moins fortes. Si le
oie est sympathiquement affecté, des symptômes
ilieux se joignent aux symptômes de l'affection
rincipale; si c'est l'estomac, ce sont des sym-
tômes gastriques qui se manifestent. Le cœur est
oujours agité; de là la fièvre. Quand l'influence
ympathique se porte sur le cerveau, il y a trans-
ort, convulsions, etc.; car, comme je l'ai dit,
état des muscles est l'indice de l'état de cet organe:
r, dans cette dernière circonstance, la volonté est
ulle pour la contractilité animale en exercice; le
alade ne pourrait s'empêcher d'agiter convulsive-
ent ses muscles; l'irritation sympathique du cer-
eau est plus forte que l'influence de la volonté.
et exemple d'affection cérébrale dans une péri-
neumonie, quoique plus rare que dans d'autres
ffections, peut nous donner cependant l'idée de
e qui arrive dans tous les autres cas où les muscles
agitent convulsivement par la lésion d'un organe
uelconque, par celle du système fibreux distendu,
es ligamens, des aponévroses spécialement, par le
avail de la dentition, par les douleurs violentes
xées dans les reins, dans les salivaires ou le pan-
réas, à l'occasion d'une pierre, par les lésions du
iaphragme, des nerfs, etc. Dans tous ces cas, il y
un point affecté dans l'économie; de ce point
artent des irradiations sympathiques qui atteig-
nent surtout le cerveau; celui-ci, irrité par elles,
ntre en action, excite les muscles; leur contraction
rive, et la volonté y est étrangère.

Voilà encore comment les passions, qui porten spécialement leur influence sur les organes inté rieurs, qui affectent surtout ceux placés autour d centre épigastrique, le cœur, le foie, l'estomac la rate, etc., impriment à nos mouvemens un impétuosité dont la volonté ne peut plus nous ren dre maîtres. L'organe intérieur affecté réagit su le cerveau, celui-ci excité stimule les muscles; il se contractent, et la volonté est presque nulle pou cette contraction. Voyez l'homme que la jalousie la haine, la fureur agitent au plus haut point tous ses mouvemens se succèdent avec une impé tuosité que le jugement réprouve, mais que l volonté ne peut modérer, tant prédomine sur so influence celle de l'affection sympathique du cer veau. D'autres fois, les passions présentent un phé nomène opposé : elles sont marquées par un a faiblissement général de tous les mouvemens mus culaires. Dans l'étonnement que le chagrin accom pagne, dans celui auquel se mêle une vive joie les bras vous tombent, comme on le dit vulgaire ment; l'influx cérébral cesse presque entièrement et cependant ce n'est pas au cerveau que s'est po tée l'influence de la passion, c'est au centre ép gastrique, comme le prouve le resserrement sub qui s'y est fait sentir. Un des organes épigastr ques a été affecté; il a réagi sur le cerveau; celu ci a été interrompu en partie dans ses fonction les muscles s'en sont ressentis; ils ont cessé la leu Dans la crainte, où ce même phénomène s'observe comme la pâleur du visage indique le ralenti sement du système circulatoire, il peut se fai

ue l'inaction cérébrale et musculaire dépende en
rande partie de ce qu'il ne reçoit point une im-
ulsion suffisante du cœur, sur lequel se porte la
remière influence de la passion, et qui, par cette
ıfluence, est ralenti dans ses mouvemens. La
ainte, dit-on, ôte les jambes, elle pétrifie, etc. :
es expressions empruntées du langage vulgaire,
ıdiquent l'effet de cette passion sur les muscles;
ıais cet effet n'est que secondaire : la première
ıfluence a été portée sur le cœur, la seconde sur
cerveau ; ce n'est qu'en troisième ordre que les
ıuscles s'affectent. Voilà comment certains ani-
ıaux restent immobiles à la vue de celui qui va
saisir d'eux pour en faire sa proie.

C'est encore à l'influence sympathique des or-
ıes internes sur le cerveau qu'on doit attribuer
s mouvemens du fœtus ; mouvemens que la vo-
ıté ne dirige point, car la volonté n'est qu'un
ésultat des phénomènes intellectuels : or, ces phé-
omènes sont encore nuls à cette époque de la vie.
es fonctions intérieures, très-actives alors, sup-
osent une grande action dans le foie, le cœur,
rate, etc. : or, ces organes influencent par là
ficacement le cerveau, et celui-ci met à son tour
s muscles en mouvement. En sorte que la con-
actilité animale n'est aucunement volontaire chez
fœtus : elle ne commence à devenir telle que
irsque les sensations ont mis en jeu les phéno-
ıènes de l'intelligence ; jusque là, il faut les com-
arer à tous ceux dont nous venons de parler plus
aut.

D'après tout ce que je viens de dire, on conce-

vra sans peine, je l'espère, comment la contrac tilité animale peut être ou n'être pas soumise l'influence de la volonté. Dans l'un et l'autre cas la série des phénomènes qu'elle nécessite est tou jours la même ; il y a toujours excitation par le cer veau, transmission par les nerfs, exécution pa les muscles, ou inactivité successive de ces troi organes. La différence n'est que dans la cause qu produit l'excitation cérébrale : or, cette cause peu être, 1° la volonté ; 2° une irritation immédiate ment appliquée ; 3° une irritation sympathique. est essentiel de se former des idées précises et rigou reuses sur cette force vitale qui joue un si gran rôle dans l'économie vivante.

Permanence de la Contractilité animale après l mort.

La différence des causes qui agissent sur le cer veau dans la contractilité animale, pour le déte miner à exciter les muscles, paraît surtout d'un manière remarquable à l'instant de la mort. Quel que soit la manière dont elle arrive, les fonctior intellectuelles sont toujours les premières à cesser c'est même à cela que nous attachons surtout l dée de l'absence de la vie. D'où il suit que le pr mier phénomène de cette absence doit être le d faut de la contraction musculaire soumise à l'i fluence de la volonté, qui est le résultat de c fonctions intellectuelles. Tout reste donc imm bile dans le système musculaire, si aucune aut cause n'agit sur le cerveau ou sur les nerfs ; ma

es deux organes sont, pendant un temps encore ssez long, susceptibles de répondre aux excitaions diverses des irritans. Stimulez d'une manière uelconque le cerveau, la moelle ou les nerfs d'un nimal récemment tué, à l'instant ses muscles se ontractent convulsivement; c'est le même phéomène que celui obtenu de la même cause penant la vie. Souvent même, tout de suite après la nort, ce phénomène est encore plus apparent que endant la vie : je m'en suis très-fréquemment asuré dans mes expériences. Si, pendant la vie, on rrite un nerf quelconque, souvent la contraction est presque nulle, parce que la volonté, agissant ar d'autres nerfs sur le même muscle, ou au noins sur ceux du membre, détermine des conractions opposées à celles que tend à produire l'irritation. J'ai plusieurs fois observé que les phénomènes galvaniques sont aussi infiniment plus faciles à produire un instant après la mort, même sur les animaux à sang rouge et chaud, que pendant la vie : souvent, dans ce dernier cas, on n'en obtient presque aucun résultat, parce que leur influence est contrariée par l'influence cérébrale née de la volonté. Quand l'irritation est directement appliquée sur le cerveau ou sur la partie supérieure de l'épine, alors elle l'emporte sur la volonté, elle est plus forte dans l'animal qui vit; mais sur un nerf isolé, souvent elle a le dessous; non que la volonté agisse par le nerf irrité, dans celui-là son influence s'arrête à l'endroit qu'on stimule; mais elle s'exerce par les nerfs adjacens.

C'est à la susceptibilité du cerveau et des nerfs

pour transmettre encore le principe du mouvemen après la mort, qu'il faut rapporter tous les phéno mènes que nous présentent les divers genres de déco lation. Les canards, les oies, et autres animau de cette famille, meuvent encore assez régulièrc ment leurs muscles volontaires, après que leur têt est séparée, pour courir, sauter, faire diver bonds, etc. Quelque temps après le supplice de l guillotine, les membres inférieurs et les supérieur sont encore le siége de divers frémissemens, le muscles du visage se sont même contractés quel quefois de manière à donner à cette partie l'expres sion de certaines passions, expression faussemen rapportée au principe sensitif resté encore quelqu temps au cerveau. Les mêmes phénomènes s'obser vaient autrefois dans le supplice qui consistai à trancher la tête avec une hache. J'ai eu un preuve douloureuse de ces faits singuliers : un co chon-d'Inde à qui je venais d'enlever le cœur m'enfonça profondément dans un doigt les quatre dents saillantes qui distinguent cette espèce. Tous ces phénomènes ne sont que le résultat de l'irritation produite, soit par l'instrument qui a coupé, soit par l'air, sur les deux extrémités divisées de la moelle : cela est si vrai, qu'en augmentant l'irritation par un instrument piquant ou tranchant, etc., ou par un agent chimique appliqué sur ces extrémités, on augmente beaucoup les mouvemens (1). Rien de

(1) Sans doute la mort doit arriver promptement dans les cas où la tête est brusquement séparée du reste du corps ; mais enfin,

ıus facile que de s'assurer de ce fait sur un ani-
ıal : je l'ai vérifié plusieurs fois sur des guillotinés,
ır lesquels on m'avait autorisé à faire des expé-
ences pour le galvanisme. Voilà encore comment
s mouvemens alternatifs de la respiration peuvent
ontinuer pendant quelques instans, après que le
erveau a été détruit, après une plaie de tête où sa
asse a été écrasée, après une luxation de la pre-
ière vertèbre où le commencement de la moelle
été comprimé au point d'arrêter tout à coup la
e, après l'injection d'un fluide très-irritant par
carotide, etc., etc.

Dans cette permanence de contractilité animale
près la mort, les muscles sont absolument passifs ;
s obéissent, comme pendant la vie, à l'impulsion

ı conçoit pourtant qu'alors le cerveau, placé hors de l'at-
inte immédiate des instrumens vulnérans, doit un instant
onserver son influence sur les parties encore attenantes
la tête, et avec lesquelles il communique par des nerfs.
'expression faciale de quelques suppliciés doit, en partie, dé-
endre de cette cause, et être rapportée au principe sensitif.
uant au cochon-d'Inde qui enfonça si douloureusement ses
ents incisives dans le doigt de Bichat, après avoir souffert l'a-
lation du cœur, il me semble incontestable qu'il le fit par un
notif de représailles ; dans ce cas, en effet, le principe sensitif
st bien plus promptement aboli que dans le premier. Il ne faut
as confondre ces mouvemens avec ceux des membres et du tronc
près la décapitation : il y a entre eux une énorme différence.
es derniers sont nécessairement, comme le fait remarquer Bi-
hat, hors de l'influence cérébrale, puisque les parties qui en
ont le siége sont séparées de cet organe ; les premiers, au con-
raire, me paraissent lui devoir être rapportés. (F. Blandin.)

qu'ils reçoivent des nerfs : c'est ce qui la distingu essentiellement de la permanence de l'irritabilité propriété par laquelle, après la mort comme pe dant la vie, le muscle a en lui le principe qui l fait mouvoir.

La permanence est plus ou moins durable su vant la classe des animaux : ceux à sang rouge e froid gardent plus long-temps cette propriété qu ceux à sang rouge et chaud ; parmi ceux-ci, les o seaux de la famille des canards sont, comme je l'a dit, remarquables par ce phénomène, qui est bie plus rapidement éteint dans les autres et dans le quadrupèdes. Dans la première classe, il y a aus des variétés parmi les reptiles, les poissons, etc.

En général, j'ai constamment observé que la co tractilité animale cesse, après la mort, d'abord pa le cerveau, puis par la moelle, et enfin par le nerfs. Déjà les muscles ne se meuvent plus en irr tant le premier de ces organes, qu'ils entrent en core en contraction en agaçant les autres. Les nerf irrités peuvent encore communiquer un mouvement que déjà la moelle ne présente plus ce phénomène Je n'ai pas observé que la partie supérieure d nerf fût plus prompte à cesser de transmettre l mouvement, que la partie inférieure. Mais ce qu'i y a de remarquable, c'est que certains nerfs, sou l'influence de la même irritation, font plus forte ment contracter leurs muscles que d'autres : tel est par exemple, le diaphragmatique. Déjà tous les mus cles cessent d'être mobiles par l'excitation artifi cielle de leurs nerfs, que le diaphragme se meut encore par ce moyen. Tandis que les expériences

inguissent ailleurs, elles sont dans toute leur force ur ce muscle; ce qui est d'autant plus frappant, ue pendant la vie c'est précisément lui qui se essent le moins de l'état du cerveau et de la noelle : la paralysie et les convulsions ne le frapent presque jamais, comme nous avons vu.

Au reste, en comparant ainsi la permanence de la ontractilité animale, il faut toujours se servir du même irritant; car, suivant ceux qu'on emploie, es effets sont plus ou moins marqués. Déjà tout le erveau et les nerfs ne sont plus sensibles aux agens nécaniques ni chimiques, qu'ils obéissent encore vec une force extrême aux impulsions galvaniques. L'irritation des métaux est, de toutes, celle qui usqu'à présent offre le moyen le plus efficace de aire durer la contractilité animale pendant quelque emps après la mort (1).

---

(1) Nysten a établi une table des organes musculaires, d'après l'ordre dans lequel ils perdent leur faculté contractile après la mort. Il résulte, en effet, des recherches de cet habile expérimentateur, que d'abord on voit cesser cette propriété dans le ventricule aortique du cœur, puis ensuite, et successivement, dans le gros intestin, l'intestin grêle et l'estomac, la vessie urinaire, le ventricule pulmonaire, l'œsophage, l'iris, les muscles de la vie animale, l'oreillette gauche et l'oreillette droite. (Voy. ses *Recherches de physiologie et de chimie pathologiques*, 1 vol. in-8°.)

(F. Blandin.)

Propriétés organiques.

La sensibilité organique est le partage manifest des muscles qui nous occupent : sans cesse mise e jeu chez eux par la nutrition, l'absorption et l'ex halation, elle y devient encore plus apparente lors qu'on porte un point d'irritation sur les muscle mis à découvert; ils ressentent cette irritation, e la motilité dont nous allons parler est un résulta de ce sentiment, qui se concentre dans le muscle et qui ne se rapporte point au cerveau.

La contractilité organique insensible est l'attri but de ce système musculaire, comme de tous le autres.

La contractilité organique sensible y est évi dente. Si on met un muscle à découvert sur u animal vivant, et qu'on l'irrite avec un agent quel conque, il se crispe, se resserre, s'agite. Une por tion musculaire détachée présente pendant quel ques instans le même phénomène.

Tout est excitant pour les muscles mis à nu, l'air, l'eau, les sels neutres, les acides, les alcalis, les terres, les métaux, les substances animales, végétales, etc. Le simple contact suffit pour déterminer la contraction. Cependant, outre ce contact, il y a encore quelque chose qui dépend de la nature des excitans, et qui fait varier l'intensité des contractions. Une poudre de bois, de charbon, de métal, etc., répandue sur les muscles d'une grenouille, n'y détermine que de légers mouvemens; versez-y un sel neutre en poudre, le sel marin, par exem-

e, aussitôt des agitations irrégulières, mille oscil-
tions diverses s'y manifestent. Chaque corps est,
ar sa nature, susceptible d'irriter différemment
s muscles, comme, suivant les individus, les âges,
s tempéramens, les saisons, les climats, etc., les
uscles sont susceptibles de répondre différemment
ux excitations déterminées sur eux.

Il n'est pas besoin d'irriter la totalité du muscle
our obtenir sa contraction : deux ou trois fibres
ulement piquées mettent en action toutes les au-
es; souvent même, lorsqu'on fait ces expériences
r un animal vivant, la contraction se commu-
que d'un muscle à l'autre. En général, j'ai con-
amment remarqué que, pendant la vie, ces expé-
ences sont moins faciles, et donnent des résul-
ts beaucoup plus variables, ainsi que nous l'a-
ons déjà indiqué pour la contractilité animale.
ettez un muscle à découvert, irritez-le à plu-
eurs reprises; tantôt il ne donne pas le moindre
gne de contractilité, tantôt il se meut avec force :
la varie d'un instant à l'autre. Au lieu que, si
est sur un animal récemment tué que se font les
xpériences, les résultats sont toujours à peu près
s mêmes dans un temps donné, aux différences
rès cependant de l'affaiblissement que subissent
s contractions à mesure qu'on s'éloigne de l'ins-
nt de la mort. Jamais il n'arrive de voir le muscle
bstinément immobile sous les excitans, comme
la n'est pas rare dans un animal qui vit. Cette
fférence essentielle, que les auteurs n'ont point
ssez indiquée et que j'ai fréquemment vérifiée sur
ivers animaux, dépend de ce que, pendant la vie,

les effets de l'influence nerveuse contrarient ce des excitans. Par exemple, si l'animal étend av force sa cuisse par les muscles postérieurs, on beau irriter les antérieurs mis à nu, on ne pe déterminer la flexion par cette irritation : l'ex tation cérébrale dans les extenseurs étant pl forte que l'excitation mécanique dans les fléchi seurs, elle l'emporte. Souvent, pendant qu'on a plique le stimulant, le cerveau agit avec force s le muscle, et l'effet qu'on obtient est alors bi supérieur à l'excitation qu'on détermine. On est étonné ; mais l'étonnement cesse si on a éga au concours des deux excitations, de celle de l' gent externe et de celle du cerveau. En génér ceux qui ont fait des expériences n'ont point f assez d'attention à ce concours des deux forces s un animal vivant.

Pour bien estimer la contractilité organique se sible, il faut rendre nulle l'animale. Tant que l'u et l'autre se heurtent, se choquent, se contre-b lancent, on ne peut bien les apprécier, discern ce qui appartient à chacune, et ce qui leur e commun. Or, on rend nulle la contractilité anima sur le vivant, en coupant tous les nerfs d'un musc ou d'un membre, qui deviennent alors paralysés. I cerveau ne peut plus agir sur eux, et tout ce qu' obtient de résultats par les stimulans appartient la contractilité organique sensible.

La permanence de cette dernière propriété, apr l'expérience que j'indique, prouve bien que les ner lui sont absolument étrangers, qu'elle réside esse tiellement dans le tissu musculaire, qu'elle lui e

ıhérente, comme le disait Haller. Aussi, tandis ue, dans les paralysies diverses, les muscles per- ent la faculté d'obéir à l'influence cérébrale, o lutôt que cette influence devient nulle, ils con- ervent celle de se contracter sous les stimulans 'une manière sensible (1).

---

(1) Quand tous les nerfs d'un muscle sont coupés, ce muscle e conserve qu'un certain temps la faculté d'obéir à l'action des imulans : bientôt la contractilité s'épuise et ne reparaît plus. u contraire, lorsque la communication est libre avec les centres erveux, l'irritabilité diminue bien de même à mesure qu'on la ıet en exercice, et finit, comme dans le cas précédent, par isparaître entièrement; mais, si on laisse reposer l'animal, elle reproduit de nouveau. Il semblerait, d'après cela, que cette ropriété n'est point inhérente au muscle, mais qu'elle est entière- ıent soumise à l'influence nerveuse. La permanence, d'ailleurs eu durable, de l'irritabilité après la section des nerfs pourrait fort ien dépendre de l'influence de ces nerfs au-dessous de la section ; ıfluence qui doit peu persister, n'étant pas renouvelée, par le éfaut de communication avec les centres nerveux. D'après cette lée, qui est celle de Platner, de Legallois, etc., les muscles e feraient que mettre en action un principe qui leur serait ap- orté par les nerfs ; ceux-ci auraient un double rôle dans la con- actilité du tissu musculaire : 1° ils entretiendraient ce tissu ans un état d'excitabilité habituelle pour la contractilité orga- ique sensible; 2° ils transmettraient l'excitation dans certaines ırconstances, comme dans la volonté, pour la contractilité ani- ıale. Les muscles seraient au système nerveux ce que sont les ens à ce système, des parties dont l'action est intimement liée la sienne, et devient nulle sans lui. Et en effet cette action, ans les premiers comme dans les seconds, s'épuise, se perd et répare à peu près de la même manière. Le sommeil, le repos, s alimens, rétablissent l'énergie musculaire affaiblie par un long xercice, comme ils rendent aux sens la leur détruite par la même

Cette contraction des muscles de la vie animale p les stimulans se présente sous deux modes très-di férens. 1°. La totalité du muscle peut se contracte et se raccourcir de manière à rapprocher l'un d l'autre les deux points d'insertion. Cela arrive, e général, quand la mort est récente, quand le mu cle est encore tout pénétré de sa vie. 2°. Ce so souvent des oscillations multipliées des fibres; tout

---

cause. Nous venons de voir que cela ne paraît pas s'appliqu seulement à la contractilité animale, mais encore à la contract lité organique sensible, ou irritabilité proprement dite.

Au reste, il s'en faut de beaucoup que tous les physiologist soient d'accord là-dessus. Un grand nombre ont suivi l'opini de Haller, et n'attribuent aux nerfs d'autre usage, dans la co tractilité, que de conduire l'excitant quand il vient du cerve Ils se fondent sur ce que, 1° Tourdes a reconnu des mouveme dans la fibrine pure; 2° les végétaux et les zoophytes se co tractent, quoiqu'ils soient manifestement dépourvus de nerf 3° la contractilité est mise en jeu dans les muscles par des exc tans qui leur sont directement appliqués. Mais, 1° en admetta l'expérience de Tourdes, que personne n'a vérifiée depuis, s résultats sont bien différens de ceux de la contractilité musc laire; 2° les végétaux et les animaux sans nerfs sont aussi sa muscles, ainsi leur contraction n'a rien de commun avec celle ces derniers; 3° le dernier argument se trouve en partie com battu par toutes les raisons alléguées plus haut en faveur de l'o pinion opposée. Cependant la question est fort difficile à résoud d'une manière absolue. On trouve dans Meckel une sorte d'op nion mixte, qui est peut-être la plus exacte. Selon cet auteur l'influence nerveuse est bien une des conditions nécessaires à contraction, mais elle n'agit pas autrement que le sang qu'a portent les artères, étant comme celui-ci indispensable à la v du muscle, qui n'en possède pas moins son irritabilité en propr

(Béclard.)

snt en action simultanée : or, cette action n'est pint une contraction, mais une véritable vibration u trémoussement, lequel n'a point un effet sensible sr la totalité du muscle, qui, ne se contractant point, r saurait rapprocher ses points mobiles. Lorsque l vie est près d'abandonner totalement le muscle, c st comme cela qu'il se meut. La diversité des excitns donne lieu également à ce double mode de contiction : promenez un scalpel sur un muscle bien vvant, c'est une contraction de totalité qui en résilte ; saupoudrez ensuite le même muscle d'un sel nutre, quelquefois il y a contraction analogue, mais suvent ce ne sont que des oscillations, des vibrations semblables à celles d'un muscle que la vie abandonne.

Pendant la vie de l'animal, sa contractilité organique sensible est rarement en action, parce que les muscles n'ont point d'agens qui agissent sur eux, dune manière sensible au moins. Pourquoi donc ctte propriété y est-elle si développée ? Je ne puis le déterminer.

Tous les muscles ne la possèdent pas au même dgré : le diaphragme et les intercostaux sont les plus irritables ; ils sont aussi ceux dont la contractité organique est la plus permanente après la mort. Remarquez que ceci contraste, comme leur susceptibilité pour recevoir l'influence nerveuse par lrritation de leurs nerfs, surtout du diaphragmatique, avec le peu de disposition qu'ils ont à se ressentir pendant la vie des convulsions ou de la paralysie. Après eux, je crois que le crotaphyte, le masseter, le buccinateur, etc., sont les plus irri-

tables. Certainement, il y a, sous le rapport l'irritation, une grande différence entre eux et muscles des membres, qui sont tous à peu p également susceptibles de répondre aux excitatio Au reste, ce n'est que sur un grand nombre d' périences qu'on peut établir des données général car rien n'est plus fréquent que de trouver des iné lités entre deux muscles analogues, et même en les correspondans des deux moitiés du corps (1)

(1) Lorsque la vie a cessé dans les muscles, il se manifeste état de raideur générale plus ou moins apparent et dont la naissance est fort importante. Nysten, en effet, a prouvé cette raideur cadavérique à laquelle paraissent au premier al participer tous les organes, et dont les muscles sont cepen le siége exclusif, est le signe le plus certain de la mort réelle. reste, ses recherches ont donné les résultats suivans :

1°. L'homme, les animaux vertébrés, et parmi les inv tébrés, ceux qui ont un système musculaire distinct, devien raides après la mort :

2°. Dans l'homme, la force et la durée de cette rai sont en raison directe du développement des muscles au mon de la mort :

3°. Ce phénomène s'observe d'autant plus prompten après la mort que la nutrition musculaire est plus épuis comme après les maladies chroniques; et d'autant plus tard cette nutrition est moins active, comme après les maladies guës et les morts violentes. Ainsi, plus le développement d raideur est prompt, moins elle devient forte, et moins elle p sisté.

4°. Ni la paralysie, ni la destruction de la moelle épin n'empêchent la raideur cadavérique de se développer et d'acqu la force dont elle est susceptible.

5°. Dans les mammifères et les oiseaux, le moment où la deur commence est celui où la chaleur vitale paraît s'éteindre

Sympathies.

Le système musculaire animal joue un rôle très-
nportant dans les sympathies. On le voit très-fré-
uemment agité de mouvemens irréguliers dans les
fections diverses de nos organes, surtout chez
enfant, où toute impression un peu vive portée
ur un organe quelconque est presque toujours
uivie de mouvemens spasmodiques et convulsifs
ans les muscles de la vie animale. Remarquez, en
fet, que c'est la propriété vitale prédominante
ans ce système, c'est-à-dire, la contractilité ani-
ale, qui y est le plus souvent mise en jeu sympa-
hiquement, par les influences que les organes
xercent les uns sur les autres.

à les stimulans artificiels n'ont plus ou presque plus d'action
ensible sur la contractilité.

6°. Les muscles sont le siége exclusif de la raideur cadavérique.

7°. Ce phénomène, étranger aux propriétés physiques de ces
rganes, dépend entièrement de la contractilité vitale, à la vérité
rès-affaiblie, mais suffisante pour résister quelque temps à la
issolution des élémens du corps.

8°. La raideur cadavérique ne saurait être confondue avec
elle que l'on observe quelquefois pendant la vie; et, comme
lle a lieu constamment, ellè devient par cela même le signe le
lus certain de la mort.

9°. Si, dans un cas douteux, le corps était mou, on mettrait
découvert une portion du muscle, et on l'exciterait à l'aide
u galvanisme : son défaut de sensibilité à l'influence de cet
gent autoriserait à prononcer que la vie est éteinte.

(F. Blandin.)

En général, il paraît que, lorsque la sensibili animale se développe fortement dans un organ ce système tend aussitôt à se contracter. Les do leurs vives que déterminent les pierres dans l reins, dans l'uretère, dans l'urètre même, les di tensions des ligamens, des aponévroses, la dent tion, les opérations chirurgicales où le malade beaucoup souffert, etc., donnent lieu à des co vulsions sympathiques très-nombreuses et très-fr quentes. Je sais bien qu'il y a des douleurs très-viv sans mouvemens convulsifs sympathiques; mais est assez rare que vous observiez des mouveme convulsifs de cette nature, sans que l'organe d'o partent les irradiations sympathiques ne soit trè vivement affecté, ne soit le siége d'une sensibili animale très-développée.

Remarquez, au contraire, que la plupart des syn pathies qui développent très-fortement dans u partie la contractilité organique insensible, ou contractilité organique sensible, ne sont poi marquées par ces douleurs vives dans l'organe a fecté d'où part l'excitation : par exemple, les sueur les sécrétions sympathiques, les contractions i testinales et gastriques, sont rarement produit par des affections qui portent le caractère d celles d'où naissent les sympathies de contractili animale.

Le cerveau est toujours préliminairement affect dans cette dernière espèce de sympathies, où le muscles sont, pour ainsi dire, passifs, comme déj nous l'avons vu, et où ils ne font qu'obéir à l'impul sion qu'ils reçoivent. L'organe affecté agit d'abor

ır le cerveau, puis celui-ci réagit sur les muscles.

Les auteurs ont considéré les sympathies d'une ıanière trop vague. Les uns ont admis, les autres nt rejeté l'intermédiaire du cerveau; quelques-uns 'ont point prononcé. Tous seraient d'accord si, u lieu de vouloir résoudre la question d'une ma-ière générale, ils avaient distingué les sympathies omme les forces vitales, dont elles ne sont que es aberrations, des développemens irréguliers. Ils uraient vu que, dans les sympathies animales de ontractilité, l'action cérébrale est essentielle; car ın ne conçoit aucune contractilité de cette espèce, ans la double influence cérébrale et nerveuse sur es muscles; qu'au contraire, dans les sympathies rganiques de contractilité, l'action du cerveau st nulle; l'organe affecté agit directement et sans ntermédiaire sur celui qui se contracte sympathi-quement. Quand le cœur, l'estomac, les intes-ins, etc., se meuvent, quand la glande parotide et es autres augmentent leur action par l'influence sympathique d'un organe affecté, certainement cet rgane n'agit point préliminairement sur le cer-veau; car il faudrait alors que celui-ci réagît sur ceux qui se contractent : or, il ne pourrait les in-fluencer que par les nerfs, puisque ce n'est que par eux qu'il leur est uni; mais toutes les expé-riences, tous les faits prouvent, comme nous le verrons, que le cerveau n'a, par ce moyen, aucune influence sur les organes à mouvemens involon-taires : donc l'action est directe, donc il n'y a point d'intermédiaire. Il en est des mouvemens sympathiques comme des naturels : les contracti-

lités insensible et sensible sont constamment mise en jeu dans ceux-ci par un stimulus direct appliqué sur l'organe, tandis que la contractilité animale n'entre jamais en exercice que par le stimulant cérébral, qui lui-même exige une cause, soit sympathique, soit directe, pour agir sur les muscles.

Après la contractilité animale, c'est la sensibilité de même nature qui est le plus souvent mise en jeu sympathiquement dans le système musculaire animal. Les lassitudes, les douleurs vagues, le sentiment de pesanteur, les tiraillemens qu'on éprouve dans les membres, au début d'une foule de maladies, sont des phénomènes purement sympathiques, où cette propriété entre en action dans les muscles. Aux périodes avancées de plusieurs autres affections, ces troubles sympathiques sont aussi très-remarquables, mais moins qu'au début.

Les propriétés organiques sont, en général, rarement en action sympathiquement dans l'espèce de muscles qui nous occupe. Au reste, si elles le sont, nous ne pouvons guère en juger, parce qu'aucun signe ne nous l'indique. La sueur dans la peau, les fluides sécrétés dans les glandes, les fluides exhalés sur beaucoup de surfaces, sont des résultats généraux qui nous indiquent les troubles sympathiques de la sensibilité organique et de la contractilité insensible de même espèce : dans les muscles, nous n'avons point le même moyen de connaître ces altérations.

Caractère des Propriétés vitales.

D'après ce que nous avons dit jusqu'ici sur les propriétés et sur les sympathies musculaires, on conçoit facilement que l'activité vitale doit être, en général, beaucoup plus grande dans les muscles que dans les organes précédemment examinés dans ce volume : aussi toutes leurs affections commencent-elles à prendre un caractère particulier qui les distingue de celles de ces organes; elles sont beaucoup plus promptes, plus rapides. Cependant remarquons que toutes les altérations de fonctions qu'ils nous présentent ne doivent pas servir à nous faire estimer cette activité vitale. En effet, plusieurs de ces altérations ne résident point essentiellement dans le tissu musculaire, n'y ont point leur cause : tels sont, par exemple, tous les mouvemens convulsifs, où comme nous avons vu, les muscles agissent en obéissant, mais n'ont point en eux le principe d'action. Ils sont alors les indices des altérations cérébrales : ainsi les artères, qui nous présentent de si nombreuses variétés dans l'état du pouls, ne sont-elles, pour ainsi dire, que passives, ne servent-elles le plus souvent qu'à nous indiquer l'état du cœur par leur mouvement; tandis que les veines, qui n'ont point à l'origine de leur circulation un agent d'impulsion analogue, ne présentent que des variétés très-rares, quoique cependant leur tissu soit pénétré d'autant de forces vitales, quoiqu'il vive aussi et peut-être plus activement que celui des artères.

Une preuve que le tissu même des muscles e moins souvent altéré qu'il ne le semble d'abord e considérant la fréquence des affections de ces or ganes, c'est la rareté de leurs lésions organique Ces lésions y sont même moins communes que dar les os. On n'y voit point de ces squirrhes, de ces er gorgemens, de ces changemens de texture, en u mot, qu'il est si ordinaire de rencontrer dans le autres organes. Parmi le grand nombre de sujet que j'ai eu occasion de disséquer ou de faire diss quer, je ne me rappelle point avoir vu dans le muscles de la vie animale d'autres altérations qu celles de leur cohésion, de leur densité, de leu couleur. C'est un phénomène qui les rapproche d ceux de la vie organique, où l'on rencontre rare ment des changemens de tissu, comme le cœur l'estomac, etc., en offrent des exemples.

Le tissu musculaire de la vie animale suppur rarement : aussi connaît-on très-peu son mode d suppuration. En général, il paraît que l'inflamma tion s'y termine presque toujours par résolution L'induration, la gangrène et la suppuration, tripl issue que cette affection présente souvent dans le autres parties, sont étrangères à celle-ci dans l plus grand nombre de cas.

ARTICLE IV.

PHÉNOMÈNES DE L'ACTION DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la motilité musculaire, abstraction faite des phénomènes qu'elle présente dans les muscles, lorsqu'elle y est en exercice. Ces phénomènes vont à présent nous occuper. Ils sont spécialement relatifs à la contraction, qui est l'état essentiellement actif du muscle, le relâchement étant toujours un état purement passif. Nous concevrons facilement les phénomènes de celui-ci, lorsque ceux de l'autre, dont ils sont l'inverse, nous seront connus.

§ Ier. *Force de la Contraction musculaire.*

La force de la contraction des muscles de la vie animale varie beaucoup, suivant qu'elle est mise en jeu par les irritans ou par l'action cérébrale.

Tout irritant porté sur un muscle mis à découvert ne détermine qu'un mouvement brusque, rapide, mais en général peu énergique. Je me suis fréquemment convaincu, dans mes expériences, qu'il est impossible d'approcher, même de très-loin, par ce moyen, de l'extrême énergie que communique le cerveau aux muscles de la vie animale. Le système musculaire organique, que les excitans immédiatement appliqués mettent principalement en

mouvement, n'a jamais des exacerbations de forc correspondantes à celles que la contractilité an male nous présente à un si haut point en certaines ci constances. C'est donc spécialement quand les mu cles se meuvent en vertu de cette dernière propriété qu'il faut considérer la force de leur contractio Or, cette contraction peut, comme nous avons vu être déterminée, 1° en agaçant le cerveau dans le expériences, 2° lorsque son excitation a lieu, dan l'état naturel, par la volonté ou par sympathie. Dan le premier cas, la force de contraction n'est jama très-énergique, quel que soit l'excitant que l'o emploie, soit sur le cerveau, soit sur les nerfs m à découvert. J'ai constamment observé un mouve ment convulsif très-rapide, assez analogue à celu qu'on obtient en excitant les muscles eux-mêmes mais jamais aussi fort que celui qui est le résulta de l'action vitale. Malgré ce qu'ont écrit certain physiologistes, jamais, en irritant les nerfs de fléchisseurs, on ne peut imprimer à ceux-ci un énergie d'action comparable à celle que la volont peut leur donner. Irritez, par exemple, le ner sciatique dans un membre inférieur qui vient d'êtr amputé, jamais les orteils ne se fléchiront avec l force qu'ils offrent en certains cas dans l'état natu rel. J'ai fait deux fois cette expérience dans le amputations pratiquées par Desault : étranger en core à la physiologie, j'avais été vivement frapp de ce phénomène.

Dans l'excitation cérébrale et dans celle de l moelle, on ne peut aussi bien apprécier la forc des contractions qui en résultent, que quand o

gace un nerf isolé : en effet, tout le système entrant alors en action convulsive, les extenseurs détruisent en partie l'effort des fléchisseurs, et réciproquement; les muscles simultanément en action, se contre-balancent, se heurtent et se nuisent. L'excitant qui imprime le plus de force aux contractions m'a toujours paru être le galvanisme.

Dans l'état de vie, la force de contraction musculaire dépend de deux causes : 1° du muscle, 2° du cerveau. Ces deux causes sont en proportion variable; il faut les considérer isolément.

Sous une influence cérébrale égale, le muscle bien nourri, qui se dessine avec énergie à travers les tégumens, qui a des formes très-prononcées parce que ses fibres sont très-grosses, se contracera bien plus fortement que celui qui est grêle, mince, à fibres lâches, pâles, peu prononcées, et qui ne fait sous les tégumens qu'une saillie légère. Dans notre manière ordinaire de concevoir la force musculaire, c'est à cet état du muscle que nous nous arrêtons surtout. Les statues qui nous peignent la force et la vigueur ont toujours pour attribut le développement énergique des formes musculaires. Quand le cerveau agit sur ces muscles-là avec énergie, ils sont susceptibles de mouvemens extraordinaires. Je ne rapporterai point d'exemples des efforts étonnans dont ils sont alors susceptibles : Haller et d'autres en ont cité une foule, soit dans les muscles du dos pour porter des fardeaux, soit dans les muscles des membres supérieurs pour lever des poids considérables, soit dans ceux des membres inférieurs pour faire des sauts, pour con-

server des attitudes qui supposent d'énormes résis tances à surmonter.

C'est surtout l'influence cérébrale qui augment beaucoup la force de contraction musculaire. L volonté peut élever très-haut cette force; mais le différentes excitations qui lui sont étrangères l'exal tent infiniment plus. On connaît la force qu'ac quiert un homme en colère, celle des maniaques celle des individus dans le transport cérébral d'un fièvre essentielle, etc. Dans tous ces cas, l'impul sion communiquée par le cerveau est telle quelqu fois que les muscles les plus grêles de la femme l plus faible surpassent en énergie ceux de l'homm le plus vigoureux considéré dans l'état ordinaire.

La force de contraction musculaire est donc en raison composée et de la force d'organisation du tissu des muscles et de la force d'excitation céré brale. Si toutes deux sont peu marquées, les mou vemens sont presque nuls; si toutes deux sont au plus haut point, il est difficile de concevoir jus qu'où peuvent aller les effets qui en résultent : un maniaque à muscles épais et prononcés est capabl d'efforts que vainement on essaierait de calculer Si la force nerveuse est très-énergique, et le tissu musculaire peu prononcé, ou que l'état inverse s remarque, les phénomènes de contraction son moindres. En général, la nature a presque toujour réuni ces deux choses de cette dernière manière Les femmes et les enfans, que caractérise la fai blesse du tissu charnu, ont une motilité nerveus très-grande; les hommes, au contraire, ceux sur-tout à formes athlétiques, moins faciles à s'émou-

oir dans leur système nerveux, en reçoivent des auses plus rares d'une forte influence sur leurs uscles.

Quel que soit le point de vue sous lequel nous onsidérions la force des contractions du système usculaire de la vie animale, elle est toujours exêmement considérable, à proportion de l'effet qui sulte de ces contractions. La nature, dans l'écoomie, suit une loi inverse de celle du mouvement e nos machines ordinaires, dont le grand avange est d'augmenter beaucoup les puissances moices, de produire un grand effet avec peu de force. i il y a toujours grand déploiement de forces pour eu d'effet, ce qui tient aux causes nombreuses ndant à détruire l'effet de ces forces. 1°. Les uscles agissent presque toujours sur un levier ès-défavorable, sur celui où la puissance qu'ils éprésentent est plus près du point d'appui que la ésistance. 2°. Tous ont à vaincre, en se contractant, résistance des antagonistes. 3°. Comme, dans aque mouvement, il y a toujours un point fixe, effort qui, d'après la contraction, se porte sur ce oint fixe est perdu entièrement. 4°. Les frotteens divers nuisent aussi au mouvement. 5°. L'oliquité de l'insertion des muscles sur les os, obliuité bien plus voisine en général de la direction orizontale que de la perpendiculaire, l'obliquité on moins remarquable des attaches charnues sur e tendon ou l'aponévrose, offrent une double cause 'affaiblissement. Toutes ces raisons et plusieurs utres qu'on pourrait y ajouter avec Borelli, qui a té le premier à faire ces remarques importantes

sur le mouvement musculaire, prouvent que la fo
absolue ou réelle des muscles est infiniment su
rieure à leur force effective. Cependant tous ne sc
pas aussi favorablement disposés : dans les u
comme au soléaire, l'insertion est perpendicula
à l'os; dans d'autres, comme aux muscles qui ag
sent sur la tête, on observe qu'ils sont puissan
d'un levier du premier genre. En général, po
estimer la force d'un muscle isolé, du deltoïde, p
exemple, il faut surtout avoir égard à la distance
son insertion au point d'appui, au degré d'ouv
ture des angles formés par les fibres charnues s
le tendon, et ensuite par le tendon sur l'os,
partage des forces entre le point fixe et le poi
mobile.

Quelques avantages semblent compenser légè
ment, dans certains muscles, leur disposition p
propre à la force du mouvement : tels sont, 1° l
sésamoïdes, la rotule, les éminences diverses d'i
sertion, le gonflement des os longs à leurs extr
mités, etc., qui éloignent les fibres des points m
biles; 2° la graisse inter-musculaire, celle qui e
aux environs des muscles, le fluide des gaînes s
noviales, qui facilitent les mouvemens en lub
fiant les surfaces qui les exécutent ; 3° les toil
aponévrotiques qui répercutent les mouveme
sur les membres; 4° ces mouvemens eux-même
ceux de flexion, par exemple, qui, à mesure qu'i
ont lieu, diminuent l'obliquité de l'insertion des fl
chisseurs, la rendent même perpendiculaire, comn
l'a très-bien observé un auteur moderne.

On a fait beaucoup de calculs sur le déchet d

uvement musculaire, sur l'effort d'un muscle qi se contracte, comparé à l'effet qui en résulte. n'ont jamais pu être précis, parce que les forc vitales varient à l'infini, qu'elles ne sont point mêmes dans deux individus, que l'influence cébrale et la force d'organisation musculaire ne nt jamais en proportion constante dans le même et. C'est le propre des phénomène svitaux d'écapper à tous les calculs, et de présenter, comme forces dont ils émanent, un caractère d'irréglarité qui les distingue essentiellement des phémènes physiques. Concluons seulement des obvations précédentes, que l'effort musculaire rté au plus haut point par l'excitation cérébrale ut produire des effets étonnans, et qui supposent e force de contraction qu'à peine nous concevons: le est la rupture des forts tendons, de la rotule, l'olécrâne, etc.; telle est encore la résistance uvent opposée par les muscles aux énormes distnsions qu'on emploie pour les luxations, pour s fractures, etc.

§ II. *Vitesse des Contractions.*

Les contractions doivent être considérées sous le pport de leur vitesse comme sous celui de leur rce.

1°. Si c'est par les stimulans qu'elles sont proites, en mettant un muscle à découvert et en agisnt directement sur lui, elles varient suivant l'état vitalité du muscle, et suivant le corps qui stiule. Dans les premiers momens de l'expérience,

elles se succèdent avec rapidité, s'enchaînent que quefois avec une vitesse que l'œil peut suivre di ficilement. A mesure que le muscle languit, s contractions deviennent moins promptes; elles ce sent au bout d'un certain temps. On les ranime e employant un stimulant très-actif; les fibres fini sent enfin par y être aussi insensibles.

2°. Si c'est en irritant le nerf que l'on fait co tracter un muscle volontaire, on détermine ur vitesse de contraction plus grande encore qu'e agaçant le muscle lui-même. La course serait d'ur rapidité presque incommensurable, si chaque co traction qu'elle nécessite était égale à celle qu'o obtient alors, surtout lorsqu'on agit d'une pa sur des animaux très-vivaces, d'une autre part avec des stimulans très-actifs, avec le galvanisme par exemple. J'ai fait à cet égard une remarque c'est que ni la vitesse ni la force des contractions n sont communément plus augmentées si on ir rite en même temps tous les nerfs qui vont à u muscle, que si on n'en agace qu'un seul.

3°. Quand c'est la volonté qui règle la vitess des contractions musculaires, cette vitesse a de degrés infiniment variables; mais toujours il en es un au-delà duquel on ne peut aller (1). Ce degr

(1) Cette vitesse est, en général, très-grande; elle devie surtout sensible dans l'action de jouer de divers instrumens : c a trouvé qu'il y avait, en général, une contraction par tierce en comptant combien chaque note de musique exige de mouve mens différens. M. Wollaston a obtenu le même résultat d'u

est pas le même pour tous les hommes; il y a même entre eux, sous ce rapport, de très-grandes différences, lesquelles sont étrangères à la force d'organisation des muscles : il est rare même que les individus à système musculaire très-prononcé soient les meilleurs coureurs. Je ne sache pas qu'on ait encore observé une habitude extérieure du corps qui indique la vitesse des contractions, comme il en est une qui dénote leur force : elle doit exister cependant. Les animaux sont comme les hommes : le degré de rapidité auquel chacun peut atteindre est infiniment variable. Je ne citerai pas d'exemples de courses rapides, de mouvemens analogues

---

autre manière. Ses recherches sont consignées dans une leçon Croonienne qui fait partie des Transactions philosophiques pour l'année 1810. Voici comment il s'y est pris pour mesurer la vitesse des contractions :

D'après ses recherches, la contraction musculaire, pour peu qu'elle ait de durée, est intermittente, pour ainsi dire, et se compose d'une foule de petites contractions et de relâchemens alternatifs : l'espèce de bourdonnement qu'on entend dans l'oreille lorsqu'on en bouche l'ouverture avec l'extrémité du doigt en est la preuve. Ce bruit particulier dépend, suivant M. Wollaston, de l'effort musculaire qu'exige l'attitude que l'on prend; et en effet j'ai éprouvé qu'il est nul quand on remplace le doigt par un corps inerte. Or, ce bourdonnement comprend une suite d'oscillations très-rapprochées qui répondent à autant de contractions des muscles; il ne s'agissait donc plus que de trouver un terme de comparaison pour ces oscillations : c'est ce qu'a fait M. Wollaston. Il est parvenu à pouvoir comparer ce bruit à celui que produit le roulement d'une voiture, qui est également intermittent, et dont il était facile d'apprécier la fréquence. Il a reconnu par ce moyen la vitesse indiquée plus haut. (Béclard.)

imprimés par les membres supérieurs, comme ce
des doigts dans le jeu de certains instrumens,
violon, de la flûte, etc. : une foule d'auteurs
rapportent d'étonnans : on pourra les lire dans c
auteurs. Je remarque seulement qu'il est peu
mouvemens qui nous donnent plus l'idée de cette
tesse que les contractions brusques et rapides qu
dans les membres inférieurs, déterminent le sau
ou la forte prépulsion de ces membres quand
donne un coup de pied; qui, dans les supérieur
servent à la projection des corps graves; qui, da
les mêmes membres, concourent à repousser
tronc en arrière, lorsqu'on les appuie contre
point résistant, et qu'on les étend ensuite to
à coup pour pousser en avant ce point, lequel,
cédant pas, répercute le mouvement sur le tron
qui président à l'action de donner un coup
poing; qui, dans les doigts, produisent le mo
vement subit d'où résulte ce qu'on nomme une cl
quenaude, etc., etc. Je confonds tous ces mo
vemens, presque entièrement analogues au saut,
qui n'en diffèrent que par les effets plus ou moi
manifestes qu'ils produisent. Les auteurs, pour
dire en passant, n'ont pas assez établi de ra
prochemens entre ces diverses contractions bru
ques et rapides; ils ont considéré le saut trop is
lément. Mais revenons. Le degré de rapidité
contractions musculaires est puissamment subo
donné à l'exercice. L'habitude de faire agir c
tains muscles nous rend plus prompts dans le
contraction : par exemple, la marche, qui nous l
bitue à contracter alternativement les extenseurs

es fléchisseurs des membres inférieurs, nous dis-
ose singulièrement à la vitesse de la course. Pour
eu que chaque homme se livre à ce dernier exer-
ice, il a bientôt atteint le plus haut point de ra-
idité dont soit capable son système musculaire. Au
ontraire, les mouvemens d'adduction et d'abduc-
ion étant plus rares dans l'état ordinaire, il faut
n long apprentissage pour apprendre aux dan-
eurs à porter avec rapidité leurs jambes en de-
ors et en dedans afin d'exécuter les pas où ils les
roisent alternativement. En général, l'habitude
nodifie beaucoup plus la vitesse qur la force des
ontractions. Cependant il est toujours un terme
u'on ne dépasse jamais, quel que soit l'exercice
u'on ait donné aux muscles : ce terme dépend
le la constitution ; chaque homme est, par elle,
auteur et coureur plus ou moins agile.

§ III. *Durée des Contractions.*

Il y a, sous le rapport de la durée des contrac-
ions, une différence remarquable dans les mus-
cles, suivant qu'on excite artificiellement ou na-
urellement ces contractions.

Que, sur un animal vivant ou sur un récemment
ué, on excite le muscle lui-même ou qu'on agace
ses nerfs, le relâchement succède à la contraction,
presque subitement : jamais ni l'un ni l'autre état
ne sont durables, quoiqu'on fasse durer long-
temps l'action du stimulant ; l'effet qu'il a pro-
duit s'épuise tout de suite. Que le galvanisme, que

les agens mécaniques ou chimiques, servent à no expériences, c'est le même phénomène.

Au contraire, quand la volonté dirige la con traction, elle peut la soutenir pendant un temp très-long. Le support des fardeaux, la station, etc. prouvent ce fait manifestement. Lors même que pendant la vie, une irritation morbifique est diri gée sur les nerfs, la contraction peut être très-per manente, comme le tétanos nous en présente de s terribles preuves.

La permanence de la contraction musculaire fati gue beaucoup plus le muscle qu'un relâchement e une contraction alternatifs. Voilà pourquoi, lorsqu nous sommes long-temps debout, nous faisons tou à tour porter le poids du corps plus sur un membr que sur l'autre.

§ IV. *État des Muscles en contraction.*

Les muscles qui se contractent présentent diver phénomènes que voici :

1°. Ils durcissent sensiblement, comme on peu s'en assurer en plaçant la main sur le masseter, su le temporal, ou sur un autre muscle superficie quelconque en contraction.

2°. Ils augmentent en épaisseur : de là la saill plus grande de tous les muscles sous-cutanés pen dant que le corps est dans une violente action. Le sculpteurs connaissent très-bien cette différence L'homme en repos et l'homme qui se meut ont dans leurs statues, un extérieur tout différent.

3°. Les muscles, lorsqu'ils ne sont pas bridés pa

es aponévroses, éprouvent quelquefois un léger léplacement.

4°. Ils diminuent en longueur, et par là même ls rapprochent les deux points auxquels ils se fixent.

5°. Leur volume reste à peu près le même. Ce u'ils perdent du côté de la longueur, ils le gagnent peu près en épaisseur. La proportion est-elle bien xacte? Que nous importe? cette question isolée, à aquelle, depuis Glisson, on a attaché de l'impor-ance, n'en mérite aucune (1).

---

(1) Il y a d'ailleurs plusieurs causes d'erreur dans les expé-iences que l'on a faites à ce sujet. Swammerdam, par exemple, it qu'en mettant le cœur d'une grenouille dans l'eau, on voit le quide baisser dans le moment de la contraction et monter dans e relâchement; mais le cœur contenant un fluide qui peut en ugmenter ou en diminuer le volume, sans que pour cela son issu ait éprouvé aucun changement, il est évident qu'on ne peut ien conclure de cette expérience. De même, dans celle de Glis-on, qui faisait plonger le bras à un homme dans une cuve, et bservait ensuite la différence de niveau suivant l'état de con-raction ou de relâchement des muscles, les résultats ne sauraient nspirer une grande confiance, parce que, d'une part, il st assez difficile dans ce cas d'établir le niveau exactement, et ue, d'une autre part, la contraction des muscles étant toujours ccompagnée du relâchement des muscles opposés, il est impos-ible de bien distinguer ces deux effets l'un de l'autre.

Un fait qui semble offrir quelque chose de plus positif est dû à Erman. Ce physiologiste, ayant placé un tronçon d'anguille dans n tube de verre étroit et contenant de l'eau, vit, à chaque con-raction que déterminait un courant galvanique, l'eau baisser ensiblement, et ce liquide remonter pendant le relâchement.

Au reste, cette question, qui a beaucoup occupé les auteurs, été résolue par eux de toutes les manières. On a soutenu que

6°. Le sang contenu dans les vaisseaux des mus cles, dans les veines surtout, en est exprimé e partie : l'opération de la saignée le prouve ; on aug mente le jet du sang par les mouvemens du bras.

7°. Cependant le muscle ne change pas de cou leur ; c'est que ce n'est pas la portion colorante d sang circulant avec lui dans les vaisseaux musc laires qui colore les muscles, mais, comme je l'a dit, celle qui est inhérente à leur tissu et combiné avec leurs fibres ; or, cette substance colorante com binée reste la même dans le relâchement et la con traction. Le cœur de la grenouille pâlit en se con tractant ; mais c'est que le sang qu'il contenait s'e vacue, et que la transparence de ses parois rend c phénomène sensible.

8°. En se contractant, les muscles deviennent siége d'une foule de petites rides transversales, sen sibles surtout dans les contractions d'oscillation moins apparentes dans celles de totalité, presqu nulles même lorsque, un muscle étant à découver sur un animal vivant, celui-ci se contracte avec u peu de force.

9°. Tous les auteurs considèrent la contractio d'une manière trop uniforme : ils en ont décrit le phénomènes comme si dans tous les cas le muscle s contractait de même ; mais il est évident qu'il y de nombreuses différences dans l'état où il est alor 1°. Il y a la contraction lente et insensible déterm

---

le muscle diminuait, on a prétendu qu'il augmentait, et enfin on a assuré qu'il ne pouvait augmenter ni diminuer : il sera difficile d'imaginer une quatrième opinion. (BÉCLARD.)

ée par la contractilité de tissu, lorsqu'on coupe n muscle, ou que son antagoniste est paralysé; ' la contraction brusque et subite produite par volonté, ou par l'excitation d'un nerf, mode de ouvement qui a lieu le plus communément, soit ans l'état ordinaire, soit même dans les convul- ons; 3° l'espèce d'oscillation dont j'ai déjà parlé, t qui, affectant chaque fibre dans un muscle, ne roduit cependant aucun effet bien sensible sur sa otalité, le raccourcit peu, ne rapproche presque pas, ar conséquent, ses points mobiles; c'est le mode e mouvement qui a lieu dans les tremblemens roduits par le froid, par la crainte, par le début es accès de fièvres intermittentes, etc. En mettant découvert un muscle sur un animal que l'appa- eil de l'expérience fait frissonner, on voit que ette espèce de contraction ressemble entièrement celle qu'on produit en versant du sel en poudre ur une partie du système musculaire. Alors, quoi- u'il y ait dans tous les muscles un mouvement in- estin infiniment plus sensible que dans les grandes ontractions, cependant les membres se déplacent eu, il n'y a presque point de mouvemens de tota- té; ce ne sont que de légères secousses. 4°. Il est ncore d'autres modes de contraction moins sen- ibles que ceux-ci, mais qui présentent cependant es différences. En général, à chaque espèce de ouvement du muscle est adaptée une manière articulière de se contracter; pour peu qu'on ait ait d'expériences sur les animaux vivans, on se onvaincra facilement combien les auteurs les plus udicieux se sont mépris sur ce point.

Souvent deux modes de contraction sont coml nés : par exemple, quand on coupe un muscle travers sur le vivant, il y a d'abord une contra tion lente de totalité, produite par la contractili de tissu, ensuite des oscillations partielles da toutes les fibres divisées : or, ces oscillations so étrangères à la rétraction, qui a lieu sans elles, so vent sur le vivant et toujours sur le cadavre. I même les oscillations peuvent se combiner avec contraction subite née de l'influence nerveuse p l'acte de la volonté, comme dans les derniers m mens de l'existence, ou bien ne point lui être ass ciées, comme cela arrive presque toujours quai l'animal jouit de toute sa vie. On peut se convainc de ce dernier fait sans le secours des expérience en plaçant la main sur le muscle masseter ou s le biceps d'une personne maigre, pendant qu'ils contractent : on n'y sent à travers la peau aucı mouvement analogue à ces oscillations.

§ V. *Mouvemens imprimés par les Muscles.*

Tout mouvement musculaire est ou simple c combiné. Parlons d'abord du premier; il nous fe comprendre le second.

Mouvement simple.

Il faut le considérer, 1° dans les muscles à d rection droite; 2° dans ceux à direction réfléchi 3° dans ceux à direction circulaire.

Dans les premiers, comme dans ceux des men

bes, du tronc, s'ils sont à forme allongée, et qu'ils se terminent par un tendon, chaque fibre se contractant tire ce tendon de son côté : d'où il résulte que toutes sont congénères pour le rapprocher du centre du muscle, mais qu'en même temps elles tendent à lui donner chacune une autre direction, et sous ce rapport elles sont antagonistes. Le mouvement commun reste ; l'opposé est détruit.

Tout l'effort de la contraction dans les muscles longs se concentre sur un seul point, sur le tendon. Dans la plupart des muscles larges, au contraire, les attaches se faisant des deux côtés par des points différens, toutes les fibres ne concourent point au même but. Aussi les parties diverses du même muscle peuvent-elles avoir des usages très-différens, et même opposés ; ainsi la portion inférieure du grand dentelé n'agit point comme la supérieure : souvent même les portions diverses du même muscle se contractent en des temps différens. Dans un muscle long, au contraire, comme toutes les fibres concourent à produire le même effet, elles agissent toujours simultanément.

Pour estimer l'effet que produit un muscle à direction droite sur les os auxquels il s'implante, on a employé différens moyens. Un très-simple me paraît être celui-ci, qui, je crois, n'a pas été indiqué. Il consiste à examiner la direction du muscle depuis son point fixe jusqu'à son point mobile, et à prendre l'inverse de cette direction : ce dernier sens est toujours celui du mouvement. Voulez-vous savoir comment le radial antérieur agit sur le poignet, prenez-le à son insertion au condyle, suivez

de la sa direction en bas et en dehors ; vous verr qu'il porte la main en haut et en dedans, qu'il fléchit et la met un peu dans l'adduction. Le jar bier antérieur, dirigé en bas et en dedans, élève pied et le porte en dehors. Le droit antérieur de cuisse, directement dirigé du bassin vers la rotul relève la jambe sans la faire dévier. Tous les autr muscles vous présenteront cette disposition. Quel que soit l'attache qui leur serve de point fixe ou point mobile, toujours ils agissent en sens inver de leur ligne de direction supposée partie du pr mier point; et comme chaque attache peut êt alternativement mobile et fixe, les deux os qui servent sont portés en sens opposé: le coraco-br chial, dirigé en bas et en dehors de l'épaule vers bras, porte ce dernier en haut et en dedans ; rigé de bas en haut et de dehors en dedans bras vers l'épaule, il meut celle-ci en bas et en d hors. D'après cette règle générale, il suffit de vo un muscle sur le cadavre pour prononcer sur s usages.

Lorsque tout un muscle large se réunit sur u point commun, comme le deltoïde, qui, ayant u foule de points d'attache en haut, se fixe en bas un tendon unique, la ligne de direction moyenne celle de toutes ses fibres doit être prise pour estim ses usages.

Quand un muscle s'attache par ses deux extr mités sur plusieurs points, que par conséquent l fibres qui le composent forment plusieurs fa ceaux à direction différente et à mouvemens isolé il faut examiner la ligne de direction de chaque fa

eau pour estimer l'action du muscle. C'est ainsi ue doit s'étudier celle du trapèze, du grand den-elé, du rhomboïde, etc.

Dans les muscles à direction réfléchie, comme le rand oblique de l'œil, les péroniers latéraux, le éristaphylin externe, etc., l'action du muscle ne oit s'estimer que du point de la réflexion: ainsi le rand oblique porte-t-il l'œil en dedans, quoique sa ortion charnue se contracte de manière à porter le oint mobile en arrière.

Les muscles orbiculaires, ceux placés autour des èvres, des yeux, de l'anus, etc., n'ont pas en gé-éral de point fixe ni de point mobile; ils ne sont oint destinés à rapprocher deux parties l'une de 'autre, mais seulement à rétrécir l'ouverture au-our de laquelle ils sont situés: l'anus est fermé par on sphincter tant que les excrémens ne le dilatent oint; la bouche reste close tant que les abaisseurs, es élévateurs ou les abducteurs des lèvres sont inac-ifs; l'œil est fermé tant que l'élévateur de la aupière supérieure est relâché. Je remarque à ce ujet que la paupière inférieure n'ayant point d'a-aisseur, c'est principalement l'autre qui concourt à fermer ou à ouvrir l'œil; et comme son muscle ne peut être en contraction permanente, les alter-natives de ses relâchemens déterminent ces cligno-temens continuels qui ont lieu pendant que l'œil est ouvert: ils sont à l'œil ce qu'est aux membres inférieurs le transport alternatif du poids du corps d'une jambe à l'autre pendant une station immo-bile. A chaque instant, le muscle se relâche, le sphincter agit aussitôt; puis il se contracte et dis-

tend le sphincter: le clignotement est donc un lutte habituelle entre le releveur de la paupière l'orbiculaire. Dans le sommeil, ce n'est pas pa la contraction de celui-ci que l'œil se ferme; il e relâché comme tous les muscles : c'est parce qu le précédent étant inactif, la paupière tombe pa son propre poids sur l'œil : elle communique pou ainsi dire le mouvement à l'orbiculaire qu'elle ren ferme, tandis que, pendant le jour, c'est au con traire l'orbiculaire qui lui communique ce mouve ment.

Mouvemens composés.

Il est peu de mouvemens dans l'économie qu soient simples, peu de muscles qui puissent se con tracter isolément. Presque toute sorte de contractio en suppose une autre, et voici pourquoi : les deu points auxquels se fixe ordinairement un muscl sont tous deux susceptibles de se mouvoir ; si l'u d'eux n'était retenu, tous deux se mettraient don en mouvement quand le muscle se contracte : ainsi dans la contraction de ses extenseurs, la jambe se rait rapprochée du pied presque autant que le pied d la jambe, si celle-ci n'était fixée : or, elle ne peu l'être que par des muscles qui agissent en sens oppos de l'effet que les extenseurs tendent à produire su elle : donc toutes les fois que les deux attaches d'u muscle sont mobiles, le mouvement isolé de l'un d'elles suppose la contraction de divers muscles pour fixer l'autre.

Il n'y a que les muscles attachés d'une part à un

oint fixe, de l'autre à un point mobile, comme eux de l'œil et la plupart de ceux de la face, qui uissent se mouvoir d'une manière isolée, et sans écessiter un mouvement dans d'autres muscles. emarquons cependant qu'en général les contrac-ons destinées à fixer le point qui doit être immo-le dans les mouvemens ordinaires sont moins andes qu'il ne le semble d'abord. En effet, dans s mouvemens ordinaires, le point qui se meut est ujours le plus mobile, celui qui reste sans mou-ement l'est le moins : par exemple, il faut bien us d'effort aux fléchisseurs pour incliner le bras r l'avant-bras, que pour fléchir les phalanges sur lui-ci, et celui-ci sur le bras. En supposant mobiles urs deux attaches, les jumeaux agiront bien plus ficacement sur le pied que sur le fémur, etc. Dans s membres, le point supérieur est toujours plus obile que l'inférieur : or, c'est celui-ci qui se meut resque toujours, l'autre étant fixé : donc, comme offre plus de résistance par sa position, il faut oins d'efforts aux puissances musculaires pour le tenir. Ce n'est que dans les mouvemens un peu olens que la contraction préliminaire des muscles estinés à fixer un des points d'insertion est très-énible. C'est ce qui arrive à la poitrine lorsque le apèze, le grand dentelé, le grand pectoral se ontractent avec force : alors tous les autres muscles e cette cavité se contractent fortement pour la ettre dans la dilatation, et offrir ainsi une attache lus large et plus fixe à ces muscles, qui meuvent épaule dans le support des fardeaux, ou dans tout utre effort analogue. Le diaphragme se contracte

aussi : de là les hernies, les descentes qui arriver par contre-coup dans ces mouvemens, qui, au pr mier coup d'œil, n'ont aucune analogie avec l cavité abdominale. Lorsque, dans une position ho rizontale du corps, on relève la tête, les muscle droits abdominaux se contractent pour fixer la po trine, et offrir un point solide au sterno-masto dien, etc.

On appelle spécialement *mouvement compo* celui que deux ou plusieurs muscles, agissant su le même point, concourent simultanément à pr duire. Dans ce cas, le point mobile ne suit la dire tion ni de l'un ni de l'autre muscles, s'il y en deux, mais la diagonale de leur double directio C'est ainsi que l'œil se meut en dehors et en bas, etc que la tête s'abaisse, qu'elle se porte de côté, que le bras s'applique contre le tronc, etc. En g néral, la nature n'a distribué les muscles que dan quelques sens principaux autour d'un point mobile par exemple, autour de l'œil, dans ceux de l'él vation, de l'abaissement, de l'adduction et d l'abduction. La combinaison de ces mouvemens sim ples produit les composés : si l'adducteur et l'abai seur se contractent également, l'œil sera exact ment porté dans une direction moyenne; si l'u agit avec plus de force que l'autre, il se rapproche un peu plus du premier; en sorte que les quat muscles, en se mouvant isolément, ou deux à deu d'une manière égale, portent déjà l'œil en huit sen différens. Dans tous les sens intermédiaires, il y aussi action simultanée de deux muscles, ma toujours supériorité d'action de l'un d'eux. Ain

ɔpèrent presque tous les mouvemens de circum-
ction.

Quand deux muscles opposés se contractent, le
int mobile ne se meut pas ; il y a antagonisme
rfait. Quand deux muscles qui se contractent si-
ultanément sont placés dans le même sens, il n'y
pas de perte de force : c'est ce qui arrive quand
l génio-hyoïdien et le mylo-hyoïdien abaissent la
âchoire ou élèvent l'os hyoïde : ces muscles sont
mplétement congénères. Mais quand deux mus-
es sont en partie opposés et en partie dans le
ême sens, comme les sterno-mastoïdiens, une
rtion des forces se détruit, et l'autre reste : l'ac-
on par laquelle les sterno-mastoïdiens tendent à
orter la tête à droite ou à gauche est nulle ; celle
ule par laquelle ils la dirigent en bas produit son
fet, qui est double, vu l'action des deux muscles,
squels sont ainsi en même temps *congénères* et
ntagonistes. On voit, d'après cela, que ces mots
appliquent non-seulement aux mouvemens pro-
uits par la contractilité de tissu, mais aussi
ès-souvent à ceux que détermine la contractilité
nimale.

§ VI. *Phénomènes du relâchement des Muscles.*

Quand un muscle cesse de se contracter, il de-
ient le siége de phénomènes exactement opposés
ux précédens, qu'il suffit de connaître pour con-
evoir ceux-ci. Le muscle s'allonge et se ramollit ;
es diverses rides disparaissent ; il revient exac-

tement à l'état où il se trouvait. Il est inutile d présenter la série de ces phénomènes.

Je remarque que, dans l'état de relâchement d muscles, les parties exécutent souvent des mo vemens qu'elles ne doivent qu'à leur propre poid telles sont la flexion de la tête en devant dans sommeil, la chute de l'avant-bras et du bras dans même cas. Alors la pesanteur s'oppose souvent à que les membres, qui ne sont pas soutenus, reste dans leur position moyenne. On voit spécialeme ces sortes de phénomènes dans les paralysies.

ARTICLE V.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Le système musculaire présente de grandes diffé rences, suivant qu'on l'examine avant l'accroi sement complet ou dans les âges qui suivent celui o cet accroissement se termine.

§ Ier. *Etat du Système musculaire chez le Fœtus.*

Dans le premier mois du fœtus, ce système est comme les autres, confondu en une masse mu queuse homogène, où l'on ne distingue presqu aucune ligne de démarcation : aponévroses, mus cles, tendons, etc., tout a la même apparence. Pe à peu les limites s'établissent, le tissu musculaire s

ononce, en prenant d'abord une teinte plus fonce, par le sang qui y aborde. Cependant cette teinte et d'abord moins marquée que dans l'adulte ; elle ste même telle jusqu'à la naissance. Si on se sert s os pour terme de comparaison, cela devient ppant. Dans l'adulte, le dedans des os est moins ruge que le tissu musculaire; la différence est ème tranchante. C'est le contraire dans le fœtus ; aucoup plus de sang pénètre la portion déjà ossie des os, que l'intérieur des muscles. La nature tribue le sang d'une manière inverse, à ces deux oques de la vie, dans l'un et l'autre systèmes.

Je présume que ce phénomène dépend principanent de l'espèce d'inertie dans laquelle restent muscles avant la naissance. Remarquez en effet e, malgré que quelques mouvemens annoncent ns les derniers mois la présence du fœtus dans sein de sa mère, cependant ces mouvemens sont iniment moins marqués qu'ils ne doivent l'être r la suite. La preuve en est dans la position connte qu'affectent les membres et le tronc demichis, dans le peu d'espace qu'il y aurait pour écuter ces mouvemens, surtout dans les derniers nps où les eaux sont singulièrement diminuées. Ux premières époques de la grossesse, quoique pace soit plus grand, en ouvrant les femelles d'aniux, on trouve constamment le fœtus couché sur -même, et dans une attitude comme immobile.

Plusieurs physiciens estimables ont trouvé les iscles du poulet dans sa coquille bien moins irables qu'après la naissance, soit par les agens dinaires, soit par l'influence galvanique. J'ai fait

les mêmes expériences sur de petits cochons-d'In
qui n'avaient pas vu le jour, en irritant directeme
leurs muscles, ou en agaçant leurs nerfs, le
moelle épinière et leur cerveau. Plus on se rapp
che du terme de la conception, moins on obti
par là de mouvemens. Ce qu'il y a surtout de
marquable, c'est la rapidité avec laquelle, dès q
e fœtus est mort, les muscles perdent leur irri
bilité; l'instant qui éteint la vie semble étouf
cette propriété. Dans les derniers temps qui pré
dent l'accouchement, elle est un peu plus perm
nente, et plus susceptible d'être mise en jeu, m
toujours moins qu'après la naissance. Nous ne p
vons donc guère douter que les mouvemens
soient moindres à cet âge, quoiqu'ils existe
cependant. Nous verrons que la nutrition, le v
lume et la rougeur des muscles, sont en géné
dans l'adulte, proportionnés au nombre des mo
vemens qu'ils exécutent; il n'est donc pas étonna
que moins de sang les pénètre dans le fœtus.
reste, plus on se rapproche de l'époque de la co
ception, moins ce fluide y est abondant. J'ai
occasion de faire cette remarque sur des cocho
d'Inde tués à différentes époques de la gestatio
Dans les premiers temps, les muscles des petits r
semblent vraiment à ceux des grenouilles : bla
châtres comme eux, ils sont parcourus par d
lignes rougeâtres qui indiquent le trajet d
vaisseaux.

Je présume aussi que l'espèce de sang qui circu
à cet âge dans les artères, et qui pénètre les mu
cles, est moins propre à entretenir et à développ

ur motilité. En effet, c'est du sang noir qui aborde ors aux muscles par les vaisseaux. Or, on sait que, ns l'adulte, toutes les fois que ce sang circule ns le système artériel accidentellement, la vie sltère, le mouvement musculaire s'affaiblit, et entôt l'asphyxie survient. C'est à la nature et à la uleur du sang du fœtus qu'il faut attribuer la nte livide et souvent même foncée que ces mus-es présentent; car c'est encore un caractère qui distingue de ceux de l'adulte. Non-seulement ur coloration est moins marquée, ils sont plus les, mais leur teinte est toute différente; et cette inte a constamment le caractère que j'indique ant que le fœtus ait respiré.

Les muscles sont grêles, peu prononcés chez le etus. Leur développement est infiniment moindre ue celui des muscles de la vie organique. Le vo-lme des membres vient surtout de leur graisse us-cutanée. Lorsque cette graisse est peu abon-nte, et qu'on compare les membres au tronc, ils nt bien moindres, à proportion de celui-ci, qu'ils le seront dans la suite. Chez les fœtus qui ont eaucoup de graisse cutanée, dont on enlève toute peau et dont on fait par conséquent des écorchés, n observe également cette disproportion de volume. n sait qu'à cet âge toutes les cavités d'insertion usculaire, toutes les apophyses destinées au ême usage, sont presque nulles. Les parois de la sse temporale, par exemple, plus déjetées en ehors, agrandissent l'espace cérébral, et rétré-issent celui que remplit le crotaphite. C'est un petit it anatomique qui est la conséquence d'une grande

loi de la nutrition, savoir, de la prédominance d
système nerveux, auquel appartient le cerveau, s
le musculaire animal, sous le rapport du dévelo
pement. Remarquons que cette prédominance, d'
naît à cet âge une disproportion sensible entre l
deux systèmes musculaire et nerveux, relativeme
à ce qu'ils seront par la suite, prouverait seule q
les muscles ne sont pas, comme on l'a dit, une te
minaison et un épanouissement des nerfs : en effe
deux espèces d'organes dont le développement e
inverse ne sauraient appartenir à un même système

Plusieurs auteurs ont prétendu que la portio
charnue était proportionnellement bien plus dév
loppée chez le fœtus que la tendineuse, que celle-
même n'existait pas. Je ne puis présumer d'où a
naître cette opinion. Qu'on ait cru que les ap
névroses des membres manquent dans les premie
mois, cela se conçoit : en effet, j'ai constamme
observé qu'alors elles n'ont point cette couleu
blanche qui les caractérise dans la suite, couleu
qu'elles ne prennent que quand leurs fibres se d
veloppent ; elles sont transparentes comme un
membrane séreuse, et peuvent au premier con
d'œil ne pas être aperçues. Mais les tendons ont un
couleur blanchâtre très-prononcée ; on les dis
tingue très-bien : ils sont tout aussi gros et tou
aussi longs proportionnellement qu'ils le seront pa
la suite.

II. *État du Système musculaire pendant l'accroissement.*

A la naissance, le système musculaire de la vie
nimale éprouve, ainsi que tous les autres, une ré-
olution remarquable. Jusque là le sang noir seul
énétrait ses artères : alors le sang rouge y aborde
ut à coup; car ce sang se forme dès que la res-
iration a lieu : or, elle a lieu dans presque toute sa
énitude au même instant où le fœtus sort du sein
e sa mère. On voit d'ailleurs manifestement la
inte livide de la peau être remplacée presque
ut à coup par une couleur rosée, qui ne vient
ue de cette différence du sang. Ce fluide nouveau
ordant aux muscles est une cause nouvelle d'ex-
tation, et par là même de mouvemens. Ajoutez à
ette cause l'accroissement subit de l'action céré-
rale. Jusque là, pénétré de sang noir, le cerveau
ait comme dans une espèce d'inertie, qui tenait
ussi principalement à l'absence de sensations,
omme je l'ai prouvé ailleurs. Tout à coup le sang
ouge y aborde; il le stimule, soit par les prin-
pes qu'il contient, soit par la raison seule qu'il
st différent de celui qui y pénétrait; car telle est
nature de la sensibilité, qu'elle est susceptible
e s'affecter dans un organe par là même qu'un
xcitant qui y est appliqué est nouveau pour lui.
ubitement excité par le sang rouge, le cerveau
réagit sur les muscles et les détermine à se contrac-
er. Cette cause, jointe à la précédente, me paraît
tre une de celles qui influent le plus sur le pas-

sage subit de l'espèce d'inertie où était le fœtus, o
du moins du peu de mouvement qu'il exécutait,
l'agitation générale de ses membres, de son ventr
de sa poitrine, de sa face, etc.; car, aussitôt apr
la naissance, presque tous les muscles se meuve
plus ou moins fortement.

Gardons-nous cependant d'exagérer les influen
ces d'une cause qui n'est certainement pas unique
par exemple, les mouvemens du diaphragme et d
muscles pectoraux sont certainement antérieurs
l'abord du sang rouge au cerveau, puisque leu
action est nécessaire à la production de ce san
rouge. Ces muscles entrent en action, parce qu
l'excitation par l'air de toute l'habitude du corps
et des membranes muqueuses en contact avec c
fluide, stimule le cerveau, qui est le centre de tout
sensation. Emu par cette excitation, cet organ
réagit sur les muscles, et commence à les faire con
tracter. Les contractions augmentent quand,
cette excitation extérieure et indirecte, se joint l'ex
citation intérieure et directe dont nous venons d
parler. Cette seconde excitation n'est pas pour l
fœtus d'une nécessité absolue; car souvent on voi
des enfans restés livides quelques instans après l
naissance, se mouvoir très-bien; mais, en géné
ral, les mouvemens ne sont point aussi marqué
que quand la coloration en rouge de la peau indi
que l'abord du sang artériel qui a subi l'influenc
de la respiration.

L'abord du sang rouge dans les muscles ne leu
donne pas tout de suite la couleur qu'ils conserven
dans la suite. Pendant quelque temps après la nais

ance, ils gardent encore une teinte foncée, comme les dissections le prouvent d'une manière manifeste, parce que, comme je l'ai dit, leur couleur ne vient pas de la portion colorante circulant dans leur tissu, mais bien de celle combinée avec ce tissu. Or, la nutrition seule produit la combinaison : mais cette fonction ne s'opère que peu à peu; elle est véritablement une fonction chronique, en comparaison de l'exhalation, de l'aborption, de la circulation, qui affectent manifestement une marche aiguë.

A mesure qu'on avance en âge, les muscles prennent une teinte de plus en plus rouge; plus de sang les pénètre; ils se nourrissent à proportion plus que divers autres organes: cela est remarquable surtout dans ceux des membres inférieurs. Je remarque cependant que, tant que l'accroissement dure, c'est spécialement sur la longueur et non sur l'épaisseur des muscles, que porte l'énergie de la nutrition. Voilà pourquoi ils se prononcent peu sous les tégumens, et n'y font presque pas de saillie; pourquoi les formes sont plus arrondies, plus gracieuses, mais moins mâles à cet âge. L'extérieur du jeune homme est, sous ce rapport, tout différent de celui de l'adulte, en considérant l'un et l'autre, abstraction faite de toute cause qui puisse influer sur leur conformation. L'habitude extérieure de l'enfant et du jeune homme est, en général, assez analogue à celle de la femme.

Quoique nous ne connaissions pas aussi bien la différence des substances qui pénètrent les muscles dans les premières années et dans l'âge adulte, que

nous la connaissons pour les os, où l'addition d phosphate calcaire à la gélatine offre un phéno mène nutritif si tranchant, cependant nous ne pou vons douter que ces différences n'existent d'un manière réelle. Traitée par l'ébullition, la com bustion, la macération, etc., la chair du fœtus n donne point les mêmes résultats que celle de l'a dulte.

Le bouillon fait avec les muscles d'un jeune an mal contient beaucoup plus de gélatine, substanc qui prédomine si fort à cet âge de la vie. Il a beau coup moins de saveur que celui des animaux adultes La substance extractive paraît être moindre pa conséquent dans le système musculaire. Un goû fade, nauséabond même pour certaines personnes caractérise les bouillons de veau. La différence de principes qu'ils contiennent influe même sur le organes gastriques dont ils excitent la contraction ils lâchent le ventre comme on le dit, phénomèn étranger aux bouillons ordinaires.

Il ne paraît pas que la fibrine soit en aussi grand proportion dans les muscles à cet âge de la vie les considérations suivantes me le font penser 1°. Au lieu de cette substance, Fourcroy n'a trouvé dans le sang du fœtus qu'un tissu mollasse, san consistance, et comme gélatineux : or, le sang pa rait être le réservoir de la fibrine. 2°. La force e l'énergie des contractions sont, en général, en proportion de la quantité de ce principe contenue dans les muscles : or, cette énergie est peu marquée dans le premier âge. 3°. Les muscles brûlent alors en se crispant et en se resserrant moins sensible

nent que dans l'adulte. J'ai vu même deux ou trois ois leur tissu, placé sur des charbons ardens, être e siége d'une espèce de boursouflement analogue celui de la gélatine traitée de la même manière.

En général, il paraît que cette dernière subtance occupe en partie dans les muscles la place que oit, par la suite, y tenir la substance fibreuse. Ceux qui fréquentent les amphithéâtres ont remarué sans doute que, toutes choses égales d'ailleurs, es muscles des jeunes sujets se putréfient moins romptement que la plupart des autres substances, t qu'en se putréfiant ils donnent une odeur moins étide. On sait que le bouillon de veau passe à l'aire plus facilement que celui de bœuf; il est touours blanchâtre, il n'a jamais cette couleur foncée u bouillon fait avec le dernier; il se prend en gelée eaucoup plus facilement. Le rôtissage des viandes, ans le premier âge et dans l'âge adulte, présente ussi de grandes différences. Toute espèce de coction, soit à feu nu, soit dans un fluide quelconque, st beaucoup plus prompte, beaucoup plus facile, ans le premier âge. Le jus qu'on extrait alors des uscles présente un caractère essentiellement différent; il est moins fort. Les effets de la macération ont aussi plus rapides; on obtient plus tôt cette ulpe muqueuse à laquelle l'action de l'eau finit nfin par réduire presque toutes les substances animales.

§ III. *État du Système musculaire après l'accroissement.*

Après que l'accroissement général est fini en longueur, nos organes croissent encore en épaisseur et c'est surtout dans les muscles que ce phénomène est remarquable. Au corps grêle, mince et à formes arrondies de l'adolescent et du jeune homme succède un corps gros, fort, épais et à formes prononcées. Les muscles se dessinent à travers les tégumens, des bosses et des enfoncemens s'observent sur ceux-ci; diverses lignes déprimées servent de limites à diverses lignes saillantes. Le système musculaire animal ressort mieux alors dans l'état de repos, qu'il ne se prononce dans l'adolescent lors de ses plus grands mouvemens. Les peintres et les sculpteurs ont étudié, plus que les anatomistes, les degrés divers du développement des muscles.

L'époque où les poils croissent, où les parties génitales commencent à entrer en activité, est principalement celle où les muscles commencent à devenir saillans chez l'homme. Chez la femme, cette dernière époque n'offre point un semblable phénomène : les muscles conservent leur rondeur primitive; ils ne la perdent même presque pas. Dans ce sexe, l'arrondissement des membres, leurs formes douces, contrastent avec l'espèce de rudesse de ceux de l'homme.

L'accroissement en épaisseur, dans les muscles, paraît porter bien plus sur la portion charnue que

ur la tendineuse, et surtout que sur l'aponévro-
ique. Les aponévroses inter-musculaires principa-
ement ne paraissent pas croître à proportion des
ibres qui s'y implantent; en sorte que celles-ci
ont saillie, et qu'à l'endroit de l'aponévrose est
ıne dépression. C'est ce qu'on voit surtout très-
ɔien dans les muscles coupés, pour leur insertion,
ɔar beaucoup de ces toiles fibreuses, dans le del-
oïde en particulier. Non-seulement la saillie de la
otalité du muscle sous la peau fait ressortir les dé-
ɔressions qui le séparent des autres, mais encore
:haque plan charnu fait une saillie que sépare une
ainure; ce qu'on ne distingue, il est vrai, que sur
es sujets un peu maigres.

A mesure que le muscle croît en épaisseur, il
ıugmente en densité: il devient plus ferme, plus
ésistant. Si on place comparativement la main sur
leux muscles semblables d'un adulte et d'un en-
ant, pendant qu'ils sont en contraction, on sent
ıne différence sensible dans leur dureté. Des poids
suspendus comparativement à des muscles des deux
âges, pris dans les cadavres, prouvent le degré
différent de leur résistance. Le tissu musculaire des
adultes cède plus lentement à tous les réactifs.

La couleur des muscles continue à être rouge dans
l'adulte; mais, en général, et toutes choses égales
sous le rapport des causes qui font varier cette cou-
leur, elle commence à devenir d'un rouge moins
vif au-delà de la trentième année. C'est, en géné-
ral, dans les dernières années de l'accroissement,
et même de la dixième à la vingtième, que le rouge
est le plus brillant, le plus rutilant.

Dans l'adulte, cette couleur présente un phénomène bien remarquable : tous les hommes ont leur muscles rouges, mais à peine deux offrent-ils la même nuance. Ceux qui ont fait beaucoup d'ouvertures de cadavres ont pu s'en convaincre; le séjour des amphithéâtres prouve cette assertion. Mille causes peuvent influencer cette couleur : le tempérament est la principale. L'habitude extérieure de l'écorché indique le tempérament aussi bien que les tégumens par leurs nuances de couleur. Les maladies la font aussi prodigieusement varier. Toutes celles qui affectent une marche chronique l'altèrent singulièrement; elle pâlit alors et devient terne, etc. Les hydropisies la blanchissent, pour ainsi dire, quand elles sont très-anciennes. En général, tout ce qui porte sur les forces de la vie une influence lente et affaiblissante diminue la vivacité de cette couleur. Les maladies aiguës, quelle que soit leur nature, la changent peu. Les fièvres, avec la prostration la plus marquée, si elles déterminent tout à coup la mort, la laissent intacte, parce que cette couleur ne peut changer que par la nutrition : or, comme cette fonction est lente dans ses phénomènes, elle n'est que peu troublée par les maladies très-aiguës; ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle se ressent des affections régnantes dans l'économie.

Je remarque que les variétés de couleur qu'on observe dans les muscles des adultes, même dans l'état sain, les distinguent spécialement de ceux des fœtus, lesquels ont en général une pâleur uniforme. Cette différence tient à ce que, dans le pre-

ier âge, nous ne sommes point sujets à l'action e cette foule d'agens qui modifient d'une manière ifiniment variable, dans les âges suivans, les andes fonctions, et par là même la nutrition qui n est le terme. C'est dans ces variétés de couleur u système musculaire de l'adulte qu'on distingue en que le sang circulant dans les artères y est ab-lument étranger : en effet il est uniforme, et ne rticipe jamais à ces variétés de coloration, quelles u'elles soient.

Beaucoup de circonstances, chez l'adulte, font rier la nutrition musculaire; le mouvement est la incipale. L'homme qui passe sa vie dans le repos t remarquable par le peu de saillie de ses mus-es, surtout si on compare cette saillie à celle des uscles de l'homme qui prend un grand exercice. on-seulement le mouvement général offre ce phé-omène, mais encore le mouvement local, comme n le voit dans les bras des boulangers, dans les mbes des danseurs, dans le dos du portefaix, etc.

IV. *État du Système musculaire chez le vieillard.*

Dans le vieillard, le tissu des muscles change ngulièrement; il devient résistant et coriace : la ent le déchire avec peine. Cette densité trop grande uit à ses contractions, qui ne peuvent plus se ire qu'avec lenteur: l'action du cerveau devient oindre sur les muscles; la durée de leurs mou-emens n'est plus aussi prolongée; ils se fatiguent us vite.

Je remarque que la densité des muscles ne do point se confondre avec leur cohésion. Elle dépen des substances qui entrent dans la composition d muscle. La cohésion paraît tenir au contraire à l'in fluence vitale, dont l'effet se conserve après l mort. Disséquez les muscles d'un adulte fort et v goureux: la masse charnue est ferme, elle rest dans sa place; elle se soutient par elle-même, quo que le scalpel l'ait isolée de tout le tissu enviro nant. Au contraire, dans un cadavre mort de mal die chronique, dans un hydropique, un phth sique, etc., les muscles sont lâches, et ne peuver se soutenir; les rapports se perdent dès que le tiss environnant est enlevé. Autant les premiers suje sont avantageux à la dissection de la myologie, au tant ceux-ci y sont peu propres. Le tissu muscu laire est, chez les vieillards, à peu près comm chez ces derniers, flasque et lâche: on sent cett flaccidité sous la peau dans le soléaire, les jumeau le biceps, etc.; elle n'empêche pas que chaqu fibre ne soit dense, coriace, etc. En général, l cohésion musculaire est en raison inverse de l'âge les muscles du jeune homme sont fermes, serrés ils ne sont point mobiles sous la peau. Vers la qua rantième année et au-delà, on commence à aperc voir plus de laxité: les gras de jambes vaciller dans les grands mouvemens; les fessiers et en gé néral tous les membres saillans présentent aus déjà cette vacillation, surtout si l'individu es maigre. Les muscles deviennent de plus en plu susceptibles de se mouvoir ainsi, à mesure qu'o approche de la vieillesse, époque où le moindr

rouvement fait vaciller tout le système musculaire. Pourquoi ? parce que le muscle n'est plus en contraction suffisante ; il est, pour ainsi dire, trop long pour l'espace qu'il remplit. Cela paraît tenir à ce que la contractilité de tissu a diminué dans le dernier âge : on peut s'en convaincre en coupant transversalement un muscle dans le vieillard et le jeune homme comparativement, il se retire plus, en effet, en sens opposé dans le second que dans le premier. Cette contractilité de tissu rapprochait toutes les molécules du muscle pendant son repos : elle ne peut plus produire ce rapprochement ; il reste lâche. Les auteurs n'ont point assez observé ce phénomène remarquable qu'éprouve le système musculaire par les progrès de l'âge, phénomène qui est réellement l'indice de son degré de force contractile.

Le vieillard présente fréquemment dans le tissu musculeux une altération telle, que celui-ci a perdu sa couleur, pour prendre un jaune peu foncé, et une apparence graisseuse, quoique cependant cette couleur ne dépende point de la graisse, mais de l'absence de la substance colorante du sang. J'ai souvent fait cette remarque. Si on dépouille de toute graisse environnante ces prétendus muscles graisseux, et qu'on ne leur laisse que leur tissu, la combustion ou l'ébullition n'en retire point d'huile animale ; ils sont dans leur état fibreux comme à l'ordinaire ; la couleur seule est différente. J'ai remarqué que les muscles profonds du dos, ceux placés dans les gouttières vertébrales, sont beaucoup plus sujets que tous les autres à perdre

leur couleur et à se présenter sous cet aspect ja nâtre; aspect qui ne s'observe presque jamais s tout le système, mais seulement sur quelques mu cles isolés. Les adultes sont sujets, comme les vie lards, quoique moins fréquemment cependant, cette altération. Plusieurs fois, dans les membr atrophiés, on a trouvé que leur aspect est à p près analogue. Dans les paralysies récentes, da celles même qui datent de trois, quatre et s mois, il n'y a en général rien de changé dans l membres, les muscles conservent et leur coule et leur volume; mais au bout d'un temps pl long, l'absence du mouvement, peut-être aussi défaut de l'influx nerveux, finissent par altérer nutrition restée long-temps intacte sans cet influ et alors les muscles se décolorent, se resserren diminuent. Mais ce phénomène n'est pas mên toujours constant, et il y a à l'Hôtel-Dieu des h miplégies de six, sept, et même dix ans, sans q le membre du côté sain prédomine par sa nutritic sur celui du côté malade.

Les pressions extérieures long-temps continué sur un muscle produisent à peu près le même eff que l'atrophie; elles le décolorent et le blanchi sent en y empêchant la circulation. Ceux qui s servent de bretelles habituellement passées so les bras, qui portent constamment des ceintur autour de l'abdomen, qui soulèvent des fardeaux ont souvent les muscles correspondans aux pre sions habituelles qu'ils éprouvent, dans l'état d ceux des vieillards. Je remarque que ces muscl se contractent cependant; ce qui prouve bien qu

substance colorante n'est pas d'une nécessité ab-
olue à l'action musculaire.

Le sang se porte, en général, en beaucoup moin-
re quantité dans les muscles des vieillards : leurs
aisseaux s'obstruent en partie : c'est ce qui les dis-
ose à l'état dont je viens de parler.

§ V. *État du Système musculaire à la mort.*

A l'instant de la mort, les muscles restent dans
eux états différens : tantôt ils sont raides et in-
exibles, tantôt ils laissent exécuter aux membres
es mouvemens assez faciles. Il faut quelquefois
eaucoup d'effort pour ployer la cuisse d'un ca-
avre ; d'autres fois la moindre secousse la fait flé-
hir, comme, par exemple, dans les asphyxies
ar le charbon. Ces états de rigidité ou de relâ-
hement ont des degrés infinis. L'un est porté quel-
uefois au point que, relevé contre un mur, le
ujet reste debout ; d'autres fois il est nul. Cer-
ains muscles sont raides sur des sujets, tandis que
'autres restent lâches. Il paraît que ces états di-
ers dépendent de l'espèce de mort, des phéno-
ènes qui accompagnent les derniers soupirs (1).
Mais comment arrivent-ils précisément? c'est un
bjet de recherches intéressant. J'ai remarqué que
es muscles restés raides à l'instant de la mort se
échirent souvent avec facilité, pour peu qu'on

(1) Pour des détails plus étendus, relativement à la raideur des
adavres, *voyez* une note placée plus haut. (F. Blandin.)

force les mouvemens des membres auxquels i vont se rendre; que la déchirure n'arrive, au co traire, presque jamais dans ceux restés souples quelles que soient les impulsions communiquées leurs points mobiles; il faut les tirailler directe ment, y suspendre des poids, etc., pour produir ce phénomène qui alors est facile.

Le tissu musculaire ne se développe jamais acci dentellement dans les divers organes où la natur ne l'a point primitivement placé, comme cela ar rive aux tissus osseux, cartilagineux et même fi breux. Il s'y développerait, qu'il n'appartiendrai point à la vie animale, mais à l'organique : car pour dépendre de la première, les nerfs cérébrau sont essentiellement nécessaires, le muscle n'étan que l'agent des mouvemens que ceux-ci commu niquent (1).

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Les altérations que peuvent éprouver les muscles de la vi animale seront décrites avec celles des muscles de la vie organique. (BÉCLARD.)

SYSTÈME MUSCULAIRE
DE LA VIE ORGANIQUE.

Ce système n'est point aussi abondamment ré-
andu dans l'économie que le précédent. La masse
otale qu'il représente, comparée à la masse totale
e celui-ci, qui forme plus du tiers du corps, offre
ous ce rapport une différence très-remarquable. Sa
osition est aussi différente : il est concentré, 1° dans
poitrine, où le cœur et l'œsophage lui appar-
ennent; 2° dans le bas-ventre, où l'estomac et
s intestins sont en partie formés par lui; 3° dans
bassin, où il concourt à former la vessie et même
matrice, quoique celle-ci appartienne à la géné-
tion, qui est une fonction distincte de la vie
rganique. Ce système occupe donc le milieu du
onc, est étranger aux membres, et se trouve loin
e l'action des corps extérieurs; tandis que l'autre,
perficiellement situé, formant presque seul les
embres, semble, comme nous l'avons dit, pres-
ue autant destiné, dans le tronc, à protéger les
tres organes, qu'à exécuter les divers mouve-
ens de l'animal. La tête ne renferme point de
vision du système musculaire organique; cette
gion du corps est toute consacrée aux organes de
vie animale.

ARTICLE PREMIER.

DES FORMES DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

Tous les muscles du système précédent affecte en général une direction droite : ceux-ci sont tou au contraire, recourbés sur eux-mêmes; ils repr sentent tous des poches musculaires différemme contournées, tantôt cylindriques comme aux int tins, tantôt coniques comme au cœur, tantôt arro dies comme à la vessie, quelquefois très-irrég lières comme à l'estomac. Aucun n'est attaché a os; tous sont dépourvus de fibres tendineuses. L fibres blanches naissant de la surface intérieure cœur, et allant se fixer aux valvules de ses vent cules, n'ont nullement la nature des tendons : l bullition ne les réduit point facilement en gélatin la dessiccation ne leur donne point l'aspect jaunât de ces organes; elles résistent plus qu'eux à la m cération (1).

C'est, en général, un grand caractère qui disti gue le système musculaire organique d'avec celui

(1) La seule différence qui me paraisse exister entre les fib tendineuses du cœur et les tendons proprement dits, réside d leur disposition extérieure : elle est fondée sur ce que ces fib se terminent à la surface des faisceaux charnus dans le cœ tandis que les tendons se prolongent ordinairement dans l'épa seur des muscles. (Béclard.)

vie animale, de ne point naître des organes breux, de ne point se terminer à eux. Toutes les bres de celui-ci sont continues ou avec des tendons, ou avec des aponévroses, ou avec des membranes fibreuses. Presque toutes celles du premier artent, au contraire, du tissu cellulaire, et viennent s'y rendre de nouveau après avoir parcouru eur trajet. J'avais cru d'abord que la couche dense t serrée qui est entre la membrane muqueuse et es fibres charnues des intestins, de la vessie, de estomac, etc., était l'assemblage et l'entrecroisement d'une foule de petits tendons correspondant ces fibres, et entrecroisés en forme d'aponévrose : a densité de cette couche m'en avait imposé au remier coup d'œil. L'ébullition, la macération, a dessiccation m'ont appris depuis que, complétement étrangère au système fibreux, cette couche levait être, ainsi que Haller l'a dit, rapportée au ellulaire, qui est plus dense seulement et plus erré là qu'ailleurs. C'est cette couche que j'ai désignée, dans le système cellulaire, par le nom de issu *sous-muqueux*. Plusieurs fibres du système qui nous occupe paraissent former une courbe entière, et qui n'est traversée par aucune intersection cellulaire : quelques plans du cœur offrent cette disposition (1), laquelle est, en général, très-rare ; en sorte

(1) Il n'y a dans le cœur de fibres décrivant une courbe entière, que celles qui entourent en manière de *sphincters* les orifices veineux des oreillettes : sans doute, ce sont ces fibres dont Bichat entend parler. Toutes les autres, après avoir suivi une

qu'il y a presque toujours origine et terminaiso des fibres sur un organe de nature différente d la leur.

On ne peut guère considérer d'une manière ge nérale les formes du système qui nous occupe : ch que organe lui appartenant se moule sur la form du viscère à la formation duquel il concourt. E effet, les muscles organiques n'existent point e faisceaux isolés comme ceux de la vie animale ; tous excepté le cœur, ne sont que pour un tiers, u quart, souvent même pour moins, dans la struc ture d'un viscère.

Le plus grand nombre est à forme mince, plat et membraneuse. Ce sont des couches plus ou moin larges, et presque jamais des faisceaux caractérisés Placées les unes à côté des autres, les fibres son très-peu superposées : de là vient qu'occupant un très-grande étendue, ces muscles ne forment cepen dant qu'un très-petit volume. Le grand fessier seul serait plus considérable que toutes les fibres de l'es tomac, des intestins et de la vessie, si elles étaient réunies comme lui en un faisceau épais et carré.

---

marche spiroïde, très-marquée, comme Senac et Wolf l'avaient indiqué clairement, mais comme il résulte surtout des travaux plus récens de mon ami le docteur Gerdy, se terminent par leurs extrémités d'une manière plus ou moins immédiate sur les zones fibreuses artérielles et auriculo-ventriculaires que l'on trouve à la base du cœur. (F. Blandin.)

ARTICLE II.

ORGANISATION DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

L'organisation des muscles involontaires n'est pint aussi uniforme que celle des précédens. Aux différences près, dans ceux-ci, de la proportion des fibres charnues sur les tendineuses, de la longueur des premières, de la saillie de leur faisceau, de leur assemblage en muscles plats, longs ou courts, tout y est exactement semblable : en quelque endroit qu'on les examine, leurs variétés portent sur les formes et non sur la texture. Ici, au contraire, il y a dans cette texture des différences marquées : le cœur comparé à l'estomac, les intestins mis en parallèle avec la vessie, suffisent pour en convaincre. C'est en vertu de ces différentes textures, que la contractilité et la sensibilité varient, comme nous le verrons, dans chaque muscle, que la force de contraction n'est pas la même, que la vie est différente pour chacun, tandis qu'elle est uniforme pour tous ceux de la vie animale. Nous allons cependant considérer d'une manière générale l'organisation des muscles involontaires.

§ Ier. *Tissu propre à l'Organisation du Système musculaire de la vie organique.*

La fibre musculaire organique est, en général, beaucoup plus mince et plus déliée que celle du sys-

tème précédent; elle n'est point assemblée en fai ceaux aussi épais. Très-rouge dans le cœur, el est blanchâtre dans les organes gastriques et u naires. Au reste, cette couleur varie singulièr ment. J'ai observé que quelquefois la macérati la rend d'un brun foncé sur les intestins.

Jamais cette fibre n'est à direction unique, comn celle des muscles précédens; elle s'entrecroise to jours, ou se trouve juxtaposée en divers sens: ta tôt c'est à angle droit que se coupent les faisceau comme dans les fibres longitudinales et circulair des tubes gastriques; tantôt c'est sous des angl plus ou moins obtus ou aigus, comme à l'est mac, à la vessie, etc. Au cœur, cet entrecrois ment est tel, dans les ventricules, que c'est u véritable réseau musculaire (1). De ces variétés direction résulte un avantage pour les mouveme de ces sortes de muscles, qui, étant tous creu peuvent en se contractant diminuer suivant pl sieurs diamètres l'étendue de leur cavité.

Les fibres musculaires organiques sont, en gén ral, courtes. Celles qui, comme les longitudinal de l'œsophage, du rectum, etc., paraissent parcour un long trajet, ne sont point continues; elles nai

---

(1) Ce passage montre évidemment que les idées de Bicha relativement à la texture du cœur, étaient loin de la vérité. l effet, il n'y a pas dans le cœur d'entrecroisement des fibres réseau, ou plutôt cet entrecroisement n'existe qu'en apparen (*Voyez* le Mémoire de M. Gerdy inséré dans les Bulletins l'ancienne Société de la Faculté.) (F. Blandin.)

ent et se terminent dans de courts espaces, pour naître et se terminer ensuite suivant la même gne : aucune n'est comparable à celle du coutu-er, du grêle interne, etc., sous le rapport de la ngueur.

Nous ne connaissons pas mieux leur nature que elle des fibres de la vie animale ; mais, du reste, les se comportent à peu près de même sous l'ac-on des différens réactifs. La dessiccation, la pu-éfaction, la macération, l'ébullition y présen-nt les mêmes phénomènes. J'ai observé, au sujet e cette dernière, qu'une fois bouillies, les fibres e l'un et de l'autre systèmes sont beaucoup moins ltérables par les acides suffisamment affaiblis. près un certain séjour dans le sulfurique, le mu-iatique, le nitrique, étendus d'eau, elles se ra-ollissent bien un peu, mais elles gardent leur orme primitive, et ne se changent point en cette ulpe à laquelle se réduisent toujours dans la même xpérience les fibres crues. Le dernier de ces aci-les les colore en jaune comme avant l'ébullition.

J'ai fait aussi une observation à l'égard du racor-nissement qui est produit à l'instant où commence 'ébullition : c'est qu'il est constamment le même, quels que soient la dilatation ou le resserrement antécédens des fibres. L'estomac, resté assez dilaté à la mort pour contenir plusieurs pintes de li-quide, se réduit au même volume, toutes choses égales, que celui resserré au point de n'être pas plus gros que le cœcum. Les maladies influent un peu sur le racornissement : le cœur d'un phthisi-que m'a présenté ce phénomène, dans la même expé-

rience, bien moins sensiblement que celui d'un ap plectique.

La résistance de la fibre musculaire organiq est, à proportion, plus grande que celle des fibr du système musculaire animal. Quelle que s l'extension des muscles creux par le fluide qui l remplit pendant la vie, il ne s'y fait presque jama de ruptures.

La vessie seule présente quelquefois ce phén mène, qui du reste y est très-rare (1). Dans les gra des rétentions d'urine, où il se fait des crevasses c'est presque toujours l'urètre qui se rompt, vessie restant intacte. Il y a dans la pratique ce fistules au périnée, venant de la portion mem braneuse, pour une au-dessus du pubis. On trouv dans les auteurs beaucoup d'exemples de ruptur du diaphragme ; on en connaît peu de déchirur à l'estomac, aux intestins et au cœur.

---

(1) Les crevasses de la vessie par excès de distension, dans le cas de rétention d'urine, sont en effet fort rares ; mais lorsqu'o les observe elles ne fournissent point d'exemple de la rupture de fibres charnues de cet organe. En effet, rassemblées en faisceaux o colonnes de grosseur inégale, ces fibres résistent très-fortement la distension ; et pendant ce temps la muqueuse vésicale fai hernie dans leurs interstices, et se rompt seule ou avec la séreuse qu'elle soulève lorsque la hernie se fait de son côté.

(F. Blandin.)

§II. *Parties communes à l'organisation du Système musculaire de la vie organique.*

Le tissu cellulaire est, en général, beaucoup pus rare dans les muscles organiques que dans les atres. Les fibres du cœur sont juxtaposées, plut qu'unies par ce tissu. Il est un peu plus marqué dans les muscles gastriques et urinaires (1); i est presque nul dans la matrice : aussi ces muscles ne s'infiltrent-ils point comme les précédens dns les hydropisies; jamais ils ne présentent cet éit graisseux dont nous avons parlé, et qui étouffe, pur ainsi dire, quelquefois les fibres. Je n'ai point oservé non plus, dans ces muscles, la teinte jaunitre que les fibres des autres prennent souvent, dns les gouttières vertébrales surtout.

Les vaisseaux sanguins sont très-multipliés dans c système; ils s'y trouvent même, à proportion, pus abondans que dans l'autre : plus de sang les pnètre par conséquent. Ce fait est remarquable srtout aux intestins, où, pour un plan charnu etrêmement mince, les mésentériques distribuent ue foule de rameaux. Mais je remarque que cette aparence est jusqu'à un certain point illusoire,

---

(1) Ce tissu devient plus apparent par divers procédés : on pt le gonfler par la macération, ou le distendre par l'insufflat n pratiquée soit dans le tissu cellulaire extérieur aux fibres, s t par les veines. Le cœur en présente de très-distinct quand i bouilli. (Béclard.)

attendu que beaucoup de ces vaisseaux, ne faisa que traverser le plan charnu, vont à la membra muqueuse. Dans l'état ordinaire, ils donnent a viscères gastriques une teinte rosée, qu'on rend volonté livide, et qu'on ramène ensuite à son a pect primitif, en fermant et en ouvrant ensuite robinet adapté à la trachée-artère, dans mes exp riences sur l'asphyxie.

Les absorbans et les exhalans n'ont rien de pa ticulier dans ces muscles.

Les nerfs leur viennent de deux sources, 1° d système cérébral, 2° de celui des ganglions.

Excepté dans l'estomac, où se distribue la pai vague, les nerfs des ganglions prédominent pa tout. Au cœur, ils sont les principaux; aux inte tins, ils existent seuls; à l'extrémité du rectum de la vessie, leur proportion est supérieure à cel des nerfs venant de l'épine.

Les nerfs cérébraux s'entrelacent avec ceux-ci en pénétrant dans les muscles organiques. L plexus cardiaque, solaire, hypogastrique, etc. résultent de cet entrelacement, qui paraît avo une influence sur les mouvemens, quoique no ignorions la nature de cette influence.

Tous les nerfs des ganglions qui pénètrent dan les muscles organiques ne leur paraissent pas exclu sivement destinés. Un grand nombre de filet n'appartiennent qu'aux artères : tel est en effet leu entrelacement, qu'ils forment, comme nous l'a vons vu, autour de ces vaisseaux, une véritabl membrane nerveuse surajoutée aux leurs, et qu leur est exclusivement destinée. Je compare cett

eveloppe nerveuse à l'enveloppe cellulaire qui se
ouve aussi autour des artères, et qui est abso-
lment distincte du tissu cellulaire environnant :
ainsi celle-ci n'a-t-elle que des communications
avec les nerfs des muscles organiques, sans se
distribuer dans ces muscles. Au reste, comme les
nerfs des ganglions y sont toujours les plus nom-
breux et les plus essentiels, et que leur ténuité
est extrême, la masse nerveuse destinée à chacun
est infiniment inférieure à celle qui se trouve dans
les muscles volontaires. Le cœur et le deltoïde,
comparés ensemble, offrent sous ce rapport une
remarquable différence.

ARTICLE III.

PROPRIÉTÉS DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

Sous le rapport des propriétés, ce système est en
partie analogue au précédent, et en partie très-dif-
férent de lui.

§ Ier. *Propriétés de tissu. — Extensibilité.*

L'extensibilité est très-manifeste dans les mus-
cles organiques. La dilatation des intestins et de
l'estomac par les alimens, par les gaz qui s'y déve-
loppent, par les fluides qui s'y rencontrent; celle
de la vessie par l'urine, par les injections qu'on y

pousse, etc., dérivent essentiellement de cette e tensibilité.

Cette propriété est caractérisée ici par deux att buts remarquables, 1° par la rapidité avec laquel elle peut être mise en jeu, 2° par l'étendue trè grande dont elle est susceptible.

L'estomac, les intestins passent en un insta d'une vacuité complète à une grande extensio Artificiellement distendue, la vessie prend tout d suite un volume triple, quadruple même de cel qui lui est naturel. Cependant quelquefois elle r siste; mais cela ne prouve point son défaut d'exter sibilité; c'est que le fluide injecté l'irrite et la fa contracter : la contractilité organique en exercic empêche alors le développement de l'extensibilité comme elle-même ne peut quelquefois être mis en jeu par les irritans sur un muscle mis à décou vert dans un animal vivant, parce que la contrac tilité animale en exercice dans ce muscle y form obstacle. Les muscles de la vie animale ne sont ja mais susceptibles de cette rapidité dans leur exten sibilité, soit parce qu'ils sont entrecoupés par d nombreuses aponévroses qui ne se dilatent qu lentement, soit parce que leurs plans de fibres son trop épais, double circonstance qui n'existe poin dans les muscles de la vie organique. De là un phé nomène remarquable que j'ai observé dans toute les tympanites : lorsqu'on ouvre le bas-ventre de sujets morts en cet état, sans intéresser les intes tins boursouflés, aussitôt ceux-ci font irruption au dehors, se gonflent davantage, et occupent un es pace double de celui où ils étaient resserrés dan

bas-ventre. Pourquoi ? parce que les parois de l'bdomen n'ayant pu céder en proportion de la qantité des gaz qui se sont développés, ceux-ci ot été comprimés dans les intestins pendant la v, et se dilatent tout de suite par leur élasticité, lsque la cause de compression cesse. Dans les hydrosies, où la distension est lente, les parois abdoinales s'agrandissent beaucoup plus que dans la mpanite. Le volume du ventre serait double dans lle-ci, si l'extensibilité de ses parois était proprtionnée à celle des intestins (1).

Quant à l'étendue de l'extensibilité des muscles ganiques, on peut s'en former l'idée en compaant l'estomac vide, qui souvent n'est pas plus gros ue le cœcum dans son état ordinaire, à l'estomac ontenant quelquefois cinq, six, huit pintes même e fluide; la vessie retirée sur elle-même et cachée errière le pubis, à la vessie pleine d'urine, dans ne rétention, remontant quelquefois au-dessus de ombilic; le rectum vide, au rectum remplissant

---

(1) C'est un fait incontestable, sans doute, que les intestins sont lus rapidement susceptibles d'une grande dilatation que les parois bdominales : mais cela prouve-t-il que les fibres des muscles de vie organique sont plus extensibles que celles des muscles de la ie animale ? Je ne le pense pas. Cette différence dépend seulement de la différence des deux parties sous le rapport du nombre es fibres. D'un côté, vous voyez peu de fibres, et par conséquent peu de tension de tissu à vaincre par la puissance expansive; de l'autre, au contraire, apparaît une disposition toute nverse, qui doit amener nécessairement un obstacle inverse à la lilatation. (F. Blandin.)

une partie du bassin chez les vieillards où les excr mens s'y sont accumulés; les intestins contracté aux intestins fortement météorisés.

C'est à l'étendue de l'extensibilité des muscl organiques et aux bornes mises à celle des parc abdominales, qu'il faut rapporter un phénomè constant qu'on observe dans les viscères gastriqu savoir, que, dans la série naturelle de leurs fon tions, ils ne sont jamais tous distendus en mêr temps : les intestins se remplissent quand les m tières contenues dans l'estomac s'évacuent; la vess n'est pleine d'urine, dans l'ordre digestif, q quand les autres organes creux se vident, etc. I général, c'est un état contre nature que celui tous les organes sont distendus à la fois.

Il est, pour les muscles organiques, un mo d'extensibilité tout différent de celui dont je vie de parler : c'est celui du cœur dans les anévry mes, de la matrice dans la grossesse. Le premi prend, par exemple, un volume double, trip même quelquefois dans sa partie gauche, et cepe dant il croît en même temps en épaisseur. Ce vol me n'est pas dû à une distension, mais bien à u accroissement contre nature. Le cœur anévrysmat que est au cœur ordinaire ce que celui-ci est a cœur de l'enfant; c'est la nutrition qui a fait différence, et non la distension : car toutes les fo que celle-ci agit, elle diminue en épaisseur ce qu'el augmente en étendue; il n'y a pas addition de sub stance. D'ailleurs, le cœur anévrysmatique n'a so vent point de cause qui le distende, car commun ment dans ce cas les valvules mitrales laissent u

lire passage au sang; tandis que, lorsqu'elles sont ossifiées, le ventricule gauche reste souvent dans l'état naturel (1). D'ailleurs, la marche lente de la formation de l'anévrysme prouve bien que c'est une nutrition contre nature qui a présidé à cet accroissement du cœur. Vous auriez beau vider alors cet organe du sang qu'il contient, il ne reviendrait point sur lui-même, et ne reprendrait point ses dimensions, comme l'intestin météorisé qu'on pique pour en faire sortir l'air.

Dans la matrice, il y a deux causes de distension : 1° les sinus largement développés, et contenant beaucoup de sang; 2° une addition de substance, un véritable accroissement momentané des fibres de l'organe, qui reste aussi épais et même plus que dans l'état naturel. A l'époque de l'accouchement, les sinus s'affaissent tout à coup par la contraction des fibres : de là le resserrement subit de l'organe. Mais comme, d'un côté, la nutrition seule peut enlever par la décomposition les substances ajoutées aux fibres pour les grossir, et que, d'un autre côté, cette fonction s'exerce lente-

(1) Il est fort rare que le cœur conserve son état normal, sous tous les autres rapports, lorsque la valvule *mitrale* est ossifiée. Alors, en effet, tantôt le sang éprouve une gêne considérable à passer dans le ventricule, tantôt il s'y rend facilement, mais reflue en grande proportion dans l'oreillette, suivant que les deux replis de cette soupape auriculo-ventriculaire gauche, soudés ensemble en grande partie, rétrécissent beaucoup l'ouverture, ou que ces valves, se trouvant couchées vers le ventricule et retenues par les tendons ossifiés des colonnes charnues, ne diminuent

ment, après que la matrice a éprouvé le resser ment subit dû à l'affaissement des sinus, elle ne vient que peu à peu et au bout d'un certain ten à son volume ordinaire. L'extensibilité n'est d point mise en jeu dans la matrice remplie pa fœtus (1), et dans le cœur anévrysmatique : ces or nes deviennent vraiment alors le siége d'une nu tion plus active : ils croissent accidentelleme comme ils ont cru naturellement avec les aut organes; mais ceux-ci n'éprouvant point alors phénomène analogue, ils deviennent monstru

---

point l'ouverture, mais sont impuissantes pour la fermer. D tous les cas, c'est surtout l'oreillette qui éprouve des difications dans son volume, sa forme et sa texture; l'on conçoit facilement comment Bichat a pu trouver a le ventricule gauche *dans son état naturel ;* mais cela prouve pas que la distension du cœur par le sang ne soi source des hypertrophies variées, avec ou sans dilatation, présentent si souvent les diverses parties du centre circulato L'expérience récemment acquise établit au contraire une d trine inverse. La distension du cœur par le sang produit m niquement la dilatation simple du cœur; mais le plus sou cet organe réagissant pour se débarrasser du fluide qui l'obstr subit un accroissement de nutrition sous l'influence de cet ex cice lui-même accru, et à la dilatation mécanique primi s'ajoute une hypertrophie plus ou moins apparente. Toutef il est une hypertrophie du cœur sans dilatation, qui n'a poin source dans une distension du cœur, mais qui tient à une ex tation d'un autre genre : c'est à cette lésion seulement que p s'appliquer le raisonnement de Bichat. (F. Blandin.

(1) Sans doute, c'est principalement sous l'influence d'une vé table hypertrophie de ses parois, que la matrice distendue par le p duit de la conception acquiert le volume énorme qu'on lui conn

mparativement. La matrice décroît parce que le uvement de décomposition prédomine naturelle-nt sur celui de composition après l'accouche-nt, tandis qu'avant cette époque c'était l'inverse. L cœur anévrysmatique reste toujours tel.

C'est ici le cas de bien distinguer ces dilatations cœur de celles produites réellement par l'ex-nsibilité, comme dans l'oreillette et le ventricule oits, par exemple, qui se trouvent pleins de sang 'instant de la mort, parce que le poumon, qui ffaiblit, ne permettant plus à ce fluide de le tra-rser, le force de refluer vers l'endroit d'où il nt. Il est peu de cœurs qui ne présentent, à des grés très-variables, ces dilatations, qu'on est aître d'augmenter ou de diminuer à volonté, sur animal vivant, suivant l'espèce de mort dont le fait périr. Deux cœurs ne présentent presque nais le même volume dans les cadavres : une le de variétés se rencontrent, et ces variétés dé-ndent du plus ou du moins de difficultés qu'a la g, dans les derniers momens, à traverser le umon. Voilà pourquoi, dans les affections du ur, on manque d'un type auquel on puisse com-rer le volume maladif, surtout si on examine

---

is il est impossible de mettre en doute la part que prend l'œuf es phénomènes, par la distension qu'il produit sur tout l'or-ne : l'effacement progressif d'abord, et plus tard, la dilatation jours croissante du col de l'utérus en sont la preuve. Au reste, comme au cœur, le contenu produit une distension excitante, devient pour le contenant la cause d'une hypertrophie, que l'on bserve alors que d'une manière consécutive. (F. Blandin.)

l'organe en totalité. En effet, la distension du cô droit peut lui donner une apparence anévrysm tique, et un volume même supérieur à celui certains anévrysmes. Si on considère isolément côté gauche, l'erreur est, dans cette maladie, pl facile à vérifier, parce que ce côté est sujet à moindres variations. Mais la différence principa consiste dans l'épaisseur. La vigueur de contractic paraît croître en proportion de cette épaisseur, q naît de la substance ajoutée par la nutrition. C'e cette vigueur qui détermine les battemens si pr noncés qui se font sentir sous les côtes, la force pouls, etc.

Contractilité.

Elle est proportionnée à l'extensibilité. Souve elle est mise en jeu dans l'état ordinaire : c'est vertu de cette propriété que l'estomac, la vessi les intestins, etc., se contractent, se resserrent s eux-mêmes, et offrent un volume si petit en co paraison de celui qu'ils présentent dans leur plé tude. En général, il n'y a aucun muscle, dans vie animale, qui soit susceptible d'avoir des extr mes aussi éloignés de resserrement et de contra tion, que ceux de la vie organique.

Il faut remarquer que la vie, sans avoir la co tractilité sous sa dépendance immédiate, puisq les intestins, l'estomac et la vessie se resserre après la mort lorsqu'on fait cesser leur distensio la modifie cependant d'une manière très-sensibl Les causes mêmes qui altèrent ou diminuent l

rces vitales influent sur elles; de là l'observation uivante, que tous ceux habitués à ouvrir des cadares ont pu faire : quand le sujet est mort subitement, et que l'estomac est vide, il est très-resserré ur lui-même; quand, au contraire, la mort a é précédée d'une longue maladie qui a affaibli s forces, l'estomac, quoique vide, reste flasque t se trouve très-peu revenu sur lui-même.

On doit considérer les substances contenues dans s muscles creux de la vie organique comme les éritables antagonistes de ces muscles; car ils n'ont oint de muscles qui agissent en sens opposé du ur. Tant que ces antagonistes les distendent, ils 'obéissent point à leur contractilité de tissu; dès u'ils cessent de les remplir, elle se met en jeu. e n'est point cependant sur cette propriété que oule le mécanisme de l'expulsion des matières ors de ces organes, comme des alimens hors de estomac et des intestins, de l'urine hors de la essie, du sang hors du cœur, etc. : c'est la contractilité organique qui préside à ce mécanisme. Il st facile de distinguer ces deux propriétés en exerice : l'une occasione un resserrement lent et graué, qui est sans alternative de relâchement; l'aure, brusque et prompte, consistant en une suite e relâchemens et de contractions, produit les mouemens péristaltique, de systole, de diastole, etc. 'est après que la contractilité organique a procuré 'évacuation des muscles creux, que la contractilité le tissu les resserre. Chez les individus morts par émorrhagie d'une grosse artère, le côté gauche et même le côté droit du cœur chassent tout le sang

qu'ils contiennent; vides ensuite, ils reviennent fortement sur eux-mêmes, et l'organe est très-petit. Au contraire, il est très-gros quand beaucoup de sang resté dans ses cavités le distend, comme dans l'asphyxie. Ce sont là les deux extrêmes; il est, comme je l'ai dit, une foule d'intermédiaires.

La contractilité de tissu est, dans le système qui nous occupe, proportionnée au nombre des fibres charnues. Ainsi, toutes choses égales, le rectum étant vide est retiré avec bien plus de force sur lui-même que les autres gros intestins, la rétraction des ventricules est bien supérieure à celle des oreillettes, et celle de l'œsophage est bien plus grande que celle du duodénum, etc., etc.

§ II. *Propriétés vitales.*

Elles sont presque en ordre inverse de celles du système précédent.

Propriétés de la vie animale. — Sensibilité.

La sensibilité animale est peu marquée dans les muscles organiques. On connaît l'observation rapportée par Harvey sur une carie du sternum qui avait mis le cœur à découvert : on irritait, sans que le malade s'en aperçût presque, cet organe, qui se contractait seulement sous l'irritant. Enlevez le péritoine derrière la vessie d'un chien vivant, et irritez la couche musculeuse subjacente, l'animal donne peu de marques de douleur. Il est difficile de faire ces expériences sur les intestins et l'estomac; leur couche musculaire est si mince qu'on ne peut

agir sur elle sans agacer en même temps les nerfs subjacens.

Il paraît que les muscles organiques sont beaucoup moins susceptibles du sentiment de lassitude dont les précédens deviennent le siége après un grand exercice. Je ne sais cependant si, dans ceux où se rendent beaucoup de nerfs cérébraux, il n'a point lieu : par exemple, quand l'estomac a été long-temps resserré sur lui-même, il est probable que la lassitude qui s'empare de ses fibres détermine en partie le sentiment pénible que nous éprouvons alors, et que nous nommons *faim*, sentiment qu'il faut bien distinguer de l'affection générale qui lui succède, et qui devient véritablement une maladie lorsque l'abstinence est trop prolongée. On sait que des substances non nutritives apaisent alors ce sentiment sans remédier à la maladie, quand on en remplit l'estomac. Je rapporte au même mode de sensibilité l'anxiété et la gêne qu'éprouvent les malades dont on entretient la vessie en contraction permanente par une sonde ouverte qui séjourne dans l'urètre et qui transmet les urines à mesure qu'elles tombent des uretères (1). Cesentiment ne ressemble pas à celui de la faim, parce que, la sensibilité de la vessie et celle de l'estomac étant

(1) Cette gêne, cette anxiété qu'éprouvent les malades qui portent une sonde continuellement ouverte, tient bien plutôt à l'irritation et à l'inflammation produites par le double contact de l'air et de l'instrument sur la membrane muqueuse, contact tout-à-fait étranger à la sensibilité particulière de cette partie. Les douleurs cuisantes, la fièvre, les urines glaireuses et san-

différentes, leurs modifications ne sauraient être les mêmes. Ainsi chacun de ces deux sentimens est il différent de celui dont les muscles de la vie animale long-temps contractés deviennent le siége. Je ne crois pas que la sensation de la faim tienne uniquement à la cause que j'indique, et dont on n'a point parlé; mais on ne saurait disconvenir qu'elle n'y ait beaucoup de part. Qui sait si, après une fièvre où l'action du cœur a été long-temps précipitée, la faiblesse du pouls qui accompagne la convalescence n'est pas un signe de la lassitude où se trouvent ses fibres charnues, à cause du mouvement antécédent? On connaît le sentiment pénible de fatigue qu'éprouve l'estomac après les contractions du vomissement.

Contractilité.

La contractilité animale est étrangère aux muscles de la vie organique. Pour nous en convaincre, rappelons-nous que, d'un côté, cette contractilité suppose toujours l'influence du cerveau et des nerfs, pour mettre en jeu l'action du muscle; que, d'un autre côté, le cerveau, pour exercer cette influence, doit être excité par la volonté, par les irritans ou par les sympathies. Or, aucune de ces trois causes, agissant sur le cerveau, ne fait contracter les muscles organiques.

---

guinolentes que l'on observe dans ces circonstances, me paraissent jeter sur cette question un jour suffisant. (F. Blandin.)

Tout le monde sait que ces muscles sont essentiellement involontaires. Si quelques hommes ont eu jamais la faculté d'arrêter les mouvemens du cœur, ce n'est pas sur cet organe que le cerveau a agi : l'action du diaphragme et des intercostaux a été suspendue d'abord ; la respiration a cessé momentanément, puis, par contre-coup, la circulation (1).

Si on irrite le cerveau avec un scalpel ou un excitant quelconque, les muscles de la vie animale entrent en convulsion ; ils se paralysent, si on comprime cet organe. Ceux de la vie organique, au contraire, conservent leur degré de mouvement naturel dans l'un et l'autre cas. Le cœur continue

---

(1) Sans doute il existe une étroite liaison entre les fonctions du poumon et celles du cœur ; sans doute ces fonctions exercent les unes sur les autres une action réciproque, mais dans certaines limites ; et je ne pense pas que l'on soit en droit de soutenir aujourd'hui, avec Bichat, que la suspension momentanée de la respiration puisse faire cesser par contre-coup les contractions du cœur. Cet organe, en effet, se contracte long-temps encore chez un animal que l'on vient de sacrifier, en lui ouvrant largement la poitrine ; et cependant, dans cette expérience, on empêche immédiatement la respiration. Les individus qui ont joui de la singulière et rare faculté de suspendre volontairement les mouvemens du cœur chez eux, ont dû arriver à ce résultat d'une autre manière : peut-être avaient-ils quelques anomalies dans l'origine des nerfs cardiaques ? La chose serait possible. Si de semblables individus ont réellement existé, on pourrait supposer que chez eux le nerf cardiaque du pneumo-gastrique, plus développé que de coutume, exerçait une action insolite sur le centre circulatoire, et le mettait avec le système nerveux cérébro-spinal dans des relations bien plus marquées. (F. Blandin.)

encore à battre, les intestins et l'estomac se meuvent quelque temps après que la masse cérébrale et la moelle épinière ont été enlevées. Qui ne sait que la circulation se fait très-bien chez le fœtus acéphale; qu'après le coup qui a assommé un animal, et rendu tout son système musculaire volontaire immobile, le cœur s'agite encore long-temps, la vessie rejette l'urine, le rectum expulse les excrémens, etc., l'estomac même vomit quelquefois les alimens (1)? L'opium, qui engourdit toute la vie animale, parce qu'il agit spécialement sur le cerveau qui en est le centre, qui paralyse tous les muscles volontaires, laisse intacts les autres dans leurs contractions. L'ivresse produite par le vin présente le même phénomène : l'homme ivre chan-

---

(1) Ce passage de Bichat montre l'opinion qu'il professait relativement au vomissement : il considérait l'estomac comme produisant seul tous les phénomènes qui se rattachent à cet acte. Quoique aujourd'hui encore, malgré les expériences si belles et si concluantes de M. Magendie, quelques personnes n'aient pas d'opinion bien arrêtée sur le mécanisme du vomissement, cependant on ne saurait plus partager complétement le sentiment de Bichat à cet égard. Il n'est pas possible, en effet, de nier la part que prennent à cet acte les muscles abdominaux et le diaphragme. L'estomac, dont la contraction est essentiellement lente et vermiculaire, ne saurait, seul surtout, produire une action rapide et forte comme celle qui caractérise le vomissement ; il ne peut *vomir* seul, en un mot. Tout l'effet de la contraction de la tunique charnue de l'estomac se réduit à cette expulsion lente des matières qu'il contient, expulsion qui constitue la régurgitation, qu'il faut se garder de confondre avec le vomissement.

(F. Blandin.)

celle; ses membres refusent de le porter, et cependant son cœur bat avec force; souvent son estomac se soulève et rejette le superflu des fluides qui le remplissent. Toutes les substances narcotiques produisent aussi cet effet (1).

Si, des expériences, nous passons à l'observation des malades, nous voyons toutes les affections cérébrales étrangères au système musculaire organique. Les plaies de tête avec enfoncement, les fongus du cerveau, les épanchemens de sang, de pus et de sérosité, les apoplexies, etc., portent entièrement sur les muscles volontaires, dont ils exaltent, affaiblissent ou rendent nulle l'action. Au milieu du bouleversement général de la vie animale, l'organique est alors intacte. Les accès de manie, ceux de fièvre maligne, prouvent également ce fait. Qui ne sait que, dans ces dernières, le pouls n'est souvent presque pas changé, que quelquefois même il est plus ralenti (2)?

---

(1) L'opium et les autres substances narcotiques ont, pour la plupart, une double action sur notre économie : ils excitent d'abord, et plus tard ils produisent cet affaissement, cette torpeur qu'on appelle *narcotisme*. Dans le premier période de leur incubation au sein de nous-mêmes, le cœur, comme le système nerveux, se trouve surexcité, mais il est constant que plus tard il participe au narcotisme général, et qu'il ralentit ses contractions. Parmi les narcotiques, celui que l'on retire de la baie de l'*atropa belladona* exerce cette double action sur le cœur d'une manière bien tranchée et bien reconnue. (F. Blandin.)

(2) Ce ralentissement du cœur est une modification qui prouve au contraire directement l'influence des centres du sys-

Souvent, dans les maux de tête, il y a des vomis semens spasmodiques; le cœur précipite son actio dans les inflammations cérébrales, etc. Mais ce son là des phénomènes sympathiques, qui arrivent dan les muscles organiques comme ils surviennent dan tous les autres systèmes; ils peuvent ne pas se ma nifester, comme être développés; mille irrégulari tés s'observent dans leur marche; au lieu que l contraction des muscles de la vie animale par le affections du cerveau est un phénomène constant invariable, que rien ne trouble, dont rien n'em pêche le développement, parce que le moyen d communication est toujours le même entre l'organe affecté et celui qui se meut.

Si, dans l'examen des phénomènes relatifs à l'influence cérébrale sur les muscles organiques, nous suivons un ordre inverse, c'est-à-dire que, dans les affections de ces muscles, nous examinions l'état du cerveau, nous observons la même indépendance. Considérez la plupart des vomissemens, les mouvemens irréguliers des intestins qui ont lieu dans les diarrhées, ceux surtout qui forment les volvulus, etc.; voyez le cœur dans les agitations des fièvres, dans les palpitations irrégulières, dont il devient le siége fréquent, etc.: dans tous ces troubles

---

tème nerveux de la vie animale sur la contractilité des muscles de la vie organique. Les expériences de Legallois, au reste, si elles ne prouvent point tout ce que ce médecin habile a cru pouvoir en déduire, témoignent cependant d'une manière non équivoque en faveur de cette influence. (F. Blandin.)

es muscles organiques; vous ne trouverez presque ımais de signes de lésions à l'organe cérébral : il st calme, tandis que tout est bouleversé dans la ie organique. Cullen a cru que, dans les syncopes, action du cerveau cessait d'abord, et que celle du œur était suspendue consécutivement. C'est pré-isément l'inverse dans le plus grand nombre de ıs. Le cœur, d'abord affecté, cesse d'agir: or, on action étant essentielle à celle du cerveau, soit ar le mouvement qu'il lui communique, soit par sang rouge qu'il y pousse, ce dernier interrompt out à coup ses fonctions, et toute la vie animale esse. Cela est remarquable surtout dans les syn-opes qui naissent des passions, dans celles prove-ant des hémorrhagies, des polypes, des grandes vacuations, etc. Je renvoie, du reste, sur ce point mon *Traité de la vie et de la mort.*

Si de l'influence du cerveau nous passons à celle es nerfs, nous y trouvons de nouvelles preuves de ıbsence de contractilité animale des muscles orga-iques. La plupart de ces muscles reçoivent, comme ous avons vu, deux espèces de nerfs, les uns céré-raux, les autres des ganglions. Le cœur, l'esto-ıac, le rectum et la vessie, sont manifestement énétrés par la première espèce de nerfs : or, en cou-ant, en irritant d'une manière quelconque les fi-ts cardiaques de la paire vague, le cœur n'en orouve aucune altération; il n'est ni ralenti ni récipité dans son mouvement. La section des eux nerfs vagues est mortelle, il est vrai; mais ulement au bout de quelques jours, et je doute ue ce soit par le cœur que commence la mort

dans cette circonstance (1). Les principaux phén mènes qui sont la suite de cette section annoncer un très-grand embarras dans le poumon, un grande difficulté de la respiration; la circulatio paraît n'être troublée que consécutivement.

---

(1) Depuis Galien de nombreuses expériences ont été tenté sur les nerfs pneumo-gastriques, et toutes sont favorables à l' pinion émise ici par Bichat, savoir, que la mort, après leur se tion faite de l'un et de l'autre côtés à la fois, *ne commence p par le cœur*, bien que cet organe se trouve un peu lésé da ses fonctions. Cette terminaison funeste, qui ne manque jam de suivre l'expérience que je viens de signaler, ne saurait n plus résulter du trouble des fonctions de l'estomac, trouble o servé par une foule de physiologistes, et notamment par MM. B die et Dupuis. Mais il en est autrement des fonctions respiratoire elles éprouvent immédiatement une perturbation extrême, qui, lon moi, dépend principalement de la cessation de l'hématose et la difficulté avec laquelle le poumon, privé de ses nerfs propres, r git pour se débarrasser des liquides qui tendent à l'engorger, et l'obstruent bientôt, comme on le peut aisément constater après mort. Les recherches auxquelles je me suis livré sur la distrib tion des nerfs dans le larynx, ne me permettent point d'adop l'opinion qui représente la section des nerfs pneumo-gastriq au col comme produisant l'occlusion de la glotte, parce qu faite au-dessus des nerfs récurrens, elle abandonne l'ouvertu de la glotte à la merci de ses constricteurs, qui, dans ce opinion, recevraient leurs nerfs du seul *laryngé supérieur.* effet, nous avons reconnu que le nerf récurrent se distribue tous les muscles véritablement moteurs des lèvres de la glotte; alors il est clair que sa section, ou celle des pneumo-gastriq au milieu du col, peut bien produire l'aphonie, pui qu'elle pa lyse les lèvres de la glotte, mais qu'elle ne peut être suivie de l'c clusion de cette ouverture, surtout d'une occlusion telle que mort en soit la conséquence. (F. Blandin.)

Les mêmes nerfs se distribuant à l'estomac, la ième expérience sert à constater l'influence céré-rale sur ce viscère. Or, la section de celui d'un ôté est ordinairement nulle sur lui; celle de tous es deux y détermine bientôt un trouble remar-uable. Mais ce trouble est tout différent de celui ui suit la section du nerf d'un muscle de la vie nimale, lequel devient subitement immobile, andis qu'au contraire l'estomac, ne communi-uant plus avec le cerveau par les nerfs vagues, emble acquérir momentanément un surcroît de orce : il se contracte, et de là les vomissemens pasmodiques qui s'observent presque toujours endant les deux ou trois jours où l'animal survit l'expérience, vomissemens que j'ai constamment emarqués sur des chiens, et que déjà Haller et Cruikshank avaient indiqués. Il paraît donc que, uoique le cerveau ait une influence réelle sur l'es-omac, cette influence est d'une nature toute diffé-ente de celle qu'il exerce sur les muscles volon-aires. Je remarque cependant que l'irritation d'un les nerfs vagues, ou de tous les deux, fait tout de uite contracter l'estomac, comme cela arrive pour n muscle volontaire dont on a irrité le nerf. Il faut, our faire cette expérience, ouvrir l'abdomen d'un nimal vivant, et irriter ensuite la huitième paire lans la région du cou, afin d'avoir sous les yeux 'organe que l'on fait contracter.

La vessie et le rectum paraissent plus se rappro-cher des muscles volontaires, dans leur rapport vec le cerveau, que l'estomac et le cœur. On sait que les chutes sur le sacrum, d'où naît une com-

motion de la partie inférieure de la moelle, déter minent la rétention d'urine, qu'elles frappent pour ainsi dire, cet organe de la même paralysi que les membres inférieurs, qui alors cessent auss de se mouvoir. Cependant, comme la vessie es très-puissamment aidée dans ses fonctions par le muscles abdominaux, par le releveur de l'anus, e par d'autres muscles volontaires qui l'entourent l'immobilité de ces muscles entre pour beaucou dans le défaut d'évacuation des urines. Ce qui m le fait penser, c'est que, 1° l'irritation de l moelle vers sa partie inférieure, qui met en mou vement tous les muscles volontaires des membre inférieurs et du bassin, ne produit aucun effet su cette partie. Je me suis assuré de ce fait plusieur fois sur des cochons d'Inde et sur des chiens. 2° En irritant les nerfs venant des trous sacrés et allant la vessie, nerfs que souvent il est très-difficile d trouver, à cause du sang, dans un animal récem ment tué, j'ai vu ce muscle rester immobile. Au contraire, tous ces nerfs ayant été coupés, l'injec tion d'un fluide un peu irritant le fait contracte avec force. 3°. Dans les expériences sur les animau vivans, comme dans les opérations chirurgicales la violence des douleurs, qui met quelquefois tou les muscles de la vie animale dans des contraction spasmodiques, détermine fréquemment le jet in volontaire des urines. Or, dans ce cas, ce n'es point la vessie qui est agitée de convulsions : car si c'est dans une expérience que ce phénomène lieu, ouvrez les parois abdominales; à l'instant, l jet de l'urine s'arrête, parce que, d'un côté, les mus

es de ces parois ne peuvent agir sur les intestins
les presser contre la vessie, et que, d'un autre
té, le releveur de l'anus, qui se contracte et re-
ve cet organe, n'a aucun point résistant contre
quel il puisse le comprimer en haut. Remarquez
effet que, dans les jets un peu violens, la vessie
t placée entre deux efforts opposés : l'un supé-
eur, ce sont les viscères gastriques pressés par
diaphragme et par les muscles abdominaux;
utre inférieur, c'est spécialement le releveur de
nus, qui agit en se contractant de bas en haut,
ndis que l'effort opposé agit de haut en bas : or,
s deux efforts sont manifestement sous l'influence
rébrale. J'ai eu une infinité de fois occasion d'ob-
rver la vessie pleine d'urine sur un animal vivant
ont le ventre était ouvert: jamais je ne l'ai vue se
ntracter assez violemment pour expulser ce
uide (1).

Je ne disconviens pas que, par les nerfs qu'elle
çoit des plexus sacrés, la vessie ne soit, jusqu'à
n certain point, muscle volontaire; mais je dis
ue c'est principalement par les forces accessoires
ux siennes et nécessaires à ses fonctions, qu'elle
t soumise à la volonté; que la contractilité ani-

(1) La vessie, par sa seule contraction, peut suffire à l'excré-
on de l'urine dans une foule de circonstances. Souvent, en ef-
t, sur des animaux vivans dont l'abdomen était largement
uvert, ou même après la mort, la vessie, pleine d'urine, étant
traite du bassin et placée sur une table, j'ai vu cet organe se
ntracter brusquement, et rejeter au loin par un jet continu
ut le liquide qui le distendait. (F. Blandin.)

male est pour beaucoup plus dans ces fonctions q
la contractilité organique sensible. Comment do
les urines sont-elles retenues dans cet organe, c
expulsées de sa cavité à volonté? Le voici : quan
les urines tombent dans la vessie, qu'elles y so
depuis peu de temps d'une part, et de l'autre pa
en petite quantité, alors elles ne sont pas un irr
tant assez actif pour déterminer l'exercice de la co
tractilité organique sensible; l'effort que fait
vessie est si peu considérable qu'il ne peut su
monter la résistance de l'urètre, qui, resserré s
lui-même par la contractilité de tissu, doit êt
dilaté par l'impulsion communiquée aux urines
pour rendre ce fluide, il faut donc ajouter à
contraction de la vessie celle des muscles volon
taires environnans; or, le moindre effort de c
muscles suffit pour vaincre la résistance de l'urètr
Mais si l'urine est en grande quantité dans la vessi
et que, d'un autre côté, elle y ait acquis, par u
séjour prolongé, cette couleur foncée qui indiqu
la concentration de ses principes, alors l'irritatio
qu'elle détermine sur l'organe y met fortement e
jeu la contractilité organique sensible; la vessie s
contracte, et, malgré l'animal, il y a évacuatio
d'urine.

Dans le rectum, où les excrémens n'ont point u
long canal, mais une simple ouverture à traverse
celle-ci est garnie d'un sphincter qui manque
l'urètre. Ce sphincter, habituellement resserré, do
être dilaté par l'impulsion communiquée aux excré
mens. Tant qu'ils sont depuis peu et en petit
quantité dans le rectum, la contractilité organiqu

ensible n'y est point assez efficacement mise en jeu pour les expulser; il faut l'action des muscles volontaires voisins. Si cette action n'est pas déterminée par l'influx du cerveau, les excrémens restent dans l'intestin; voilà comment, pendant un certain temps, nous les retenons à volonté. Mais qu'ils augmentent en quantité; que, par leur séjour, ils deviennent plus âcres, et par conséquent plus irritans, alors la contractilité organique sensible, fortement mise en jeu, vide involontairement l'intestin. Si le sphincter, qui est volontaire, est paralysé, il y aura incontinence, parce que nulle résistance n'est opposée à la tendance du rectum à se contracter, tendance qui, quoique faible tant qu'il est peu rempli, est toujours réelle cependant.

D'après tout ce que nous avons dit, on voit manifestement que la vessie et le rectum, quoique recevant des nerfs cérébraux, sont cependant moins influencés par le cerveau qu'il ne le paraît au premier coup d'œil, et qu'il y a certainement une très-grande différence entre eux et les muscles volontaires. Ils ne sont pas mixtes, comme on le dit; ils se rapprochent infiniment plus des muscles organiques que des autres: je doute même que, si aucune puissance accessoire n'agissait avec eux et ne les comprimait, l'âme pût, par les nerfs qui y viennent des plexus sacrés, les faire contracter à volonté. Je n'ai jamais vu un animal rendre ses excrémens, le ventre étant ouvert.

Concluons de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, que les nerfs cerébraux qui se portent aux muscles organiques ont sur eux une influence qui ne

ressemble aucunement à celle des nerfs cérébra allant aux muscles de la vie animale : j'ignore reste la nature de cette influence.

Tous les muscles organiques reçoivent des ne des ganglions, soit les précédens, qui sont pénétr aussi par les cérébraux, soit les intestins grêles, cœcum, le colon, etc., qui sont exclusivement pa courus par eux. Or, en coupant, en liant, en ir tant d'une manière quelconque ces nerfs, en agaça les ganglions dont ils partent, en les détruisant, les brûlant avec un acide ou un alcali concentré, muscle reste dans son état naturel : il n'est ni pr cipité ni ralenti dans ses contractions.

Je ne me suis pas contenté des agens ordinair pour bien m'assurer du défaut d'action actuelle d nerfs sur les muscles organiques; fait que tous l bons physiologistes ont toujours admis, malgré l opinions hasardées de quelques médecins qui ada tent le mot vague d'*influence nerveuse* à des org nes qui n'en sont nullement susceptibles.

J'ai donc employé le galvanisme, et je me su convaincu que ce moyen de mettre en jeu les co tractions musculaires est très-peu efficace, presq nul dans la vie organique, tandis qu'il est le pl puissant de tous dans la vie animale. Je ne rappor pas ici mes expériences sur cet objet; on les li dans mes *Recherches sur la mort.*

On peut conclure de tout ce qui précède que l'i fluence cérébrale et nerveuse sur les muscles org niques ne nous est nullement connue; qu'elle n gît point comme sur les muscles volontaires. E est cependant réelle jusqu'à un certain point, pu

qu'il faut bien que les nerfs qui entrent dans la composition de ces muscles servent à quelques usages; mais nous ignorons ces usages (1).

---

(1) Nous avons vu, dans le système musculaire de la vie animale, que l'influence des nerfs sur l'irritabilité de ce système n'est pas facile à déterminer. La même question se reproduit ici, avec plus de complication même. En effet, dans l'autre système, il y avait au moins une action évidente de la part du cerveau et des nerfs dans la contractilité animale; dans celui-ci, non-seulement cette action devient douteuse, mais la même difficulté subsiste, plus grande peut-être, relativement au rôle que jouent les nerfs dans la contractilité organique. On peut se demander, 1° si le cerveau a quelque influence sur la contractilité des muscles de la vie organique; 2° si la moelle n'est point nécessaire à l'exercice de cette contractilité; 3° si les nerfs sont purement passifs dans ce phénomène, en sorte que cette propriété soit, suivant l'expression de Haller, inhérente à la fibre de ces muscles.

Les considérations présentées par Bichat ont montré les muscles de la vie organique indépendans dans leur action de l'influence cérébrale; mais elles ne prouvent pas que celle-ci ne puisse s'exercer dans quelques circonstances. Plusieurs des faits qu'il a cités tendent, au contraire, à démontrer cette influence. Les passions en sont un exemple remarquable. Il me paraît extrêmement probable que, lorsque dans une émotion vive, par exemple, le cœur précipite ses mouvemens, cela n'a lieu que parce que le cerveau réagit sur cet organe et lui transmet l'impression qu'il a reçue. Placer le siége primitif des passions dans les organes de la vie intérieure, c'est oublier, ce me semble, que le cerveau est l'organe unique des perceptions, et que les passions sont toujours la suite de ces dernières. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de traiter cette question : il suffisait de faire pressentir que l'action du cœur pourrait bien dans ce cas

Propriétés organiques.

La sensibilité organique est très-caractérisée dans les muscles qui nous occupent. Avant que la contractilité organique sensible ne s'y développe, il faut que celle-ci y soit mise en jeu. Mais comme ces deux propriétés ne se séparent point, comme elles se succèdent toujours dans leur exercice, ce que

---

être entièrement soumise à celle du cerveau. Les cas rares, à la vérité, dans lesquels la volonté peut suspendre l'action du premier de ces organes, semblent se rattacher à la même cause. Bayle qui jouissait de cette singulière faculté, la mettait en exercice sur-le-champ et avec la même facilité que l'on fait mouvoir un muscle de la vie animale : or, si cela dépendait uniquement de la suspension de la respiration, il faudrait un certain temps pour que le phénomène eût lieu. Au reste, le cœur n'est pas le seul organe qui obéisse ainsi, dans certains cas, à l'influence du cerveau : une foule de faits montrent l'estomac, l'intestin, la vessie, la matrice même, également sensibles à cette influence. On ignore, il est vrai, si c'est par les nerfs qu'elle se transmet ; mais comme ces agens sont les seuls moyens de communication du cerveau avec ces différens organes, tout porte à croire que tel est leur usage. Cependant, il faut convenir que nous manquons d'expériences directes propres à mettre ceci hors de doute. Au contraire, celles qui ont été faites jusqu'à ce jour nous apprennent qu'on peut enlever le cerveau sans diminuer en rien l'action des muscles de la vie organique, si l'on a soin en même temps d'entretenir la respiration. Que conclure de ces faits opposés, et de ceux exposés par Bichat? que sans doute l'influence cérébrale n'est pas absolument nécessaire à la contraction de ces muscles, mais qu'elle peut la modifier dans certaines circonstances. Nous

ous allons dire de la contractilité organique sen-
ible se rapportera aussi à la sensibilité de même
ature.

La contractilité organique insensible, ou toni-
ité, existe dans le système musculaire au degré
écessaire à sa nutrition; mais elle n'y offre rien de
articulier.

---

llons voir qu'il en est à peu près de même pour la moelle
pinière.

D'une part, Legallois, par de nombreuses expériences dont
a déjà été question à l'article du système nerveux de la vie
rganique, a prétendu prouver que le cœur reçoit, par le grand
ympathique, de tous les points de la moelle, le principe de son
ouvement, lequel s'anéantit quand celle-ci est détruite dans
a totalité; d'une autre part, différens faits, qui ont été cités à ce
même article, et des expériences de Clift, de Wilson, démontrent
ue souvent, malgré l'absence de la moelle, le cœur n'en con-
nue pas moins son action; que certaines lésions de la moelle
nt plus d'influence que d'autres sur cet organe; que, suivant
âge et l'espèce d'animal, on observe de grandes différences dans
es résultats, etc. D'où l'on voit que la contractilité organique,
uoique indépendante jusqu'à un certain point de la moelle épi-
ière, est dans quelques cas influencée par elle.

Enfin, la permanence de cette contractilité, malgré la des-
ruction du cerveau ou de la moelle, est-elle une preuve que la
bre musculaire en est douée par elle-même, et indépendam-
ment de toute influence nerveuse, comme le pensait Haller?
Non sans doute, puisque les nerfs subsistent et peuvent encore
gir isolément dans ce cas. Rien ne s'oppose à ce qu'on admette
ci la même hypothèse que dans le système musculaire de la vie
nimale, savoir, que les muscles puisent dans le système ner-
eux le principe de leur action; mais je ne connais aucun fait qui
rouve cela d'une manière incontestable. (BÉCLARD.)

C'est la contractilité organique sensible qui est propriété dominante dans ce système, dont tout les fonctions reposent presque sur cette contract lité, comme toutes les fonctions du système mu culaire précédent dérivent pour ainsi dire de contractilité animale. Nous allons donc examin plus en détail cette propriété essentielle, sur laquel la physiologie doit tant à l'illustre Haller. On peu la considérer sous trois rapports, 1° dans les exc tans, 2° dans les organes, 3° dans l'action des pr miers sur les seconds.

De la Contractilité organique sensible, considér sous le rapport des excitans.

Les excitans sont naturels ou artificiels. L'actio des premiers est continuelle pendant la vie : su eux roulent en partie les phénomènes organique ils mettent en jeu les muscles, qui sans eux seraien immobiles; ils sont pour ainsi dire à ces organe ce que les balanciers sont à nos machines; ils don nent l'impulsion. Les seconds ne peuvent guèr avoir d'effet qu'après la mort, ou dans nos expé riences.

Excitans naturels.

Ces excitans sont le sang pour le cœur, l'urin pour la vessie, les alimens et les excrémens pou les organes gastriques. Tout muscle organique a u

corps qui, habituellement en contact avec lui, entretient ses mouvemens, comme tout muscle animal, habituellement en rapport avec le cerveau, emprunte de lui sa motilité. Les excitans naturels entretiennent leurs organes respectifs au même degré de motilité tant qu'ils restent les mêmes. Toutes choses égales du côté des organes, le pouls ne varie point, les périodes digestives durent le même temps, les intervalles de l'excrétion de l'urine sont uniformes, tant que le sang, le chyle ou l'urine ne présentent point de différences. Mais comme ces substances éprouvent une infinité de variétés, les organes, tout en conservant le même mode de sensibilité organique, éprouvent cependant de fréquens changemens dans leurs mouvemens.

A l'instant où le chyle pénètre dans le sang, pendant la digestion, le pouls change, parce que le cœur est différemment irrité. On observe le même phénomène, mais avec des différences, 1° dans les résorptions, où le pus passe dans la masse du sang; 2° dans l'injection de différens fluides dans les veines, injections si fréquemment répétées dans le siècle passé, à l'époque des expériences sur la transfusion, et que j'ai eu occasion de faire aussi dans d'autres vues que j'indiquerai; 3° dans les maladies inflammatoires, où le sang prend un caractère particulier encore peu connu, et qui donne lieu à la formation de la couenne pleurétique; 4° dans diverses autres affections où la nature de ce fluide est singulièrement altérée; 5° dans le passage du sang rouge dans le système à sang noir. J'ai remarqué qu'en adaptant, sur un chien un peu gros, un

tube recourbé à la carotide d'un côté et à la jugulaire du côté opposé, de manière à ce que l'une pousse du sang dans l'autre, le passage du sang rouge dans les veines n'est point mortel comme celui du sang noir dans les artères; mais qu'il y a presque constamment, dans les premiers instans une accélération des mouvemens du cœur.

On a sans doute exagéré l'influence de la dégénérescence des fluides dans les maladies : on a placé dans cette portion de l'économie une source trop fréquente des dérangemens morbifiques. Mais on ne saurait nier que, suivant les altérations diverses que ces fluides présentent, ils ne soient susceptibles d'exciter différemment les solides qui les contiennent. On sait que, dans le même individu, et avec la même masse d'alimens, la digestion varie d'un jour à l'autre dans la durée de ses périodes; que tels alimens la prolongent, tels autres l'accélèrent; que certains restent très-long-temps sur l'estomac, comme on le dit, et que d'autres ne font pour ainsi dire qu'y passer. Or, dans tous ces cas, l'organe reste le même, le fluide seul varie. Suivant que le rein sépare des urines plus ou moins âcres, plus ou moins irritantes par conséquent, la vessie les retient plus ou moins long-temps : telles sont souvent leurs qualités stimulantes, qu'à l'instant où elles tombent dans cet organe, il se soulève et les rejette involontairement. Parlerai-je des effets si variables de l'émétique et des évacuans par le tube intestinal? On sait que ces mots, drastiques, purgatifs, minoratifs, laxatifs, etc., indiquent des degrés divers des qualités stimulantes que présentent

ertaines substances introduites dans les voies ali-
ientaires, degrés qui doivent être considérés abs-
action faite de ceux de la sensibilité des organes :
elle-ci en effet peut être telle qu'un laxatif produise
es effets plus grands qu'un drastique.

Non-seulement la qualité, mais encore la quantité
es fluides contenus dans les muscles organiques,
influent sur la contractilité de ceux-ci. 1°. Le mot
léthore est certainement trop vaguement em-
loyé en médecine; mais on ne saurait douter que
état qu'il exprime n'ait lieu quelquefois : or, alors
lus de sang abordant au cœur, celui-ci accélère
es contractions. 2°. J'ai eu occasion de faire plu-
eurs fois la transfusion sur des chiens, soit pour
lle-même, soit pour des recherches relatives à la
espiration et à la circulation. Or, j'ai toujours ob-
ervé qu'en n'ouvrant point une veine, pour vider
u sang à mesure que sa jugulaire externe en reçoit
car c'est toujours celle-ci que je choisis pour l'ex-
érience), en déterminant ainsi par conséquent une
léthore artificielle, j'ai, dis-je, toujours observé
ue le mouvement du cœur était accéléré. J'ai même
u, dans un chien, l'œil devenir ardent et comme
nflammé : dans les autres, ce phénomène ne s'est
oint fait remarquer. 3°. On sait que, dans la course,
ù tous les muscles en contraction expriment de
ous côtés le sang veineux contenu dans leurs tissus,
elui-ci, qui aborde au cœur en abondance, le fait
alpiter avec force (1). 4°. Il est hors de doute que la

(1) Pendant la course, en effet, comme Bichat le fait remar-

quantité d'urine et d'excrémens, autant et plus qu leur qualité, est pour la vessie et le rectum un cause de contraction involontaire. 5°. On connaî les effets funestes de l'émétique, des purgatifs don nés à trop fortes doses. 6°. Un verre d'eau tiède n provoque souvent pas le vomissement, qu'une pint détermine avec énergie, etc., etc.

Excitans artificiels.

Les excitans artificiels sont, en général, tous le corps de la nature. Telle est en effet l'essence de l contractilité organique, que, par là même qu'un muscle est en contact avec un corps dont il n'a pa l'habitude, il se contracte à l'instant. Si les mus cles ne sont pas irrités par les organes qui les en tourent et avec lesquels ils sont en rapport, c'es que l'habitude a émoussé le sentiment qui naît d ce rapport. Mais que ces organes changent de modifications, qu'extraits du corps de l'animal, ils se

---

quer, le cœur augmente ses contractions pour se débarrasser du sang qui obstrue ses cavités. Mais d'où vient cette obstruction dans cette circonstance? Dépend-elle, comme le dit Bichat, de ce que le sang veineux est exprimé du tissu des muscles en plus grande quantité par le fait de la contraction de ces organes? ou bien, ce phénomène n'est-il pas plutôt le résultat de la difficulté qu'éprouvent la respiration, d'une part, et le passage du sang à travers le poumon, de l'autre, pendant que le corps s emporté par un mouvement rapide? Je crois que ces deux causes y concourent; mais si j'étais forcé de choisir entre elles, j'adopterais certainement la seconde. (F. Blandin.)

rfroidissent, et soient ensuite appliqués sur les
uscles organiques mis à nus, ils les feront con-
tracter.

Le calorique, par son absence, qui constitue *le
oid*, comme par sa présence, d'ou naît *le chaud*,
ut également exciter les muscles et en général
us les organes. A l'instant où on ouvre la poitrine
e le péricarde d'un animal vivant, le cœur s'agite
ec une force subitement accrue : c'est que l'air
it sur lui, et qu'il passe de la température du corps
une autre qui est différente. Tous les fluides aéri-
mes, la lumière, tous les liquides, etc., sont ex-
cans des muscles. Si nous voyons le cœur vide de
ng, l'estomac et les intestins privés des sub-
nces qui les pénètrent ordinairement, se contrac-
r avec plus ou moins de force lorsqu'ils ont été
traits du corps, c'est que le milieu environnant
les substances dont il est chargé concourent à
oduire cet effet : ils sont alors les excitans de ces
ganes.

En général, les excitans artificiels agissent de
fférentes manières, 1° par leur simple contact;
en déchirant ou en coupant mécaniquement les
bres; 3° en tendant à se combiner avec elles. 4°. Il
n est dont on ignore complétement le mode d'ac-
on : telle est, par exemple, l'électricité.

Lorsque les excitans n'agissent que par le simple
ntact, les fluides sont, toutes choses égales, plus
ficaces que les solides, parce qu'ils stimulent par
n plus grand nombre de points, que non-seulement
s agacent les surfaces de l'organe, mais qu'ils péné-
ent encore les interstices des fibres. Les solides

produisent un effet proportionné à l'étendue de le excitation, à la pression plus ou moins marqu qu'ils exercent, à leur densité, à leur mollesse, et Ce sont presque toujours des substances fluides q la nature emploie pour excitans, dans l'état orc naire.

Le déchirement est un mode d'excitation pl actif que le contact : le cœur, les intestins, inert souvent lorsqu'ils sont touchés seulement par scalpel, se contractent avec force lorsque la poin de celui-ci les excite. La section produit un efl moins sensible que le déchirement : coupées tran versalement, les fibres oscillent et frémissent se lement par la contractilité organique sensible; pe dant que, par la contractilité de tissu, elles épro vent une rétraction manifeste.

L'excitation chimique est, dans le plus grai nombre de cas, la plus avantageuse; mais ici il fa bien distinguer ce qui appartient au racornissemer de ce qui est l'effet de l'irritabilité mise en je 1°. Plongez dans un acide très-concentré une gr nouille écorchée et vivante : à l'instant tout est pre que désorganisé, le réactif agit si fort qu'on ne pe distinguer ni racornissement ni contractilité. 2°. A faiblissez un peu l'acide, et plongez-y une aut grenouille, par ses membres inférieurs seulemen à l'instant ils se raidissent par la contraction d extenseurs, qui l'emportent sur les fléchisseur car, dans cette expérience, c'est un phénomèi presque constant. Retirez l'animal : ses cuisses ré tent immobiles; la vie y a été éteinte, la contra tion qui est survenue est un racornissement, et nc

un phénomène vital : plongée dans la même liqueur, une grenouille morte éprouve le même phénomène. 3.° Affaiblissez encore l'acide : à l'instant que l'animal y est plongé, ses membres se contractent; mais aux contractions succède le relâchement; il y a des mouvemens alternatifs : c'est l'irritabilité qui commence à être mise en jeu. Cependant, si l'acide n'est pas très-affaibli, quelques marques de racornissement restent encore, et l'animal conserve une gêne les mouvemens des membres inférieurs, résultat évident du premier degré de racornissement. 4°. Enfin, si l'acide est très-affaibli, il devient un simple irritant qui met en jeu la contractilité organique sensible, sans altérer le tissu des fibres : l'animal sorti du fluide conserve la même force de mouvement.

Ces expériences, qu'il serait facile de multiplier sur les animaux à sang chaud, mais que je n'ai point tentées sur eux, montrent évidemment ce qui appartient au racornissement, d'avec ce qui est l'effet de la contraction vitale. Cependant il n'y a pas une limite rigoureuse entre eux, et il est un degré d'affaiblissement de l'acide où ces deux causes de mouvemens se confondent.

Il est un mode d'excitation auquel les auteurs n'ont point fait attention ; on peut l'appeler négatif : c'est celui dont je parlais tout à l'heure au sujet du calorique, dont la privation est un excitant souvent très-vif. Dans les diverses expériences que j'ai eu occasion de faire, cela m'a souvent frappé. Appliquez un excitant sur un muscle, il se contracte; mais au bout d'un certain temps le mou-

vement cesse, quoique le contact continue : enleve l'excitant, souvent le mouvement revient à l'instant En général, rien de plus commun, dans le cœur les intestins, etc., que les contractions cessant sou l'action continuée d'un excitant, et revenant mo mentanément par son absence. J'avoue que ce phé nomène n'est pas aussi invariable, aussi constan que celui de la contraction déterminée par l'appli cation du stimulus qui succède à l'état de non-ex citation; mais cela arrive très-souvent. On dirait qu la sensibilité organique est, dans ces cas, comm l'animale; que tout état nouveau pour elle l'affecte que cet état soit positif ou négatif. Le passage de l non-excitation à l'excitation est plus vif; mais l passage inverse n'est pas moins ressenti, lorsqu'il es brusque. Au reste, cette manière d'envisager la con tractilité organique sensible en exercice mérite de expériences ultérieures.

De la Contractilité organique sensible, considérée par rapport aux organes.

Considérée dans l'organe où elle a son siége, la contractilité organique sensible présente de nom breuses variétés qui sont relatives, 1° à la diversit de tissu, 2° à l'âge, 3° au sexe, 4° au tempéra ment, etc.

1re *Variété. — Diversité du tissu musculaire.*

La contractilité animale est partout la même dans les muscles volontaires, parce que leur organisation est uniforme. Toutes choses égales du côté du nombre et de la longueur des fibres, les phénomènes de contraction sont exactement les mêmes partout : ici, au contraire, les variétés de tissu en déterminent inévitablement dans les propriétés vitales.

Chaque muscle involontaire est d'abord spécialement en rapport avec le fluide qui lui sert ordinairement d'excitant. Le sang seul peut régulièrement entretenir les mouvemens du cœur : que ce fluide soit altéré d'une manière quelconque, les contractions deviennent irrégulières. Toute substance étrangère poussée dans les veines produit ce phénomène. L'urine, qui entretient avec harmonie les mouvemens de la vessie, troublerait ceux du cœur, si elle circulait dans ses cavités. Le sang, plus doux en apparence que l'urine, peut agiter convulsivement la vessie, lorsqu'il vient à y tomber. J'ai soigné avec Desault un malade affecté depuis long-temps de rétention d'urine, et qu'il avait taillé pour une très-grosse pierre : à la suite de l'opération, les urines stagnaient dans la vessie, tant qu'elles étaient seules ; mais dès qu'un peu de sang pénétrait dans cet organe, il se contractait involontairement, et les urines sanguinolentes étaient évacuées. Les excrémens, qui séjournent pendant un certain temps dans le rectum sans le faire contracter, feraient

à l'instant soulever l'estomac, etc. Tous ces phéno mènes se rallient aussi aux variétés de sensibilit des membranes muqueuses, variétés sur lesquelle nous reviendrons. Ils prouvent manifestement qu chaque muscle a un degré de contractilité organi que qui lui est propre, et que tel ou tel fluide d l'économie peut exclusivement, dans l'état naturel mettre en exercice d'une manière régulière.

Les fluides étrangers offrent le même résultat l'émétique, qui fait contracter l'estomac, est im punément poussé dans la vessie par les injections les purgatifs ne font point vomir, etc. Ce rappor des fluides étrangers avec la contractilité organiqu sensible a lieu, soit que, comme dans le cas pré cédent, ces fluides soient appliqués sur les sur faces muqueuses correspondant aux muscles, soi qu'ils parviennent à ces muscles par la circulation comme l'ont prouvé les expériences faites dans l siècle passé sur les infusions médicamenteuses dan les veines; expériences dont Haller a recueilli u grand nombre de résultats. On a vu, dans ces ex périences, la circulation présenter à tous les orga nes, tantôt l'émétique, et l'estomac seul se contrac ter; tantôt les purgatifs, et les intestins seuls entre en action, etc. Prises par voie d'absorption cutanée les substances médicamenteuses donnent lieu a même phénomène. Appliqués en frictions, les pur gatifs, les émétiques, etc., font contracter, no tous les muscles organiques, quoique la circulatio les présente à tous, mais ceux avec lesquels leu sensibilité est en rapport.

Dans les affections diverses dont ils sont le siége

on voit les muscles organiques avoir aussi chacun un mode d'irritation particulière, répondre à un excitant, et rester sourds, pour ainsi dire, à la voix des autres, etc.

2e *Variété.—Age.*

L'âge modifie singulièrement la contractilité organique sensible. Dans l'enfance, elle est très-prononcée, les muscles répondent avec une extrême facilité aux excitans : la vessie garde difficilement l'urine; les enfans la rendent dans le sommeil involontairement; le cœur se contracte avec une rapidité dont le pouls nous donne la mesure; tous les phénomènes digestifs sont plus prompts; de là moins d'intervalle dans le retour de la faim. C'est un phénomène analogue à celui des muscles volontaires, où la rapidité des mouvemens se trouve, dans le premier âge, alliée avec leur peu de force.

Au-delà de l'enfance, la susceptibilité des muscles pour répondre à leurs excitans va toujours en diminuant : aussi, tous les grands phénomènes de la vie organique vont-ils toujours en se ralentissant. Le nombre des pulsations, la durée de la digestion, le séjour des urines, etc., sont le thermomètre de ce ralentissement.

Dans le vieillard tout s'affaiblit; l'action des muscles organiques diminue peu à peu. Ceux de la vessie et du rectum sont les plus exposés à perdre leur faculté contractile : de là les rétentions d'urine, maladie qui est l'apanage si fréquent de la vieillesse; de là encore les amas de matières fécales au-

dessus de l'anus, maladie presque aussi commun que la première à cet âge de la vie, quoique le praticiens aient fixé sur elle moins d'attention. Le gens riches et accoutumés au luxe de la table sont surtout sujets. J'en ai vu beaucoup, et même autant que de rétentions d'urine, dans la dernière année de la pratique de Desault. Les intestins e l'estomac languissent plus tard dans leurs fonctions C'est le cœur qui résiste le plus; il est l'*ultimum moriens*, comme il a été le premier en exercice la durée de ses battemens mesure exactement l durée de la vie organique.

3e *Variété.— Tempérament.*

Le tempérament modifie d'une manière remar quable la contractilité organique. On sait que che les uns les pulsations sont plus fréquentes, les phé nomènes digestifs, urinaires, plus rapides: qu chez d'autres tout est marqué par plus de lenteu dans la vie organique. Or ces variétés ont éviden ment leur source primitive dans les variétés de con tractilité du cœur, de l'estomac, des intestins, etc. lesquelles ont, sous ce rapport, une grande in fluence dans la différence des tempéramens. A ce égard il y a deux observations essentielles à faire :

1°. Les variétés de force des muscles organique ne coïncident pas toujours avec celles des muscle de la vie animale. Ainsi voit-on tel individu re marquable par des formes extérieures peu mar quées, par une faiblesse évidente dans les muscle des membres, tandis que l'activité de la digestion

es évacuations urinaires, etc., annonce la plus rande énergie dans la contractilité organique sensible. Je remarque à cet égard que le cœur est plus réquemment en rapport de force avec les muscles xtérieurs, que l'estomac, les intestins et la vessie. n pouls plein, bien développé, coïncide ordinaiement avec la constitution athlétique, tandis que ouvent cette constitution est réunie sur le même ujet à un système gastrique faible, et que surtout a force de ce système gastrique est souvent alliée la faiblesse extérieure. Ce fait, que les divers temséramens nous démontrent dans l'homme, est évilent dans la série des animaux : ceux qui, comme es carnivores, ont un système musculaire animal rès-énergique, ont les parois des cavités gastriques comme membraneuses; ces parois se fortifient lans les classes herbivores; elles deviennent trèsprononcées dans les gallinacés. En général, la masication, à laquelle préside toujours la contractilité nimale, est, dans les animaux, en raison inverse le la force de trituration de l'estomac, qui est résidée par la contractilité organique sensible.

2°. Les variétés de cette propriété relatives aux empéramens présentent un autre phénomène presque toujours étranger au système musculaire animal. En effet, dans celui-ci, ces variétés sont toujours générales; nous pouvons bien, par l'exercice, fortifier telle ou telle région musculaire : mais les différences de forces qui sont naturelles portent toujours sur tout le système. Les bras et les jambes, la poitrine et le bas-ventre sont uniformément contractiles dans les différentes divisions des mus

cles qui leur appartiennent. Au contraire, il e rare de voir cette uniformité dans les muscles i volontaires : presque toujours l'un prédomine su les autres; tantôt c'est le cœur, tantôt l'estomac quelquefois la vessie. Souvent même les viscère gastriques ne sont pas tous au même niveau d force : l'estomac languit, que les intestins conse vent leur action ordinaire; réciproquement les i testins, trop contractiles, expulsent tout de suit les matières fécales, et déterminent la diarrhée quoique l'estomac fasse bien ses fonctions. Cett différence essentielle entre les deux systèmes mus culaires tient à ce que la contractilité de l'un dé pend d'un centre commun, du cerveau; que cell de l'autre, au contraire, a son principe isolé dan chaque organe où elle existe.

4e *Variété.—Sexe.*

Les femmes se rapprochent, en général, des enfans par les phénomènes de contractilité organiqu sensible. La faiblesse des mouvemens coïncide avec leur plus grande rapidité chez ce sexe, dont tou les muscles intérieurs sont, comme les extérieurs plus grêles et à formes moins prononcées que che l'homme. On diroit que la force contractile de l matrice a été prise chez lui aux dépens des force de tous les autres organes. Dans les expériences, les femelles donnent des résultats bien moins marqués et toujours bien moins durables que le mâles. Le cœur, l'estomac, les intestins, etc., ces-

ent plus vite leurs mouvemens; ces mouvemens ont moindres; il faut pour les déterminer de plus orts excitans; etc.

5e *Variété. — Saison et Climat.*

Dans l'hiver et dans les climats froids, où l'organe cutané, resserré et comme racorni par l'impression de l'air environnant, est dans une faible action, toutes les fonctions intérieures, plus actives, nécessitent plus d'énergie dans les forces qui y président; tous les phénomènes digestifs, urinaires, et circulatoires même, sont plus marqués. Je ne sache pas qu'on ait fait encore des expériences comparatives sur l'irritabilité dans les saisons diverses, mais je suis persuadé qu'elles donneraient des résultats différens.

Contractilité organique sensible, considérée relativement à l'action des stimulans sur les organes.

Nous venons d'envisager isolément l'excitant et l'organe excité : chacun, étant isolé, est nul pour la contractilité organique sensible; de leur concours seul résulte l'exercice de cette propriété. Qu'arrive-t-il dans ce concours? Nous l'ignorons. Vouloir le connaître, ce serait vouloir savoir comment un corps en attire un autre, comment un acide se combine avec un alcali, etc. Dans l'attraction, l'affinité et l'irritabilité, nous ne pouvons suivre les phénomènes que jusqu'à l'action des corps les uns

sur les autres. Cette action est le terme de n
recherches.

Mais ce qui ne doit pas nous échapper ici, c'
que, dans cette dernière propriété, l'action n'
jamais immédiate; il y a toujours entre l'excitant
l'organe un intermédiaire qui reçoit l'irritation. C
intermédiaire est une membrane fine et continue
celle des artères pour le cœur; c'est une surfa
muqueuse pour les viscères gastriques et pour
vessie. Cet intermédiaire est plus susceptible de r
cevoir l'excitation que le muscle lui-même. J'
constamment observé qu'en irritant la surface i
terne du cœur, ses contractions sont plus vive
qu'en mettant son tissu à découvert à l'extérie
par l'enlèvement de son enveloppe séreuse, et
l'agaçant ensuite. Il en est de même pour les muscl
organiques de l'abdomen.

Y a-t-il, entre l'intermédiaire excité et l'organ
qui se contracte, quelques communications ner
veuses qui transmettent l'impression? je ne le croi
pas : le tissu cellulaire suffit. En effet, les surface
séreuses n'ont, entre elles et les muscles orga
niques, que ce tissu pour moyen d'union. Leur vi
n'est nullement liée à la leur, puisque souvent elle
les abandonnent, comme nous le verrons; et ce
pendant elles peuvent leur servir à transmettr
l'excitation. Le péricarde et le péritoine, irrités dan
leur portion correspondant à l'organe qu'on veu
faire mouvoir, y déterminent une contraction. C
fait est connu de tous ceux qui ont fait la moindr
expérience : c'est même presque toujours de cette
manière qu'on stimule le cœur, l'estomac, les in-

stins, la vessie, etc. En ne promenant l'excitant ur la surface séreuse que très-légèrement et de nanière à ce que le mouvement ne se communique ullement aux fibres charnues, on obtient un ré-ultat. Cependant le simple contact ne suffit pas our transmettre l'irritation : par exemple, en lais-ant le feuillet externe du péricarde appliqué sur le œur, et en l'irritant ensuite, l'organe reste immo-ile. Si on décolle le péritoine de dessus la vessie, u'on rompe toutes les adhérences celluleuses, u'on le réapplique ensuite, et qu'on l'agace, la même immobilité s'observe.

Quand l'intermédiaire qui reçoit l'excitation est nalade, la contractilité est constamment altérée. Le même excitant détermine des contractions len-es ou rapides, suivant que l'affection exalte ou liminue la sensibilité de cet intermédiaire. La hlogose légère de l'intérieur de la vessie déter-mine une espèce d'incontinence d'urine; celle des intestins cause le dévoiement; etc., etc. Au con-traire, les vieux catarrhes de vessie, les affections où la faiblesse de la surface muqueuse de cet or-gane prédomine, sont des causes fréquentes de ré-tention, etc.

J'observe que c'est une remarquable différence entre la contractilité organique sensible et l'insen-sible, que l'existence de cet intermédiaire, lequel n'a point lieu dans cette dernière, où le même système reçoit l'impression et réagit sur le corps qui la détermine : par exemple, dans les systèmes glanduleux, séreux, cutané, etc., le fluide qui y aborde, pour la sécrétion ou l'exhalation, y produit

la sensation, laquelle est à l'instant suivie de la r action. Dans la contractilité sensible, au contrair un système perçoit, et l'autre se meut. Ce mode d motilité s'éloigne moins de celui de la vie animal où les organes des sens et ceux du mouvemen totalement différens, sont très-éloignés les ur des autres.

Contractilité organique sensible, considérée relati vement à sa permanence après la mort.

Cette permanence est plus durable que celle d la contractilité animale. Déjà, en irritant la moelle les muscles extérieurs restent immobiles, que le internes sont encore en activité (1). On a cité tan d'exemples de cette permanence, Haller a tel ment multiplié les expériences sur ce point, que je n'ai pas besoin de rapporter ici des preuves d'un fait dont on ne doute plus. A cette permanence sont dues les évacuations de matières fécales et d'urine qui surviennent souvent un instant après la mort, et les vomissemens qu'on observe dans quelques sujets, sinon d'une manière aussi marquée que pendant la vie, au moins suffisamment pour faire remonter les alimens jusque dans la bouche du cadavre, qui souvent s'en trouve toute remplie, comme je l'ai fréquemment observé (2).

---

(1) *Voyez* plus haut, l'ordre suivant lequel s'éteint la contractilité des différentes parties du système musculaire.

(2) Ce passage des alimens dans la partie supérieure des voies alimentaires après la mort n'est point un phénomène de con-

Il faut, sous le rapport de cette permanence, comme sous celui de la durée de la contractilité animale, distinguer deux espèces de morts : 1° celles qui arrivent subitement, 2° celles qu'amène une longue maladie.

Dans toute mort subite, déterminée soit par une lésion violente du cerveau, comme dans l'apoplexie, la commotion, la compression, l'épanchement, etc.; soit par une affection du cœur, comme dans une grande syncope, une plaie, un anévysme rompu; soit par une cessation d'action des poumons, comme dans l'asphyxie par les gaz délétères, par le vide, par la submersion, etc.; la permanence de la contractilité est très-sensible : la mort générale survient d'abord; puis les organes,

---

contractilité des fibres de l'estomac : il dépend uniquement, comme l'a démontré le professeur Chaussier, d'un mouvement de fermentation qui s'établit, aux dépens de ces matières, dans toute la portion abdominale du canal digestif; fermentation à laquelle résulte immédiatement une production abondante de gaz, et le ballonnement, du ventre ; puis, consécutivement, une résistance passive des parois abdominales tellement forte que l'estomac et les intestins, ne pouvant plus se développer de ce côté, se trouvent comprimés, et que les matières qu'ils contiennent se trouvent refoulées vers les ouvertures naturelles. Dans ce moment, non-seulement les matières alimentaires remontent souvent dans le pharynx, la bouche et les fosses nasales ; mais encore elles arrivent dans le larynx et les bronches, en franchissant l'ouverture de la glotte. Il faut être bien instruit de ces faits, pour ne pas être tenté, dans un examen cadavérique, de les considérer comme le produit de causes qui ont agi avant la cessation de la vie. (F. Blandin.)

meurent partiellement; chaque force vitale s'éte ensuite successivement, pour ainsi dire.]

Dans toute espèce de mort lentement produi dans toutes celles surtout qu'une maladie de l geur a précédées, c'est la mort partielle de chaq organe qui précède; chaque force vitale s'affail et s'éteint peu à peu, avant que la cessation leur ensemble, qui constitue la mort généra ne survienne. Quand cette mort arrive, aucu des vies propres à chaque organe ne reste, ta dis que la plupart de ces vies durent plus moins long-temps après la mort subite.

On ne peut faire des expériences sur les c davres, que l'on n'a guère, dans les hôpitau que quinze heures et plus après la mort; m en faisant périr des chiens de faim, laquell trop prolongée, dégénère en une véritable m ladie qui dure chez ces animaux huit, dix, dou jours même, j'ai vu la contractilité entièreme éteinte à l'instant de la mort. On m'a amené so vent des chiens affectés de différentes maladie surtout il y a trois ans, époque à laquelle il eut une espèce d'épidémie sur ces animaux : o en les ouvrant à l'instant de la mort, en les tua même quelque temps avant, et en déterminai ainsi une mort subite, bien différente de celle qui arrivent dans l'état sain, où toutes les pa ties sont intactes dans leurs fonctions et pa conséquent dans leurs forces vitales, j'ai toujou vu une absence constante de contractilité, o du moins un affaiblissement tel qu'elle paraissai nulle.

Plusieurs physiologistes ont parlé d'une con-
sion générale qui survient dans les muscles
ganiques à l'instant de la mort, d'un soulè-
ment du cœur, de l'estomac, des intestins, etc.
: excès d'action est réel quelquefois dans les
rts subites, dans celles surtout que nous dé-
minons pour nos expériences; elle est très-
e dans les morts précédées d'une longue ma-
ie, dans laquelle le malade s'éteint pour ainsi
e insensiblement, et passe par gradation de
vie à la mort. C'est un défaut commun à
esque tous les auteurs, d'avoir trop généralisé
faits observés dans certaines circonstances: une
le de fausses conséquences sont résultées de là.

Sympathies.

Aucun organe ne reçoit plus facilement les
luences des autres, que les muscles organi-
es: tous cependant n'en sont pas également
sceptibles. Le cœur occupe le premier rang
sus ce rapport; viennent ensuite d'abord l'es-
mac, puis les intestins, et enfin la vessie. C'est
ns cet ordre que nous allons examiner ces in-
ences.

C'est un phénomène remarquable, que toute
pèce d'affection un peu forte, née dans l'éco-
mie, altère tout de suite les mouvemens du
eur. La moindre plaie, la douleur souvent la plus
gère, suffisent pour y produire des déran-
mens. Or ces dérangemens sont de deux es-

pèces : tantôt son action est arrêtée momentanément; de là les syncopes, mode de dérangement qui arrive surtout dans les douleurs violentes et subites. L'expression vulgaire « le cœur me manque, » etc., qu'on emploie dans ces cas, est toute vérité. Tantôt, et c'est le cas le plus ordinaire, cette action est accélérée: de là les mouvemens fébriles si fréquens dans toutes les affections locales; mouvemens purement sympathiques, qui cessent quand l'affection disparaît. Dans une foule d'inflammations locales, le mal est trop circonscrit pour admettre un obstacle au cours du sang; obstacle qui, selon Boerhaave, force le cœur à redoubler son action pour le surmonter; d'ailleurs, quand il n'y a point engorgement, mais seulement douleur dans une partie, et que le mouvement fébrile survient, c'est bien là un phénomène sympathique. L'accroissement d'action du cœur peut dépendre sans doute d'une substance étrangère, qui, mêlée au sang, l'altère et le rend plus irritant; il peut tenir à une affection de la substance de l'organe, qui la dispose à être plus irritable; mais certainement il est très-souvent sympathique, et dépend de ce rapport inconnu qui lie les uns aux autres tous nos organes, de ce *consensus* qui enchaîne toutes leurs actions et les met dans une dépendance réciproque.

J'en dirai autant de l'estomac : quoique sa réaction sympathique ne soit pas tout-à-fait aussi fréquente que celle du cœur, cependant elle devient très-marquée dans une foule de circonstances. La plupart des affections locales, de

iflammations spécialement, sont accompagnées de omissemens sympathiques. Diverses fièvres pré-ntent, dans leur début, de semblables vomis-mens. C'est dans les hôpitaux surtout qu'on oserve fréquemment ces phénomènes. Plusieurs édecins n'ont point considéré ces vomissemens omme de simples sympathies, mais comme l'in-ce d'une affection bilieuse, fondés sur ce que on rend presque toujours alors de la bile. Mais, ans tous les animaux que j'ai ouverts, j'ai pres-ue toujours vu l'estomac vide contenir une ertaine quantité de ce fluide, qui avait reflué du uodénum : d'autres auteurs ont fait aussi de emblables observations ; en sorte qu'il paraît que, ans l'état de vacuité, l'existence de la bile sto-nacale est un phénomène naturel. D'après cela, . n'est pas étonnant que, dans le début des naladies, dans leur cours même, l'estomac étant xcité sympathiquement, et devenant par là le iége du vomissement, on rende plus ou moins le ce fluide. On le rejetterait de même dans l'état le santé, si on provoquait alors le soulèvement le l'estomac par l'émétique ; c'est même ce qui arrive quelquefois le matin quand on est à jeun, et que quelque cause étrangère à toute affection du foie, comme la vue d'un objet dégoûtant, détermine le vomissement : la bile sort alors comme tout ce qui est contenu dans l'estomac. Je ne dis pas que souvent le foie, étant sympathiquement excité dans le début des maladies, ne fournisse plus de bile, que cette bile surabondante, refluant dans l'estomac, ne fasse contracter ce viscère ; mais certai-

nement ce n'est pas le cas le plus ordinaire : c
vomit de la bile comme on en rejette par l'anu
parce qu'elle se trouve dans l'estomac et dans les i
testins, et non parce qu'elle est surabondante.
le vomissement était une fonction naturelle, l
évacuations bilieuses supérieures seraient aussi n
turelles que la teinte verdâtre des excrémens, q
se rencontre toujours dans l'état de santé. On vo
donc, d'après cela, que les vomissemens bilieu
sont, dans beaucoup de cas, une chose pureme
accessoire, et que le phénomène essentiel, c'est
contraction sympathique de l'estomac.

Dans le cas dont je viens de parler, il est évide
qu'il n'y a aucun embarras gastrique ; l'altératio
sympathique de l'estomac ne porte que sur les fibr
charnues. Mais le plus souvent cet embarras ga
trique se manifeste au début des maladies où il
a affection locale : on vomit des matières saburrale
comme on le dit. C'est qu'alors l'organe essentie
lement affecté, le poumon, par exemple, si c'e
dans une péripneumonie, a agi sympathiquemen
non-seulement sur les fibres charnues, mais encor
sur la membrane muqueuse. Celle-ci, excitée, aug
mente sa sécrétion ; de là ces matières saburrales
qui ne sont autre chose que des sucs muqueux m
lés à des sucs gastriques et à de la bile : or, la pré
sence de ces matières suffit souvent pour faire con
tracter l'estomac, et pour produire le vomissemen
qui les expulse.

D'après cela, il est évident qu'il peut y avoi
vomissement sympathique sans embarras gastri
que, et embarras gastrique sympathique avec u

missement produit immédiatement. Dans le pre-
ier cas, ce sont les fibres charnues qui ressentent
influence sympathique de l'organe affecté; dans
l second, c'est la membrane muqueuse. Mais com-
ent le poumon, la plèvre, la peau, etc., étant
fectés, l'estomac entre-t-il en action? Je l'ai dit,
l mot *sympathie* n'est qu'un voile à notre igno-
nce sur les rapports des organes les uns avec les
tres. Les vomissemens produits par l'érysipèle,
l phlegmon, la pleurésie, la péripneumonie, etc.,
nt donc le plus souvent un effet absolument
nalogue à l'augmentation d'action du cœur qui
termine la fièvre. Ils ressemblent au trouble cé-
bral d'où naît le délire, trouble qui est bien plus
re, etc. Tous ces phénomènes indiquent que les
tres organes se sont ressentis par contre-coup de
tat de celui qui est affecté, etc. Les médecins qui
ont point envisagé tous ces phénomènes d'une
anière grande et générale ont rétréci leur traite-
ent dans des bornes trop étroites. Autrefois on
ait beaucoup égard au trouble sympathique du
eur, et on saignait beaucoup dans l'invasion des
aladies; depuis quelques années on a spéciale-
ent égard au trouble sympathique de l'estomac,
on émétise fréquemment : peut-être, dans quel-
ue temps, on fera plus d'attention aux pesanteurs
e tête, aux douleurs de cette région, à l'insomnie,
ux somnolences, etc., qui sont des symptômes
mpathiques très-communs, et on dirigera le trai-
ment du côté du cerveau. Dans ces variétés, les
édecins judicieux envisageront tous ces phéno-
ènes d'une manière générale : ils verront dans

tous une preuve de cet accord général qui co
donne toutes les fonctions les unes aux autres, c
les enchaîne toutes, et qui par là même encha
leurs dérangemens ; ils verront chaque organe
soulever, pour ainsi dire, contre le mal qui s'
introduit dans l'économie, chacun réagir à sa m
nière ; ils verront ces réactions produire des eff
tout différens, suivant l'organe réagissant, la fiè
naître de la réaction du cœur, le délire, l'ass
pissement, l'insomnie, les convulsions, etc.,
celle du cerveau, le vomissement de celle de l'
tomac, la diarrhée de celle des intestins, les e
barras gastrique et intestinal, les saburres de la l
gue de celle des membranes muqueuses, les
bordemens de bile de celle du foie, etc. Ainsi, da
une machine où tout se tient, où tout se lie,
une pièce est dérangée, toutes les autres se dér
gent aussi. Nous ririons du machiniste qui ne s'
tacherait qu'à raccommoder une de ces pièces,
qui négligerait de réparer le dérangement lo
d'où naissent tous ceux que présente la machi
Ne rions pas d'un médecin qui ne combat qu'
symptôme isolé, sans attaquer la maladie, dont
ne connaît souvent pas le principe, quoiqu'il sac
que ce principe existe; mais rions de lui s'il att
che à son traitement une importance qui est nul
comparée à celle du mal.

Après l'estomac, ce sont les intestins qui sont
plus souvent affectés sympathiquement dans l
maladies. La vessie est le muscle organique qui r
sent le moins facilement les influences qui parte
de l'organe malade : cela arrive quelquefois cepe

nt. Dans les fièvres, on sait que les rétentions
rine par paralysie sympathique et momentanée
sont pas très-rares; les incontinences se remar-
ent moins souvent.

Caractère des propriétés vitales.

On voit, d'après ce que nous avons dit, que les
opriétés vitales sont très-actives dans les muscles
ganiques, surtout sous le rapport de la contrac-
ité. Ces muscles sont réellement, pendant la vie,
permanence d'action; ils reçoivent avec une
trême facilité les influences des autres organes.
urs propriétés vitales s'altèrent avec la plus grande
omptitude, surtout celles que je viens d'indiquer;
r la contractilité insensible y est rarement alté-
e, parce qu'elle n'y joue pas un rôle essentiel.
emarquez, en effet, que les dérangemens maladifs
un organe portent toujours sur la force vitale do-
inant dans cet organe : la contractilité animale
t fréquemment altérée dans le système précédent;
ns celui-ci, c'est la contractilité organique sen-
ble. Au contraire, l'insensible ou la tonicité l'é-
nt très-peu, les phénomènes auxquels elle préside
estent toujours à peu près les mêmes : la nutrition
st toujours uniforme; les lésions du tissu muscu-
ire sont rares; quand elles arrivent, c'est plutôt
ar communication, comme dans les cancers de
estomac, où la maladie commence sur la surface
uqueuse, et où les fibres charnues ne s'affectent
ue consécutivement. Le cœur et la matrice sont
s muscles les plus sujets à ces altérations morbi-

fiques : encore, dans le premier, appartienne elles plus souvent à la membrane interne qu'a fibres charnues elles-mêmes. Au contraire, da les systèmes où la contractilité organique sensil est sans cesse en action, comme dans le cutan le séreux, etc., où elle préside et à la nutrition e l'exhalation; dans le glanduleux, le muqueux, et où elle détermine et la sécrétion et la nutrition, et c'est elle spécialement qui est altérée. De ces déra gemens naissent les altérations de tissu, les ma dies organiques proprement dites, qui sont au communes dans ces systèmes, qu'elles sont rar dans ceux où la contractilité insensible, très-ob cure, ne se trouve qu'au degré nécessaire à nutrition.

C'est à cela aussi qu'il faut rapporter la rareté d inflammations aiguës de ce système. Autant, dans cutané, le séreux, le muqueux, etc., cette affecti est fréquente, autant celui-ci, dont les fonctio naturelles nécessitent peu de tonicité, la présen rarement. Ceux qui ouvrent beaucoup de cadavr savent que presque jamais on ne trouve le tissu c cœur enflammé. Rien de plus commun que l phlegmasies de la membrane externe ou séreuse, de la membrane interne ou muqueuse de l'estoma des intestins, etc.; mais rien de plus obscur, ri de moins observé que celle de leur tunique cha nue. Dans le rhumatisme, il y a bien quelquefoi lorsque les douleurs cessent autour des articul tions, des coliques violentes, des vomissemens spa modiques même, indice peut-être d'une affecti aiguë des fibres stomacales ou intestinales; mais c

e trouve jamais de traces de ces affections; on ne oit point le tissu musculaire présenter ce rouge vif es organes muqueux, cutanés ou séreux enflamıés : au moins je ne l'ai jamais observé.

Les médecins n'ont point fait assez attention à ı différence des inflammations suivant la différence es systèmes; mais surtout ils n'ont point assez remarqué que cette différence s'accorde parfaitement vec celle de la tonicité ou contractilité organique nsensible; que là où cette force vitale est le plus aractérisée, les inflammations ont plus de tenlance à se faire, parce que c'est elle qui préside à eur formation; parce que ces affections supposent on exaltation, comme les convulsions supposent 'exaltation de la contractilité animale, comme les vomissemens, les battemens accélérés du cœur supposent celle de la contractilité organique, etc. Je ne saurais trop le répéter, les maladies les plus fréquentes à chaque système mettent toujours en jeu, exaltent ou diminuent la force vitale prédominante dans ce système. C'est un aperçu pathologique nouveau, qui peut être fécond en résultats.

ARTICLE IV.

PHÉNOMÈNES DE L'ACTION DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

Ces phénomènes sont, comme dans le système précédent, relatifs à l'état de contraction, ou à celui de relâchement.

§ Ier. *Force des Contractions.*

Elle n'est jamais susceptible de s'exalter au poin où atteint quelquefois la force des muscles de la vi animale. Entre le pouls le plus fort et le pouls l plus faible, entre le jet affaibli qui précède cer taines rétentions d'urine, et le jet de l'homme l plus vigoureux, il y a bien moins de différenc qu'entre la langueur des muscles volontaires de cer taines femmes, et l'énergie de ceux d'un maniaque d'un homme en colère, etc. Le cœur et le deltoïd sont, à peu de chose près, égaux sous le rapport d leur masse charnue : or, que deviendrait la circu lation si le premier poussait quelquefois le san avec la force que le second emploie à élever le mem bre supérieur? Un accès de colère, de manie, etc. suffirait pour produire des anévrysmes, etc. D'ur autre côté, les muscles organiques ne sont poin atteints de ces prostrations de force si communes dans les autres ; les paralysies leur sont étrangères parce qu'ils sont hors de l'influence cérébrale. Il y a bien quelque chose qui répond aux convulsions : ce sont les agitations irrégulières qui déte nent tant de variétés dans le pouls des fièvres aiguës, agitations qu'il faut bien distinguer de celles produites par un vice organique du cœur ; mais ces agitations sont toutes différentes des spasmes des muscles volontaires : il n'y a même aucune analogie.

Il n'y a point, dans la force de contraction des muscles qui nous occupent, les déchets qui sont si

emarquables dans celle des autres muscles; l'effort st à peu près proportionné à la cause agissante, et ı distinction de cette force en absolue et en effec- ive ne saurait s'appliquer ici : seulement il faut lus ou moins d'énergie contractile, suivant que le orps à expulser d'un muscle creux est solide ou luide. Voilà pourquoi les gros intestins sont pour- vus de fibres longitudinales plus caractérisées que elles des intestins grêles, pourquoi le rectum sur- out, où les excrémens ont leur maximum de soli- lité, présente ces fibres d'une manière encore plus narquée que le colon et le cœcum, quoique sous ıne forme différente; pourquoi, dans les diarrhées, a plus faible contraction suffit pour évacuer les in- estins, tandis que, pour rendre des excrémens rès-solides, la contractilité organique sensible du ectum étant souvent insuffisante, il faut que les muscles abdominaux aident beaucoup à l'expulsion; pourquoi, quand un corps dur est introduit dans l'estomac, et que les sucs gastriques ne le ramollis- sent pas, il y reste long-temps avant d'être expulsé, et y détermine un poids incommode, etc., etc. On sait avec quelle rapidité se fait le passage des bois- sons de l'estomac dans les intestins, combien au contraire les aliments solides séjournent dans le premier, etc.

La force des muscles organiques est incompara- blement plus grande dans les phénomènes de la vie que dans nos expériences. Une fois mis à décou- vert, le cœur ne communique plus que des mou- vemens faibles, et le plus souvent irréguliers. Il n'y a aucune proportion entre la force nécessaire

pour déterminer le jet, quelquefois de sept à huit pieds, qu'offre le sang sortant de la carotide ouverte dans un chien, et la force des contractions que déterminent les plus forts excitans appliqués sur le cœur extrait du corps. Rien n'égale, dans nos expériences, la force de contraction nécessaire au vomissement, etc., etc.

On a multiplié, dans les muscles organiques comme dans les précédens, les calculs sur la force de contraction, et l'on a eu les mêmes variétés de résultats. Peut-on calculer, en effet, les degrés d'un phénomène que mille causes font à chaque instant varier, non-seulement dans les divers individus, mais encore dans le même; que le sommeil, la digestion, l'exercice, le repos, le calme de l'âme, l'orage des passions, le jour, la nuit, tout, en un mot, modifie sans cesse? Je ne sais si nous digérons deux fois dans la même période, si les urines séjournent deux fois le même espace de temps dans la vessie, avant d'en être expulsées, si leur jet est deux fois exactement égal, etc.

Souvent la force des muscles organiques reste dans son degré ordinaire, augmente même, tandis qu'un affaiblissement général s'empare des autres. La force du pouls, les vomissemens, les diarrhées, etc., coïncidant avec une prostration générale des muscles de la vie animale, ne sont point un phénomène rare dans les maladies.

§ II. *Vitesse des Contractions.*

Elle varie singulièrement : très-rapide dans les expériences, lorsque la mort est récente et que les excitans sont très-forts, les contractions sont en général plus lentes dans l'état naturel; on dirait que c'est l'inverse de la force: souvent à l'instant où l'on ouvre le péricarde, le cœur se meut avec une vitesse que l'œil peut à peine suivre, surtout si on injecte un fluide irritant dans ce sac séreux un peu avant que de mettre l'organe à découvert, etc. Les contractions augmentent beaucoup de vitesse dans certaines maladies : celles du cœur, par exemple, acquièrent alors dans l'adulte une rapidité souvent très-supérieure à celle qu'elles offrent dans le premier âge. Cette vitesse est aussi, dans ce cas, entièrement distincte de la force des contractions; il est rare même que ces deux choses se trouvent réunies au plus haut point. En général, quand la force du cœur est accrue, il y a bien un peu plus de vitesse; mais très-souvent il y a diminution de force avec augmentation de vitesse, ou la force reste la même la vitesse étant beaucoup augmentée.

Nous avons vu que les muscles volontaires avaient, en général, un degré de vitesse au-delà duquel ils ne peuvent aller, et que cette vitesse tient à la constitution primitive. Le même phénomène ne s'observe-t-il point ici? Souvent, dans deux fièvres dont les symptômes sont les mêmes, dont le degré d'intensité semble être exactement uniforme, le

pouls est infiniment plus fréquent dans un individu que dans un autre. Cela ne dénote pas toujours une différence dans la maladie, mais dans la constitution primitive, une aptitude de l'un des deux cœurs à se contracter beaucoup plus vite sous le même excitant. Qui ne sait que, dans les expériences, la rapidité contractile est infiniment variable sous l'influence des mêmes causes?

Chaque muscle organique a son degré de vitesse: le cœur, l'estomac, les intestins, la vessie, etc., diffèrent singulièrement sous ce rapport (1).

---

(1) Tous les muscles de la vie animale jouissent d'une vitesse de contraction assez uniforme; tous dans l'occasion sont susceptibles de produire des mouvemens également rapides : mais s'en faut de beaucoup qu'il en soit de même pour les muscles de la vie organique. A la vérité, Bichat, dans cet article, vient d'invoquer l'exemple du cœur pour établir une opinion contraire, et sans doute il a été heureux dans son choix. Toutefois il faut observer que le cœur fait plutôt ici l'exception que la règle. Comparez-le, en effet, à l'estomac, au duodénum, à l'intestin grêle, au gros intestin, à la vessie, à l'œsophage, etc., vous verrez quelle énorme différence existe entre eux sous le rapport de la rapidité des contractions : là vous trouvez, en effet, vitesse et énergie; ici, au contraire, lenteur et débilité. En général, la contraction, dans les muscles organiques, est essentiellement vermiculaire; et cette circonstance imprime un caractère particulier à certaines actions des organes qui en sont tissus.

(F. Blandin.)

§ III. *Durée des Contractions.*

Le cœur ne reste jamais en permanence de contraction, comme cela arrive souvent aux muscles volontaires. Quoique la faim semble prouver le contraire dans l'estomac et les intestins, cependant ce phénomène n'est point contradictoire : en effet, la contraction permanente des viscères gastriques vides est un résultat de la contractilité de tissu. Toutes les fois que la contractilité organique sensible y est mise en jeu, il y a alternative de contraction et de dilatation : cette alternative caractérise même essentiellement cette dernière propriété, et la distingue de la contractilité animale et de celle de tissu, où l'état de contraction est souvent permanent.

§ IV. *État du Muscle en contraction.*

Tous les phénomènes indiqués pour les muscles volontaires sont presque applicables à ceux-ci : tels sont l'endurcissement, l'augmentation en épaisseur, la diminution en longueur, l'expression du sang, etc., etc. Mais il y a quelques différences entre le cœur et les muscles gastriques, sous le rapport du mode contractile. En effet, on voit très-sensiblement dans le premier, 1° des contractions de totalité analogues à celles des muscles volontaires, contractions qui ont lieu dans l'état de santé, qui déterminent la projection du sang, et qu'on pro-

duit facilement dans les expériences, quand les animaux sont encore vivans; 2° des oscillations multipliées qui s'emparent des fibres, qui les agitent toutes sans produire aucun effet sensible, sans resserrer la cavité, sans projeter le sang, par exemple. Ces oscillations s'observent à l'instant de la mort, quand le cœur va cesser d'être contractile : on a beau l'irriter alors, il n'y a plus de contractions de totalité, quoiqu'une vibration générale et extrêmement manifeste se soit emparée de ses fibres : cependant sa cavité n'est point rétrécie; le sang y stagne. Le cœur ressemble parfaitement, sous ce double rapport, aux muscles volontaires : il est agité, comme on le voit pour ces muscles dans le frisson, dans ce qu'on nomme *horripilation*, comme on l'observe encore dans certains muscles sous-cutanés chez quelques individus. J'ai déjà vu, par exemple, plusieurs personnes affectées d'un frémissement habituel d'une portion du soléaire, frémissement très-sensible à l'œil à travers la peau, et qui n'avait rien de commun avec la contraction nécessaire à l'extension du pied.

Les muscles involontaires de l'abdomen ne présentent jamais ce double mode de contraction. Au lieu des mouvemens brusques, subits et de totalité, on n'y voit qu'un resserrement lent, peu apparent même souvent: c'est une espèce de ramper ; il n'y a pas même, à proprement parler, de contraction de totalité comme celle du cœur, où toutes les fibres d'une oreillette ou d'un ventricule se meuvent en même temps: chaque plan charnu paraît ici successivement agir. Placé à l'origine des

os vaisseaux, la vessie ou l'estomac seraient in-
pables de communiquer au sang ces mouvemens
ir saccades que nous offre le jet d'une artère à
aque relâchement. D'un autre côté, à l'instant où
mouvement finit dans l'estomac, les intestins et
vessie, on n'y voit jamais ces oscillations, ces
brations qui sont presque constantes dans le cœur
les muscles volontaires, et qu'on peut même y
ire naître à son gré.

§ V. *Mouvemens imprimés par les Muscles organiques.*

Il n'y a presque jamais de mouvemens simples
ans ces muscles, l'entrecroisement divers de leur
lan charnu fait qu'ils agissent presque toujours en
ois ou quatre sens différens sur les substances
u'ils renferment. On ne peut rien dire de général
ur ces mouvemens, qui composent la diastole du
œur, l'agitation péristaltique du tube alimentaire,
e resserrement de la vessie, etc. Chaque muscle a
on mécanisme qui appartient à l'histoire physiolo-
ique de la fonction à laquelle il concourt.

§ VI. *Phénomènes du relâchement des Muscles organiques.*

Dans le relâchement des muscles organiques, il
urvient en général des phénomènes opposés aux
précédens : il est donc inutile de les exposer. Mais
l se présente ici une question à examiner, celle de
avoir quelle est la nature de cet état qui succède à
a contraction et qui alterne avec elle.

Dans les muscles de la vie animale, lorsque contraction cesse, ce n'est pas, en général, muscle lui-même qui revient à son état antécéde d'extension ; il y est ramené par son antagoniste par exemple, lorsque le biceps s'est contracté pou fléchir l'avant-bras, et que sa contraction cesse, devient passif; le triceps se mettant alors en mou vement, l'étend et le ramène à sa position natu relle, en agissant d'abord sur les os, qui commun quent le mouvement à ce muscle. Chaque puissanc musculaire de la vie animale trouve donc da celle qui lui est opposée une cause de retour à l'ét qu'elle avait quitté pour se contracter. Il n'en e pas de même dans la vie organique : ses muscle qui sont tous creux, n'ont point d'antagoniste Nous avons bien considéré, jusqu'à un certai point, comme telles les substances contenues da les muscles creux, substances qui s'opposent l'effet de la contraction ; mais, incapables le pl communément de réagir après avoir été compr mées, à cause de leur défaut d'élasticité, ces sub stances ne sauraient faire le même office que l véritables antagonistes.

La plupart des physiologistes ont admis, comm cause de dilatation, l'entrée des substances no velles qui remplacent, dans les cavités musculaire celles expulsées par la contraction : ainsi l'abo d'un sang nouveau dans le cœur, des alimens da les portions diverses du tube alimentaire, a-t-il é envisagé comme propre à dilater ces organes; sorte que, dans cette opinion, les muscles seraie purement passifs pendant qu'ils s'élargissent. Ma

l. considérations suivantes, dont quelques auteurs, e Grimaud en particulier, ont déja présenté plusurs, ne permettent point de considérer sous ce rport la dilatation des muscles organiques, celle d cœur en particulier.

1°. Lorsqu'on met un muscle creux à découvert, l cœur, l'estomac ou les intestins, etc., et qu'on l vide entièrement des substances qu'il contient, i se contracte et se dilate alternativement comme qand il est plein, si l'on vient à y appliquer un smulant extérieur. 2°. Si on vide par des ponctions tus les gros vaisseaux qui vont au cœur ou qui en rtent, de manière à l'évacuer entièrement, ses datations et contractions alternatives continuent ecore pendant un certain temps. 3°. Pour juger emparativement du degré de force de la contracton et de la dilatation, on peut extraire deux cœurs apeu près égaux en volume, de deux animaux vans; placer tout de suite les doigts d'une main ns les oreillettes ou les ventricules du premier, e embrasser avec l'autre main l'extérieur du sencd: eh bien, on sentira que celui-ci fait un effrt aussi considérable en se dilatant que l'autre en s contractant. Ce fait, déjà observé par Pechlin, t d'autant plus remarquable que souvent l'effort e dilatation est supérieur à celui de contraction. ai même observé, en répétant cette expérience, ne, quelque effort qu'on fasse avec la main, on e peut empêcher l'organe de se dilater. 4°. L'exnsion et le resserrement alternatifs d'où naît le ouvement vermiculaire des intestins se voient endant la faim, lorsqu'on ouvre le ventre d'un

animal. 5°. La dureté du tissu musculaire organiq est aussi manifeste pendant la dilatation que pe dant la vacuité. 6°. J'ai observé plusieurs fois, l'instant où j'irritais le cœur avec la pointe d'u scalpel, qu'une dilatation en était le premier r sultat, et que la contraction n'était que consécuti à celle-ci. Il arrive, en général, plus souvent q la contraction commence le mouvement dans l expériences; mais certainement, le muscle étant repos, souvent c'est une dilatation qui se manifes la première.

Il paraît donc très-probable que la dilatation d muscles organiques est un phénomène aussi vit que leur contraction; que ces deux états se tie nent d'une manière nécessaire; que leur ensemb compose le mouvement musculaire, dont la co traction n'est qu'une partie (1). Qui sait même si ch

(1) Sans nier absolument que les muscles intérieurs ou inv lontaires puissent se dilater, les volontaires s'allonger, par u action vitale propre, analogue à la contraction de ces mên muscles, j'observe que la plupart des faits qui tendent à prou cette action peuvent être expliqués d'une autre manière, et d pendent souvent de causes qui lui sont totalement étrangèr et que n'ont pas vues ceux qui admettent cette action. C' ainsi que Barthez cite comme des phénomènes de ce genre, à une sorte de répulsion active opposée à l'attraction qui dom dans le raccourcissement des fibres musculaires, l'allongement la trompe de l'éléphant, celui des reptiles, des vers, etc., d l'action de ramper, celui même de la langue. Il est évid que, dans tous ces cas, l'allongement n'est qu'un effet seconda du raccourcissement de certains muscles qui, par leur dispositi ne peuvent pas en produire d'autre, plutôt qu'une dilatat

cne ne peut pas être troublée isolément, si à une
ntraction régulière ne peut pas succéder une di-
lation irrégulière, et réciproquement? Qui sait si
rtaines altérations dans le pouls ne tiennent pas
x lésions de dilatation, et d'autres à celles de
ntraction? Je suis loin de l'assurer; car, en mé-

---

elle. La sangsue, par exemple, a des fibres longitudinales dont
ffet est de la raccourcir, mais en même temps des fibres cir-
claires qui ne peuvent se contracter sans qu'elle ne soit allongée,
lspace que bornent ces fibres devant évidemment augmenter
ns un sens pendant qu'il diminue dans l'autre. Il en est de
me des vers, etc. La trompe de l'éléphant contient également
ux plans de fibres : les unes, longitudinales, la raccourcissent;
l autres, rayonnées, servent à l'allonger, et ce n'est point à
dilatation des premières qu'il faut attribuer ce dernier effet.
C'est donc faute d'avoir connu la véritable disposition des
res musculaires dans certaines régions, et d'avoir su apprécier
l effets différens de la contraction de ces fibres suivant la di-
ction qu'elles affectent, qu'on a été porté à les revêtir d'une
rce d'expansion qui ne leur semble nullement inhérente. Ce
i a lieu dans l'intestin confirme cette idée : il est hors de doute
e l'extension et le resserrement alternatifs qui agitent ce vis-
re dépendent de la contraction alternative de ces fibres lon-
udinales et circulaires : cependant ce fait est un de ceux qu'on
nne en preuve de la dilatation active des muscles.

F. Meckel a présenté quelques considérations nouvelles à
ppui de cette dernière, tirées des états divers où se trouvent les
uscles après la mort, des mouvemens qu'on observe dans l'iris,
s dimensions variables de la pupille sur le cadavre, etc.; mais
on en excepte l'iris, dont les mouvemens sont, je crois, assez
u connus, et dont la nature musculeuse est d'ailleurs loin
être démontrée, la seule contraction des muscles rend parfai-
ment raison de presque tous les phénomènes dont ils sont le

decine, il ne faut pas des présomptions, mais de certitudes, pour fixer notre croyance : je dis seulement qu'on peut faire de ce point un objet de recherches.

Il paraît que quelquefois les muscles volontaires sont aussi le siége d'une véritable dilatation active

---

siége. Un seul, déjà cité par Bichat, semble d'abord favorable à l'allongement actif des fibres, en ce qu'il paraît jusqu'à présent inexplicable : c'est la force avec laquelle le cœur se soulève et tend à se dilater, même quand le sang n'aborde plus dans son intérieur. Mais ce fait, pour être obscur, en est-il plus concluant, et ne peut-il pas tenir, comme les autres, à quelque cause particulière qui nous est inconnue? Qui nous dit que la diastole et la systole ne seront pas un jour des phénomènes aussi simples que ceux de la contraction d'un muscle volontaire (1)

(Béclard.)

(1) Ainsi que Béclard le fait remarquer dans la note précédente, on a supposé à la fibre musculaire une force particulière de dilatation, dans l'impuissance où l'on était d'expliquer d'une autre manière certaines actions d'organes; mais le temps, qui détruit tout ce qui n'est pas fondé sur la plus sévère observation, a miné petit à petit toute cette théorie, et aujourd'hui on doit la considérer comme totalement ruinée. Les phénomènes de la dilatation du cœur, qui paraissaient à Bichat si concluans, en faveur de la force de dilatation, qui avaient fait créer à Barthez une force *d'élongation active* des muscles, qui embarrassaient encore Béclard, et qui sont considérés comme peu explicables par la plupart des physiologistes, ne sont pourtant que des effets fort simples du raccourcissement ou de la contraction de certains plans musculaires du centre circulatoire. Les notions positives que nous possédons maintenant sur l'anatomie de cet important organe, ne laissent plus le moindre doute à cet égard. Les ventricules, en effet, sont formés de deux ordres principaux de fibres : les unes, superficielles

°. Mis à découvert et extrait du corps, un muscle e contracte, et ensuite se dilate, sans qu'aucune ause le ramène à cet état de dilatation. 2°. Dans ne amputation, on voit souvent sur le moignon e bout des fibres divisées s'allonger et se raccour-

---

e contournent autour de l'axe de l'organe en une spirale très-mple, et dessinent, suivant la remarque très-juste de Senac, *un uit de chiffre ;* les autres, profondes, se contournent essentielle-ıent de la même manière, mais elles forment des tours beaucoup lus multipliés. Celles-là appartiennent aux deux ventricules à la ois, celles-ci sont particulières à chaque ventricule ; toutes sont ısérées par leurs deux extrémités sur les zônes fibreuses artérielles t auriculo-ventriculaires de la base du cœur, desquelles elles artent pour décrire leurs spires particulières, et vers lesquelles lles reviennent ensuite. Enfin, les premières, par suite de leurs ours peu nombreux, paraissent obliques sur les deux faces ù cœur, et forment des anses assez simples qui embrassent la ointe de cet organe ; tandis que les secondes, plus contournées, *lus spirales*, sont presque circulairement disposées autour des entricules, et représentent comme les lames emboîtées d'un ornet de papier. Or, supposez ces dernières fibres contractées t raccourcies ; leurs plans divers se pressent les uns contre les utres, les anneaux qu'elles forment se trouvent resserrés, et eur cornet, en totalité, est retréci par un mécanisme semblable celui par lequel on diminue la capacité d'un cornet de papier, vec cette différence seulement, que, pour obtenir la dimi-ution de la cavité du cornet de papier, il faut augmenter e nombre des tours de spirale de la lame non rétractile qui le orme ; tandis que dans le cornet des ventricules du cœur, la ıature obtient le même résultat, sans augmenter le nombre es tours de spirale des fibres, mais en raccourcissant celles-ci ans toute leur longueur. Que si, au contraire, les fibres entriculaires superficielles viennent à se raccourcir, elles

cir alternativement (1); double mouvement qui para être également vital. 3°. Dans plusieurs espèces c convulsions où les membres se raidissent, dar celles, par exemple, qui accompagnent la plupa des accès hystériques, il paraît qu'il y a une dila tation active très-prononcée : en plaçant, en effet la main sur les muscles qui devraient alors êtr relâchés, d'après la disposition des parties, o sent une dureté aussi considérable qu'en tâtant le muscles contractés, etc.

Il y a beaucoup de recherches à faire sur c mode de dilatation de nos parties, mode qui n'es pas sans doute exclusivement borné au système musculaire, mais qui paraît appartenir encore l'iris, au tissu spongieux des corps caverneux, au mamelons, etc. Tous ces organes se meuvent en s dilatant très-manifestement; le resserrement y suc cède à l'expansion, comme dans les muscles ordi naires le relâchement à la contraction : c'est l'ex

---

ne peuvent que produire la dilatation des ventricules, parce qu rapprochant simplement la pointe du cœur de la base, à l'aid des ansès simples qu'elles décrivent, elles ouvrent sa cavité d ventricules, comme on ouvre une boutonnière, en poussant l'un vers l'autre leurs deux extrémités. Ainsi, le cœur est formé c fibres qui, bien que disposées d'une manière analogue, offren cependant sous ce rapport de bien remarquables différences comme déjà nous l'avons fait remarquer plus haut, différences q leur impriment des actions opposées ; les premières sont les agen de la diastole ; les secondes sont réservées à la systole. (F. Blandin

(1) Il n'y a rien ici qu'un allongement apparent, résultant c la cessation de la rétraction de muscles divisés. (F. Blandin.

ınsion qui est le phénomène principal. Peut-être ıssi que, comme quelques modernes l'ont dit, ls gonflemens subits du tissu cellulaire qui ac-ompagnent les contusions, les meurtissures, etc., ınt un résultat de ce mode de mouvement.

ARTICLE V.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

Le système musculaire organique est absolument inverse du précédent, sous le rapport du dévelop-ement. Autant celui-ci est peu caractérisé dans les remiers temps, autant l'accroissement du premier st précoce. Suivons-le dans tous les âges.

Ier. *État du Système musculaire organique chez le fœtus.*

Dès les premiers jours de la conception, le cœur est déjà formé; il offre le premier, comme on l'a lit, un point en mouvement, *punctum saliens*. Les echerches de divers auteurs, de Haller en parti-culier, ont mis en évidence les progrès successifs le son accroissement dans les premiers temps (1).

(1) *Voyez* ce qui a été dit dans le *Système vasculaire à sang rouge*.

Un peu plus tardifs à se former, les muscles d l'intérieur de l'abdomen sont cependant dévelop pés bien avant ceux qui forment les parois de cett cavité. C'est le volume des intestins, de l'estomac de la vessie, etc., presque autant que celui d foie, qui donne à la cavité où se trouvent ces vis cères la capacité remarquable qu'elle présente alors

Uniformes à peu près à cet âge, sous le rappor de leur proportion de volume, tous les muscles or ganiques ne le sont pas autant sous celui de leu tissu. Le cœur est manifestement plus ferme e plus dense que tous les autres; sa texture est très caractérisée. Molles et lâches, les fibres stoma cales, intestinales et vésicales, ressemblent exac tement à celles des muscles de la vie animale : peu de sang les arrose à proportion de celui qui doi y pénétrer dans la suite. Au contraire, denses e serrées, les fibres du cœur ont une énergie d'ac tion proportionnée à celle que dans la suite elle doivent avoir. Leur rougeur est tout aussi mar quée, autant de sang les pénètre, et les nourri par conséquent. Cette rougeur du cœur, analogue chez l'adulte à celle des muscles volontaires, con traste à cette époque avec la pâleur remarquable de ceux-ci. Au reste, elle présente, comme dans toutes les autres parties où elle existe, une teinte foncée due à l'espèce de sang qui la produit.

On conçoit facilement la raison de cette quantité de sang qui pénètre le cœur, puisque cet organe, très-actif alors dans ses mouvemens, a besoin de beaucoup de force, tandis que, presque immobiles, les autres en nécessitent peu.

Cependant on a exagéré la contractilité organique ensible du cœur dans le fœtus et dans le premier ge, sans doute à cause de la rapidité extrême que a circulation présente alors. Cette rapidité dépend utant de l'activité des forces toniques du système apillaire général que de celle du cœur; car, une ois parvenu dans le système capillaire, le sang est ors de l'influence du cœur, comme nous l'avons u; le séjour qu'il y fait est absolument dépendant les forces de ce système lui-même : or, très-actives lors, ces forces y précipitent le cours du sang, t le rejettent dans le système veineux, d'où il rrive au cœur. L'excitabilité de celui-ci serait louble, triple même, que, si le sang n'y aborlait qu'avec lenteur, il ne pourrait entretenir un ouls rapide et en même temps continu. Haller 'est laissé entraîner à cette opinion par celle où l était que le cœur est l'agent d'impulsion unique lu sang circulant même dans les petits vaisseaux. D'ailleurs, il est hors de doute que la contractilité organique sensible du cœur est moins facile à être mise en jeu chez le fœtus par les expériences, et qu'elle est aussi beaucoup moins durable. Alors les excitans les plus forts ont moins de prise sur elle un instant après la mort, que ceux qui ont le moins d'énergie n'en offrent sur le cœur d'un animal qui a vu le jour. J'ai vérifié plusieurs fois ce fait sur des fœtus de cochons d'Inde. Comparée à celle des muscles volontaires, la motilité du cœur est sans doute remarquable chez le fœtus; mais comparée à ce qu'elle sera après la naissance, elle est peu caractérisée.

Il en est absolument de même de la contractilit de l'estomac, de la vessie et des intestins; le plu communément on ne peut déterminer aucun mou vement dans ces muscles par les stimulans. M. Lé veillé a fait déjà ces observations importantes; i a aussi remarqué que l'urine séjournait dans l vessie, et le méconium dans les gros intestins sans produire une contraction suffisante pour le expulser. Je ne crois pas cependant qu'il y ait pen dant la vie une immobilité parfaite des viscère gastriques, et voici pourquoi : le plus souvent l méconium ne se rencontre que dans les gros in testins; il faut donc qu'il s'y forme, s'il y a im mobilité des muscles gastriques : or, il est beau coup plus probable qu'il est un résidu de la bile de tous les sucs muqueux, etc.; que, par consé quent, il a été successivement poussé par une ac tion lente de la partie supérieure vers l'inférieur des voies alimentaires.

La mollesse des muscles organiques rend leur extensibilité de tissu très-prononcée à cette épo que. J'observe cependant que le cœur des cada vres de fœtus ne présente point ces variétés sans nombre de volume que celui de l'adulte nous offre dans le côté droit, suivant les divers genres de mort.

II. *État du Système musculaire organique pendant l'accroissement.*

Les premiers jours de l'existence sont marqués par un mouvement intérieur aussi prompt à se manifester que l'extérieur dont nous avons parlé. La succion du lait, l'évacuation des urines, celle du méconium, etc., sont les indices de ce mouvement intérieur général, de cette agitation presque subite de tous les muscles involontaires.

Ce n'est pas le cerveau qui, entrant en action à la naissance, détermine la contraction de ces muscles, puisque, comme nous l'avons dit, ils échappent constamment à son empire; cela paraît dépendre, 1° de l'influence sympathique exercée sur leur système par l'organe cutané, qu'irrite le nouveau milieu où il se trouve; 2° de l'excitation portée au commencement de toutes les surfaces muqueuses, et sur la totalité de celle du poumon, excitation qui réagit ensuite sur ces muscles; 3° de celle produite par les fluides introduits dans l'estomac; 4° de l'abord subit du sang rouge dans tous ces muscles jusque là pénétrés comme les autres de sang noir : cette cause est essentielle; l'irritabilité paraît en être en partie dépendante, ou du moins en emprunter un surcroît de force remarquable. 5°. L'excrétion du méconium et de l'urine est aussi puissamment aidée par les muscles abdominaux, qui entrent alors en activité avec tout le système auquel ils appartiennent.

Le mouvement intérieur général qui arrive dan les premiers momens de l'existence, et qui est dé terminé par l'activité subitement accrue des mus cles involontaires, remplit un usage important l'égard des surfaces muqueuses, qu'il débarrass des fluides qui les surchargent et dont la présenc devient pénible. Là où les surfaces muqueuses n'on point autour d'elles de plans charnus involontaires comme aux bronches, aux fosses nasales, etc., c sont des muscles de la vie animale plus ou moin éloignés qui remplissent cette fonction, comme par exemple, le diaphragme et les intercostaux qui débarrassent par la toux la surface bronchique et par l'éternument la surface pituitaire.

En s'éloignant de l'époque de la naissance, le muscles organiques croissent, en général, moin proportionnellement que les autres, ce qui rétabli peu à peu l'équilibre entre les deux systèmes. Je remarque cependant, à l'égard de la prédominanc du premier, qu'elle est bien moins marquée dan le fœtus que celle du système nerveux. Le cerveau par exemple, est proportionnellement beaucou plus gros que le cœur.

Il est probable que les muscles qui nous occupent présentent, à cette époque, les mêmes variétés de composition que les autres, que la gélatine y domine surtout, que la fibrine y est moindre, etc. Peut-être cette dernière substance existe-t-elle, dans les premiers temps, plus abondamment dans le cœur que dans les autres muscles de cette classe.

Nous avons observé deux périodes très-distinctes dans l'accroissement des autres muscles : l'une

et achevée lorsqu'ils ont acquis leur longueur; l'autre l'est lorsque leur épaisseur est complète. La première n'a point, dans le système organique, un terme aussi distinct : déjà la stature n'augmente plus, que les organes gastriques et urinaires, que le cœur s'allongent et croissent encore.

On a considéré d'une manière trop générale l'accroissement. Chaque système a un terme différent dans ce grand phénomène. Le système osseux, le musculaire de la vie animale, et ceux qui en dépendent, comme le fibreux, le cartilagineux, etc., influencent spécialement la stature générale du corps : ce sont eux qui déterminent telle ou telle taille; mais cette taille n'influe nullement sur la longueur des intestins, sur la capacité de l'estomac, du cœur, de la vessie, etc. Les systèmes glanduleux, séreux, muqueux, etc., sont également indépendans de la stature : aussi porte-t-elle, dans les nombreuses variétés, bien plus sur les membres que sur l'abdomen, la poitrine, etc. Une grande taille indique la prédominance de l'appareil de la locomotion, mais nullement de ceux de la digestion, de la respiration, etc. La fin de l'accroissement en hauteur, que nous considérons d'une manière générale pour tout le corps, n'est que la fin de l'accroissement des muscles, des os et de leurs dépendances, et non de celui des viscères intérieurs, qui s'épaississent et s'allongent encore. Il est facile de s'en convaincre en comparant les muscles organiques d'un jeune homme de dix-huit ans à ceux d'un homme de trente ou quarante.

Les muscles organiques ne paraissent point su-

sets à ces irrégularités d'accroissement que les au tres muscles et les os nous présentent fréquem ment. On sait que souvent la taille reste statio naire pendant plusieurs années, et que tout à cou elle prend des dimensions très-marquées en u court espace de temps : ce phénomène est rema quable surtout à la suite des longues maladies. Or malgré ces inégalités, le cœur et tous les autre muscles analogues croissent d'une manière unifor me : la régularité des fonctions intérieures aux quelles ces muscles concourent spécialement ne s'ac commoderait point avec ces aberrations qui ne sau raient troubler les fonctions des organes locomo teurs. D'ailleurs, si elles avaient lieu, la circula tion, la digestion, l'excrétion des urines, etc., de vraient présenter des aberrations correspondantes or, c'est ce qu'on n'observe pas. Le cœur et le muscles gastriques, etc., grossissent toujours dan l'enfant dont la taille reste stationnaire; ils ne gran dissent point brusquement dans celui qui croî tout à coup : voilà pourquoi la poitrine et le ventre deviennent gros dans le premier cas, et restent ré trécis dans le second, à proportion des membres.

D'ailleurs ces deux systèmes ne sont jamais en rapport précis de nutrition et de force. J'ai déjà ob servé que des muscles organiques très-prononcés coïncident souvent avec des muscles volontaires très-peu saillans, et réciproquement.

Ne considérons donc point l'accroissement ni la nutrition d'une manière uniforme : chaque système se développe et s'agrandit à sa manière; jamais tous ne se rencontrent aux mêmes périodes de cette

nction. Pourquoi? parce que la nutrition est, omme tous les autres actes auxquels préside la e, essentiellement dépendante des forces vitales, que ces forces varient dans chaque système.

L'accroissement du système musculaire involonaire n'est point uniforme dans tous les organes qui composent. Chacun s'agrandit plus ou moins, ou prononce différemment; l'un prédomine souvent ur les autres d'une manière manifeste : une vessie fibres charnues très-marquées, à colonnes, comme n dit, se trouve souvent chez un sujet à estomac débile, à petits intestins, etc.; réciproquement l'estomac, le cœur, etc., ont une prédominance souvent isolée.

III. *Etat du Système musculaire organique après l'accroissement.*

C'est vers l'époque de la vingt-quatrième à la vingt-sixième année que les muscles organiques ont acquis la plénitude de leur développement. Alors la poitrine et l'abdomen, qui les contiennent, sont parvenus au maximum de leur capacité. Ces muscles sont tels qu'ils doivent rester toute la vie; ils ont une densité bien supérieure à celle de la jeunesse; leur force s'est accrue, leur couleur est plus foncée. En général, cette couleur est sujette, dans le cœur, à de fréquentes variétés, lesquelles se rapportent assez aux variétés du système précédent. Les maladies aiguës et chroniques ont à peu près sur elle la même influence. Elle est également l'indice des tempéramens sanguin, lymphatique, etc.,

par les teintes diverses qu'elle présente. La couleu des fibres stomacales, intestinales, vésicales, va rie moins; leur blancheur, plus uniforme, est rare ment influencée par les maladies.

Il ne dépend point de nous d'augmenter, par u exercice habituel, la nutrition des muscles organi ques. Les alimens pris outre mesure, et faisant fré quemment contracter l'estomac, l'affaiblissent a lieu de faire davantage prononcer ses fibres, comm il arrive par l'exercice constant imprimé à un mem bre supérieur ou inférieur. La vessie, sans cesse e action dans certaines incontinences, s'affaiblit auss peu à peu, et perd son énergie. On dirait que ce deux systèmes sont, sous ce rapport, en ordre in verse.

Il paraît que la nutrition des muscles organiques comme celle des autres, est sujette à de fréquente variations; que, dans certaines époques, ils son plus prononcés; qu'ils le sont moins dans d'autres Les maladies influent beaucoup sur ce phénomène qui prouve, comme le ramollissement des os et leu retour à l'état naturel, la composition et la décom position habituelles dont les organes sont le siége Nous trouvons, dans les amphithéâtres, une foul de différences sur les différens sujets, par rappor à la teinte, à la densité, à la cohésion des muscles Or, ce que plusieurs nous présentent alors en même temps, le même l'éprouve souvent successivement le même homme a sans doute, suivant les influence diverses auxquelles il est exposé, son cœur rouge dense, gros et bien nourri à une époque de la vie faible, pâle, peu volumineux à une autre; car le

rganes intérieurs doivent éprouver les mêmes altérations que nous montrent les extérieurs : or, on sait ombien l'habitude extérieure change souvent pendant la vie.

IV. *Etat du Système musculaire organique chez le vieillard.*

A mesure qu'on avance en âge, le système musulaire qui nous occupe s'affaiblit comme tous les utres : cependant son action est plus durable ; elle urvit, pour ainsi dire, à celle de l'autre. Déjà le ieillard, presque immobile, ne se traîne qu'avec eine et avec lenteur, que son pouls, sa digeson, etc., ont encore de la vigueur. Cette différence des deux systèmes est d'autant plus remarquable que le temps d'activité du second est presque e moitié moindre que celui du premier : le sommeil etranche en effet presque la moitié de la durée des nouvemens volontaires, tandis qu'il laisse les invontaires vraiment intacts. Ce phénomène de l'espèce e survivance des muscles organiques aux muscles olontaires dans les derniers temps de la vie dérive n grand du même principe d'où naît en petit la ussitude qui suit la contraction dans un mouvement olé. Il faut un mouvement moins durable pour fatiuer les muscles volontaires que pour fatiguer les involontaires : l'estomac vide reste long-temps conracté sur lui-même sans faire éprouver un sentiment énible ; tandis que, si nous tenons serré fortement endant un quart d'heure un corps entre nos loigts, tous les fléchisseurs sont bientôt doulou-

reusement affectés. Après une convulsion d'une demi-heure où tous les muscles locomoteurs ont été raides, tout le corps est rompu, comme on le dit; il ne peut se prêter à aucun mouvement; tandis qu'après un accès de fièvre de six ou huit heures où le pouls a été violemment agité, souvent le cœur conserve le type naturel de ses contractions; il faut des accès répétés pour l'affaiblir. Tous ces phénomènes des deux systèmes musculaires prouvent manifestement que celui de la vie animale se fatigue beaucoup plus tôt; c'est même ce qui détermine son intermittence. Est-il donc étonnant que quoique moins souvent en exercice que l'autre il épuise plus tôt la somme de force que lui a donné la nature? est-il étonnant que celui-ci survive plus long-temps? La vie est un grand exercice qui use peu à peu les organes en mouvement, et qui nécessite enfin leur repos; ce repos est la mort: or chaque organe mobile y arrive plus ou moins tôt suivant le degré différent des forces qu'il a à dépenser, suivant sa disposition plus ou moins grande à se lasser par ce grand exercice.

Cependant les muscles organiques s'affaiblissent peu à peu, le pouls se ralentit, les digestions s'allongent chez le vieillard; la vessie et le rectum cessent d'abord d'agir; puis les intestins restent inactifs; l'estomac et surtout le cœur meurent les derniers.

Long-temps avant la mort, la cohésion musculaire s'affaiblit dans ce système comme dans le précédent; le tissu charnu devient flasque: les parois du cœur se soutiennent d'elles-mêmes dans le jeune

omme, elles s'affaissent chez le vieillard. Le sys-ème gastrique d'un jeune animal tué subitement endant la faim est ferme, dense, resserré sur ui-même; chez un vieux, il est, dans la même irconstance, peu revenu sur lui-même; l'estomac et es intestins restent beaucoup plus dilatés; ils sont âches et mous: c'est le même phénomène que lans les muscles précédens, qui vacillent sous la eau faute de cohésion. La vessie reste toujours mple, quoique vide d'urine, etc. (1).

---

(1) ANATOMIE PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME MUSCULAIRE.

On peut réunir dans une seule description les altérations ommunes aux deux grandes divisions de ce système. Il en est eu de particulières; elles seront indiquées à mesure.

§ Ier. *Altérations dans les formes extérieures.*

L'excès de nutrition est commun dans les muscles; mais ce 'est guère que dans le cœur et la vessie qu'il constitue, à pro-rement parler, une maladie : il est caractérisé par un accrois-ement remarquable de volume et souvent de densité. L'atro-hie arrive fréquemment dans les muscles extérieurs par le dé-aut d'exercice, par la distension ou par toute autre cause. Il s'y oint souvent une décoloration des fibres charnues, qu'on a prise our un état graisseux, comme Bichat l'a déjà fait observer. La prétendue dégénération graisseuse des muscles ne me paraît pas exister, du moins je n'en connais point d'exemple qu'on ne puisse rapporter à l'état précédent, dans lequel, les fibres cha-nues disparaissant en partie, la graisse inter-musculaire prédo-mine et se confond par sa couleur avec le muscle lui-même de-venu jaunâtre. Mais on retrouve par l'analyse la fibrine dans

ces muscles; en en mettant sur du papier gris, on retrouve les fibres distinctes après que l'huile animale a été absorbée, etc. Dans le cœur, l'atrophie donne lieu à la dilatation de cet organe à son anévrysme passif.

Les muscles perdent de leur consistance dans beaucoup de circonstances : le cœur est très-sujet à cette altération, qui a été décrite par M. Laennec dans son excellent *Traité de l'Auscultation médiate*, où l'on trouvera un grand nombre de faits intéressans sur les maladies de ce viscère. Le ramollissement des muscles peut amener leur rupture; celle du cœur a souvent été observée en pareil cas, surtout chez les vieillards : elle a été l'objet d'un travail particulier de M. Rostan.

Les fibres musculaires sont quelquefois allongées par l'effet de diverses maladies : il en résulte un affaiblissement plus ou moins marqué dans leur action. Cet allongement forcé des muscles coïncide souvent avec le raccourcissement des antagonistes, qui en est alors la cause; il suffit, dans ce cas, de contrebalancer ces derniers pour rendre aux premiers leur faculté contractile : c'est ainsi qu'on parvient quelquefois à remédier à la flexion permanente des doigts, en les redressant jusqu'au point où les extenseurs peuvent se contracter de nouveau; la même chose s'applique à la guérison des pieds-bots, quant il est possible de ramener l'axe du membre à sa direction primitive.

Le raccourcissement n'a pas les mêmes inconvéniens; il peut être porté très-loin, sans que la contractilité s'en ressente, comme le prouve une pièce recueillie par Hunter, et dans laquelle l'humérus avait éprouvé une perte de substance considérable. Il semble au contraire que cette force en soit augmentée : du moins est-elle alors dans un exercice continuel. Cette sorte de rétraction est très-fréquente, et se lie le plus souvent à une faiblesse des antagonistes. Les contractures du scorbut, certaines inflexions vicieuses du tronc, les pieds-bots, que nous venons de citer, le strabisme, la rétraction des muscles de la jambe par une douleur habituelle dans cette partie, en sont des exemples. Le petit doigt est souvent ainsi rétracté.

On a beaucoup parlé de déplacemens des muscles, de luxa-

ions, de hernies de ces organes. On peut voir à ce sujet tout ce u'a écrit Pouteau.

§ II. *Altérations dans l'organisation.*

L'inflammation du tissu musculaire est encore douteuse. On a ien trouvé des foyers purulens dans diverses régions de ce sys-ème, mais ils pouvaient avoir leur siége dans le tissu cellulaire nterposé entre ses fibres.

Un muscle coupé en travers se rétracte fortement, comme on 'a vu ailleurs. Mais souvent la partie inférieure est paralysée par ette section, parce que le nerf est resté contenu dans la supé-ieure, au niveau de laquelle il pénètre ordinairement dans le nuscle; cette dernière conserve au contraire son irritabilité : la étraction si marquée dans les amputations dépend en grande artic de cette cause. Ce serait l'inverse, et l'inférieure seule se ontracterait, si la section avait lieu plus haut. Dans tous les cas, ces phénomènes succèdent ceux de la réunion. Un tissu fibreux ouveau remplit l'écartement des deux bouts, qu'il unit soli-lement l'un à l'autre : s'il a peu de longueur, il ne nuit nulle-nent à la contraction, sans que pour cela le muscle ait gagné, omme on l'a dit; si la substance intermédiaire est longue et xtensible, les mouvemens sont plus ou moins gênés.

On n'observe presque point de transformations dans les mus-les. J'y ai pourtant rencontré des tumeurs fibreuses et osseuses, qui avaient un aspect pelotonné, analogue à celui des tumeurs de ce genre que l'on trouve dans la matrice. Nous avons vu plus haut ce qu'il faut penser de la transformation graisseuse.

Les dégénérations sont de même fort rares dans ce système. Des hydatides peuvent s'y produire : elles sont communes dans les porcs.

§ III. *Altérations dans le développement.*

On a vu les muscles de la vie animale manquer totalement chez le fœtus; il n'y avait, au-dessous de la peau, qu'une masse comme graisseuse, formée de tissu cellulaire infiltré plus

ou moins consistant : d'autres fois une partie de ces muscle n'existe pas. Le cœur, dans des cas très-rares à la vérité, également offert cette anomalie, très-fréquente dans certain muscles pris isolément. Rien n'est plus variable, au reste, qu la disposition du système musculaire, considéré relativement ses formes extérieures. Souvent on trouve des muscles surnumé-raires, ou bien ceux qui doivent exister s'éloignent, par leu conformation, de l'ordre naturel. Les attaches, la direction, l volume, la structure, présentent une infinité de variétés qu toutes sont du ressort de l'anatomie descriptive. Les muscles d la vie organique ne sont pas exempts de ces irrégularités ; l cœur à lui seul en offre un assez grand nombre.

Quelques auteurs ont parlé de transformations musculaires mais les exemples qu'ils ont cités sont trop vagues pour pouvoi être caractérisés. Il semble y avoir un développement accidente du tissu musculaire dans la matrice, pendant la grossesse, e dans les ligamens ronds, à la même époque. (BÉCLARD.)

FIN DU TOME TROISIÈME.

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

SYSTÈMES PARTICULIERS A QUELQUES APPAREILS.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Différences des Systèmes particuliers à quelques appareils d'avec ceux communs à tous. — Caractères des premiers. — Leur distribution dans les appareils. pag. 1-4

SYSTÈME OSSEUX.

Remarques générales. 5

ARTICLE PREMIER.

Formes du Système osseux.

Division des Os. *ibid.*

§ Ier. Des Os longs.

Rapport de leur position avec leurs usages généraux.—Formes extérieures du corps et des extrémités.—Formes intérieures. — Canal médullaire.—Sa situation, son étendue, sa forme. — Son usage. — Il disparaît dans les premiers temps du cal. — Il est moins long proportionnellement dans l'enfance. 6-10

§ II. Des Os plats.

Rapports de leur situation et de leurs formes extérieure avec l'usage général de former des cavités. — Formes intérieures. 10-1

§ III. Des Os courts.

Position. — Formes intérieures et extérieures. — Usages généraux. 12-1

§ IV. Des Éminences osseuses.

Leur division en celles, 1° d'articulation; 2° d'insertion; 3° de réflexion; 4° d'impression. — Remarques sur chacune de ces divisions. — Rapports des secondes avec la force musculaire. — Comment ces dernières se forment. 14-17

§ V. Des Cavités osseuses.

Leur division en celles, 1° d'insertion; 2° de réception; 3° de glissement; 4° d'impression; 5° de transmission; 6° de nutrition. — Remarques particulières sur chaque division. — Trois espèces de conduits de nutrition. 17-22

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système osseux.

§ Ier. Tissu propre au Système osseux.

Division commune de ce tissu. 23

Tissu celluleux. — Comment il se forme. — Quand il est formé. — Des cellules et de leurs communications. — Expériences. 24-26

Tissu compacte. — Disposition de ses fibres. — Leur formation. — Expériences pour connaître leur direction. — Les lames osseuses n'existent point. — Preuves. — Influence du rachitisme sur le tissu compacte. 26-32

Disposition des deux tissus osseux dans les trois espèces d'os. —

Disposition du tissu compacte. — Deux espèces de tissu celluleux dans les os longs. — Préparation du tissu celluleux commun et compacte dans les os courts et larges. — Même proportion examinée dans les cavités et les éminences osseuses. 32-40

II. Parties communes à l'organisation du Système osseux.

Trois ordres de vaisseaux sanguins. — Dispositions de chacun. — Expériences. — Canaux veineux. — Proportion suivant l'âge. — Communication. — Preuves de l'existence du tissu cellulaire. 41-46

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système osseux.

Ier. Propriétés physiques.

Elasticité. — Elle est en raison inverse de l'âge. 47

II. Propriétés de tissu.

Divers exemples de contractilité et d'extensibilité. — Caractères de ces propriétés. 48-49

III. Propriétés vitales.

Elles sont obscures. 49 50

Caractères de ces propriétés. — Lenteur de leur développement. — Leur influence sur les maladies. 51

Sympathies. — Leur caractère est toujours chronique. — Remarque générale sur les sympathies. 52-56

Siége des propriétés vitales. — La substance calcaire y est étrangère. — Elles n'existent que dans la gélatineuse. — Expérience qui le prouve. 56-58

ARTICLE QUATRIÈME.

Des Articulations du Système osseux.

§ Ier. Division des Articulations.

Articulations mobiles. — Considérations sur leurs mouvemen
— 1° Opposition; elle est vague ou bornée. — 2° Circun
duction; mouvement composé de tous ceux d'opposition.
3° Rotation; mouvement sur l'axe. — 4° Glissement. 60 (
Articulations immobiles. — Elles sont à surfaces juxtaposée
engrenées ou implantées. (
Tableau des articulations. (

§ II. Considérations sur les Articulations mobiles.

Premier genre. — Situation. — Forme des surfaces. — La r
tation et la circumduction sont en sens inverse à l'huméri
et au fémur. — Pourquoi. 65-6
Second genre. — Forme des surfaces. — Mouvemens. 69-7
Troisième genre. — Diminution des mouvemens. — Sens dan
lequel ils ont lieu. 71-7
Quatrième genre. — Mouvemens encore diminués. 7
Cinquième genre. — Obscurité remarquable des mouve
mens. 7

§ III. Considérations sur les Articulations immobiles.

Situation, formes de chaque ordre. — Rapport de la struc
ture avec les usages. 76-7

§ IV. Des moyens d'union entre les surfaces articulaires.

Union des articulations immobiles. — Cartilage d'union. 79-8
Union des articulations mobiles. — Ligamens et muscles con
sidérés comme liens articulaires. 80-8

ARTICLE CINQUIÈME.

Développement du Système osseux.

REMARQUES. 81

Ier. Etat du Système osseux pendant l'accroissement.

1° Etat muqueux. — Ce qu'il faut entendre par là. 82-84
2° Etat cartilagineux. — Epoque et mode de son développement. — De cet état dans les os larges. 84-87
3°. Etat osseux. — Ses phénomènes. — Son époque. 87-89
Progrès de l'état osseux dans les os longs. — 1° Dans le milieu ; 2° aux extrémités. 90-93
Progrès de l'état osseux dans les os larges. — Variétés suivant les os. — Formation des wormiens, etc. 93-96
Progrès de l'état osseux dans les os courts. 96

II. Etat du Système osseux après son accroissement en longueur.

Accroissement suivant l'épaisseur. — Composition et décomposition après la fin de l'accroissement en épaisseur. — Expériences. — Etat des os chez le vieillard. 97-103

III. Phénomènes particuliers du développement du Cal.

1° Bourgeons charnus. — 2° Adhérence de ces bourgeons. — 3° Exhalation de gélatine, puis de phosphate calcaire. 103-107

§ IV. Phénomènes particuliers du développement des Dents.

Organisation des dents. *ibid.*
Portion dure de la dent. — Email. — Expérience qui le fait distinguer de l'os. — Son épaisseur. — Sa nature. — Réflexions sur son organisation. — Portion osseuse. — Sa forme. — Cavité de la dent. 108-110
Portion molle de la dent. — Sa nature spongieuse. — Sa vive sensibilité. — Remarques sur ses sympathies diverses. 111-113
Première dentition considérée avant l'éruption. — Follicule

— Membrane de ce follicule analogue aux séreuses. — ture albumineuse de la rosée qui la lubrifie. — Mode développement de la portion osseuse sur le follicule.—N bre des premières dents. 113-

Première dentition à l'époque de l'éruption. — Mode d'ér tion. — Accidens. — Leurs causes. 121-

Deuxième dentition, considérée avant l'éruption. — Forr tion du second follicule. 125.

Deuxième dentition, considérée à l'époque de l'éruption. Chute des premières dents.—Pousse des secondes. 126.

Phénomènes subséquens à l'éruption des secondes dents. Accroissement en longueur et en épaisseur. — Chute dents, plus précoce que la mort des os. — Pourquoi.—E des mâchoires après la chute des dents. 128-

§ V. Phénomènes particuliers du développement des sésamoïdes. 1

Disposition générale des sésamoïdes. — Situation. — Form 131-1

Etat fibro-cartilagineux. 1

Etat osseux. — Phénomènes de la rotule. — Usage des sés moïdes. 133-1

Anatomie pathologique du système osseux. 135-1

SYSTÈME MÉDULLAIRE.

Division de ce Système. 1

ARTICLE PREMIER.

Système médullaire des Os plats et des Os courts et des extrémités des Os longs.

§ Ier. Origine et conformation.

De l'épanouissement des vaisseaux du second ordre. ibi

§ II. Organisation.

Il n'y a pas de membrane médullaire. — Entrelacement vasculaire. 146

§ III. Propriétés.

Il n'y a que les organiques. — Expériences. 147

§ IV. Développement.

Il n'y a point d'huile médullaire dans l'enfance. — Preuves. — Expériences. 148-149

ARTICLE DEUXIÈME.

Système médullaire du milieu des Os longs.

Ier. Conformation.

Elle est comme cellulaire. 150

II. Organisation.

La membrane médullaire n'est pas une expansion du périoste. — Ses vaisseaux. 151-152

III. Propriétés.

Propriétés de tissu. — Propriétés vitales. — Sensibilité animale. — Vitalité plus active que dans les os. 153-155

IV. Développement.

Comment la membrane médullaire se forme. — La moelle de l'enfant est absolument différente de celle de l'adulte. — Preuves. 156-158

§ V. Fonctions.

La moelle s'exhale. — Ses altérations. — Ses rapports avec la nutrition de l'os. — Nécrose. — La moelle est étrangère à la synovie. 158-162

Anatomie pathologique du système médullaire. 162-163

SYSTÈME CARTILAGINEUX.

Ce qu'on doit entendre par Cartilage. 1

ARTICLE PREMIER.

Des formes du Système cartilagineux.

§ Ier. Formes des Cartilages des articulations mobiles.

Surfaces interne et externe. — Rapports des deux cartilag correspondans. — Caractères particuliers de ces cartilag dans chaque genre d'articulations mobiles. 165-1

§ II. Formes des Cartilages des articulations immobiles. 170-17

§ III. Formes des Cartilages des cavités. 17

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système cartilagineux.

§ Ier. Tissu propre.

Fibres. — Résistance remarquable du tissu cartilagineux à l putréfaction, à la macération, etc. — Coction, dessiccatio de ce tissu. — Ses altérations diverses. 172-17

§ II. Parties communes.

Tissu cellulaire. — Moyen de le voir. — Absence de vaisseau sanguins. — Vaisseaux blancs. — Leur coloration dans l jaunisse. 177-17

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système cartilagineux.

§ Ier. Propriétés physiques.

Elasticité. — Elle paraît due à la surabondance de gélatine Preuves. 180-18

§ I. Propriétés de tissu.

Elles sont très-obscures. 184

§ II. Propriétés vitales.

Elles sont peu marquées, ainsi que les sympathies. 184-186
Caractères des propriétés vitales. — Tous les phénomènes auxquels elles président suivent une marche chronique. — Remarques générales sur la réunion des parties. 186-190

ARTICLE QUATRIÈME.

Développement du Système cartilagineux.

§ Ier. Etat de ce Système dans le premier âge.

Prédominance de la gélatine dans les premiers temps. — Propriété qu'ont alors les cartilages de rougir par la macération.—Lames vasculaires entre le cartilage et l'os. — Cause qui arrête au cartilage les limites de l'ossification. —Développement des cartilages des cavités. 191-195

II. Etat du Système cartilagineux dans les âges suivans.

Caractère différent que prend la gélatine. — Ossification des cartilages chez le vieillard. — Ceux des cavités sont plus précoces à s'ossifier. 195-197

III. Développement accidentel du Système cartilagineux.

Ce phénomène est contre nature. — Tendance de la membrane de la rate à en devenir le siége. — Cartilages accidentels des articulations. 197-200
Anatomie pathologique du système cartilagineux. 200-203

SYSTÈME FIBREUX.

Considérations générales.

ARTICLE PREMIER.

Des formes et des divisions du Système fibreux.

Les formes fibreuses se rapportent à la membraneuse et à celle en faisceaux. 205-206

§ Ier. Des organes fibreux à formes membraneuses.

Membranes fibreuses.—Capsules fibreuses.—Gaines fibreu
Aponévroses. 206-

§ II. Organes fibreux en formes de faisceaux.

1° Tendons. — 2° Ligamens. 2

§ III. Tableau du Système fibreux.

Analogie des organes divers de ce système. — Le périoste
le centre commun de ces organes. 207-2

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système fibreux.

§ Ier. Tissu propre.

Nature particulière du tissu fibreux.—Son extrême résistanc
— Phénomènes de cette résistance. — Elle peut être su
montée. — Différence des tissus fibreux et musculaire.
Expériences sur le tissu fibreux soumis à la macération,
l'ébullition, à la putréfaction, à l'action des sucs dige
tifs, etc. 211-2

§ II. Parties communes.

Tissu cellulaire. — Vaisseaux sanguins. — Leurs variétés sui
vant les organes. 222-22

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système fibreux.

§ Ier. Propriétés physiques. 22

§ II. Propriétés de tissu.

Extensibilité. — Loi particulière à laquelle elle est soumis
ici. — Contractilité. — Elle est presque nulle. — Quan
elle se manifeste. 225-2

§ II. Propriétés vitales.

Sensibilité animale. — Mode singulier de la mettre en jeu par la distension. — Conséquence de ce phénomène particulier au tissu fibreux. 228-231

Caractères des propriétés vitales. — L'activité vitale est plus marquée dans ce système que dans les précédens. — Il paraît que le tissu fibreux ne suppure pas. 231-233

Sympathies. — Exemples de celles des propriétés animales et des organiques. 234-237

ARTICLE QUATRIÈME.

Développement du Système fibreux.

Ier. Etat de ce Système dans le premier âge.

Les fibres manquent dans la plupart des organes fibreux du fœtus. — Mollesse de ces organes à cet âge. — Variétés de développement. — Remarques sur le rhumatisme. 238-240

II. Etat du Système fibreux dans les âges suivans.

Phénomènes de l'adulte. — Roideur générale chez le vieillard. 240-242

III. Développement accidentel du Système fibreux.

Diverses tumeurs présentent des fibres analogues à celles de ce système. 242

ARTICLE CINQUIÈME.

Des Membranes fibreuses en général.

§ Ier. Formes des Membranes fibreuses.

Leur double surface.—Ces membranes sont comme les moules de leurs organes respectifs. — Recherches sur celle des corps caverneux : expériences qui prouvent qu'elle diffère essentiellement du tissu spongieux subjacent. — Autres recherches sur celles du testicule. 243-247

§ II. Organisation des Membranes fibreuses. 247-248

§ III. Périoste.

1°. Sa forme. — Ses deux surfaces. — Son adhérence a
les os. 248 2
2°. Son organisation. — Développement accidentel de
fibres dans l'éléphantiasis. — Ses connexions avec les co
fibreux dans l'enfance. 251-2
3°. Son développement. 2
4°. Ses fonctions. — En quel sens il sert à l'ossification. —
est autant relatif aux organes fibreux qu'aux os. 253-2

§ IV. Périchondre.

Expériences sur cette membrane. 255-2

ARTICLE SIXIÈME.

Capsules fibreuses.

§ Ier. Formes des Capsules fibreuses.

Elles sont très-rares. — Disposition des deux principales. -
Canal entre elles et leur synoviale. 256-2

§ II. Fonctions des Capsules fibreuses. 258-25

ARTICLE SEPTIÈME.

Gaines fibreuses.

Leur division.

§ Ier. Gaines fibreuses partielles.

Leur forme. — Leur disposition. — Pourquoi les tendons flé
chisseurs en sont seuls pourvus. 259-26

§ II. Gaines fibreuses générales. 26

ARTICLE HUITIÈME.

Aponévroses.

§ Ier. Aponévroses à enveloppe.

Leur division. 26

I. Aponévroses à enveloppe générale. 262
1°. Situation et formes. — Elles sont accommodées aux membres, etc. 262-263
2°. Muscles tenseurs. Organisation. — Exemples des muscles tenseurs. — Leurs usages relatifs aux aponévroses. — Analogie et différence avec les tendons. — Arrangement des fibres. 264-265
3°. Fonctions. 266
II. Aponévroses à enveloppe partielle. — Exemples. — Usages généraux de ces aponévroses. 266-268

II. Aponévroses d'insertion. 268
1°. Aponévroses d'insertion à surfaces larges. — Leur origine. — Leurs usages. — Leur identité de nature avec les tendons. — Expériences. 268-270
2°. Aponévroses d'insertion en arcade. — Elles sont rares. — Elles existent là où passent des vaisseaux. — Elles ne les compriment pas. 270
3°. Aponévroses d'insertion à fibres isolées. 270-271

ARTICLE NEUVIÈME.

Tendons.

Ier. Situation et formes des Tendons.

Rapports des usages avec les formes. — Union avec les fibres charnues. 271-273

II. Organisation des Tendons.

Manière de bien voir leurs fibres. — Ils paraissent dépourvus de vaisseaux sanguins. — Leur tendance à se pénétrer de phosphate calcaire. 273-276

ARTICLE DIXIÈME.

Ligamens.

Leur division. 276

Ier. Ligamens à faisceaux réguliers.

Disposition générale. 276-278

II. Ligamens à faisceaux irréguliers. 278

Anatomie pathologique du système fibreux. 279-282

SYSTÈME FIBRO-CARTILAGINEUX.

Organes qui le composent.

ARTICLE PREMIER.

Formes du Système fibro-cartilagineux.

Division en trois classes des organes de ce système. — Caractères de chaque classe. 283-2

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système fibro-cartilagineux.

§ Ier. Tissu propre.

Il résulte, 1° d'une substance fibreuse; 2° d'une cartilagineuse. — Il doit sa résistance à la première, et son élasticité à la seconde.—Action du calorique, de l'air, de l'eau sur le tissu fibro-cartilagineux. — Il rougit par la macération. — Absence du périchondre sur la plupart des fibro-cartilages. 287-2

§ II. Parties communes. 2

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système fibro-cartilagineux.

§ Ier. Propriétés physiques.

Elasticité et souplesse réunies. 291-2

§ II. Propriétés de tissu.

Extensibilité : elle y est assez marquée. — Contractilité. Différences d'avec l'élasticité. 293-2

§ III. Propriétés vitales.

Elles sont peu marquées. — Influence de l'obscurité de forces sur les propriétés des fibro-cartilages. 294-2

ARTICLE QUATRIÈME.

Développement du Système fibro-cartilagineux.

§ Ier. Etat de ce Système dans le premier âge.

Mode de développement des trois classes. 296-297

§ II. Etat de ce Système dans les âges suivans.

Rigidité générale de ces organes. — Conséquences. — Ossification assez rare des fibro-cartilages. 297-298

Anatomie pathologique du système fibro-cartilagineux. 298-300

SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ANIMALE.

Différence des muscles de l'une et de l'autre vies. — Considérations sur ceux de l'animale. 301

ARTICLE PREMIER.

Formes du Système musculaire de la vie animale.

Division de ces muscles en longs, en larges et en courts.

§ Ier. Formes des muscles longs.

Lieu qu'ils occupent. — Leur division. — Leur isolement et leur réunion. — Formes particulières des musles longs de l'épine. 302-304

§ II. Formes des muscles larges.

Où ils sont situés. — Epaisseur. — Formes particulières des muscles larges pectoraux. 304-306

§ III. Formes des muscles courts.

Où ils se trouvent. — Leur disposition. — Remarques sur les trois espèces de muscles. 306-307

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système musculaire de la vie animale.

§ Ier. Tissu propre à cette organisation.

Disposition en faisceaux de ce tissu. — Sa division en fibres-

Longueur des fibres charnues, comparée à celle du muscl
Leur direction. — Leur figure. — Leur mollesse. — Facili
de leur rupture dans le cadavre. — Difficulté sur le vivan
308-31
Composition du tissu musculaire. — Action de l'air dans l
dessiccation et la putréfaction. — Action de l'eau froide. -
Macération et ses produits. — Facilité de la substance c
lorante à s'enlever. — Analogie du tissu restant avec la fi
brine du sang. — Rapport des forces avec ce tissu. — Actio
de l'eau bouillante. — Quelques phénomènes particulier
du bouilli ordinaire. — Rôtissage du tissu charnu. — Affi
nité singulière des sucs digestifs pour cette sorte de tissu. -
Considérations générales. — Influence du sexe et des o
ganes génitaux sur le tissu charnu. 316-32

§ II. Parties communes à l'organisation de ce Système.

Manière dont il enveloppe les fibres. — Ses usages pour l
mouvement musculaire. — Expérience. — Muscles grais
seux. 325-32
Vaisseaux. — Artères. — Du sang des muscles. — De leur co-
loration. — Etat libre et état combiné de la substance
colorante. — Veines. — Remarques sur leur injection
328-33
Nerfs. — Il n'y a presque que ceux de la vie animale. — Leur
différence dans les extenseurs et dans les fléchisseurs. — Ma-
nière dont les nerfs pénètrent les muscles. 332-336

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système musculaire de la vie animale.

§ Ier. Propriétés de tissu.

Extensibilité. — Cette propriété est continuellement en ac-
tion. — Elle est proportionnée à la longueur des fibres. —
Son exercice dans les maladies. 336-339
Contractilité. — Phénomène des antagonistes. — Distinction,
dans ces phénomènes, de ce qui appartient aux propriétés
vitales et à celles de tissu. — De la contractilité de tissu
dans les maladies. — Etendue et vitesse des contractions. —
Elles subsistent après la mort. — Différences essentielles
entre la contractilité de tissu et le racornissement. — Leur
parallèle. 339-348

§ II. Propriétés vitales.

Propriétés de la vie animale. Sensibilité. — La plupart des agens ordinaires ne la développent pas. — Elle est mise en jeu par des contractions répétées. — Du sentiment de lassitude. — Sensibilité des muscles dans leurs affections. 348-351

Contractilité animale. — On doit la considérer sous un triple rapport. 351-352

Contractilité animale considérée dans le cerveau. — Le principe de cette propriété existe dans cet organe. — Preuves tirées de l'observation. — Preuves puisées dans les maladies. — Preuves empruntées des expériences sur les animaux. — Des cas où le cerveau est étranger aux muscles. 352-360

Contractilité animale considérée dans les nerfs. — Influence de la moelle épinière sur cette propriété. — Observations et expériences. — Tous les nerfs ne transmettent pas également les diverses irradiations du cerveau. — Direction de la propagation de l'influence nerveuse. 360-365

Contractilité animale considérée dans les muscles. — Conditions nécessaires dans le muscle pour se contracter. — Obstacles à la contraction. — Expériences diverses. 365-370

Causes qui mettent en jeu la contractilité animale. — Division de ces causes. — De la volonté. — Des causes involontaires. — Excitation directe. — Excitation sympathique. — Influence des passions. — Remarques sur les mouvemens du fœtus. 370-376

Permanence de la contractilité animale après la mort. — Expériences diverses. — Conséquences relatives à la respiration. — Variété de la permanence de cette propriété. — Comment elle s'éteint. 376-382

Propriétés organiques. — Sensibilité organique et contractilité organique insensible. — Contractilité organique sensible. — Expériences diverses sur cette dernière propriété. — Phénomènes des irritations. — Pour étudier cette contractilité il faut annuler l'animale. — Comment on y parvient. — Divers modes de contraction. 382-389

Sympathies. — La sensibilité animale est la propriété spécialement mise en jeu par elles. — Remarques générales. — Sympathies de sensibilité animale. — Les propriétés organiques sont rarement mises en jeu. 389-393

Caractère des propriétés vitales. — Remarques diverses sur ce caractère. 393-394

ARTICLE QUATRIÈME.

Phénomènes de l'action du Système musculaire de la vie animale.

§ Ier. Force de la contraction musculaire.

Différence suivant qu'elle est mise en jeu par les irritans ou par l'influence cérébrale. — Expériences. — Influence de l'organisation musculaire sur la contraction. — Lois de la nature inverses de celles de la mécanique dans la production des mouvemens. — Multiplication de forces. — Inexactitude du calcul sur ce point. 395-401

§ II. Vitesse des contractions.

Variétés suivant les contractions, 1° par les stimulans; 2° par l'action nerveuse. — Degrés divers de vitesse, suivant les individus. — Influence de l'habitude sur ce degré. 401-405

§ III. Durée des contractions.

§ IV. Etat des muscles en contraction.

Phénomènes divers qu'ils éprouvent alors. — Remarque essentielle sur les divers modes de contraction. 405-406

§ V. Mouvemens imprimés par les muscles. 406-410

Mouvemens simples, 1° dans les muscles à direction droite. — Comment on détermine les usages de ces muscles. — 2° Dans les muscles à direction réfléchie. — 3° Dans ceux à direction circulaire. 410-414

Mouvemens composés. — Presque tout mouvement est composé. — Comment. — Exemples divers des mouvemens composés. — Antagonisme. 414-417

§ VI. Phénomènes du relâchement des muscles.

Ils sont opposés aux précédens. 417-418

ARTICLE CINQUIÈME.

Développement des Muscles de la vie animale.

§ Ier. Etat de ce Système chez le fœtus.

Il contient peu de sang. — Peu de contractilité à cet âge. — Influence, sur ces phénomènes, du sang qui pénètre alors les muscles. — Ces organes sont grêles et faibles. 418-423

§ II. Etat de ce Système pendant l'accroissement.

Effet subit du sang rouge qui pénètre dans les muscles, et des autres irritations qui lui sont associées. — Coloration des muscles. — Epoques de la plus vive coloration. — Variétés de l'action des réactifs sur le tissu charnu des jeunes animaux. 423-427

§ III. Etat de ce Système après l'accroissement.

L'épaisseur augmente toujours. — Les formes extérieures se prononcent. — Couleur chez l'adulte. — Variétés sans nombre. 428-431

§ IV. Etat de ce Système chez le vieillard.

Augmentation de densité.—Diminution de cohésion. — Phénomènes de la vacillation des muscles.—Muscles atrophiés. 431-435

§ V. Etat du Système musculaire à la mort.

Relâchement ou raideur des muscles. 435-436

SYSTÈME MUSCULAIRE DE LA VIE ORGANIQUE.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 437

ARTICLE PREMIER.

Forme du Système musculaire de la vie organique.

Direction courbe des fibres. — Elles ne naissent point du système fibreux. — Variétés des formes musculaires suivant les organes. 438-440

ARTICLE DEUXIÈME.

Organisation du Système musculaire de la vie organique.

Différence générale d'organisation avec les muscles précédens. 441

§ Ier. Tissu propre.

Disposition générale de la fibre musculaire. — Analogie et différence avec la précédente. 441-444

§ II. Parties communes.

Tissu cellulaire. — Vaisseaux sanguins. — Nerfs des ganglions et du cerveau. — Proportion de chaque classe. 445-447

ARTICLE TROISIÈME.

Propriétés du Système musculaire de la vie organique.

Ier. Propriétés de tissu.

Extensibilité. — Caractère particulier de cette propriété dans les muscles organiques. — Dans les anévrysmes du cœur et dans la grossesse, ce n'est pas l'extensibilité qui est mise en jeu. — Remarques à ce sujet. 447-454

Contractilité. — Elle est proportionnée à l'extensibilité. — Les substances contenues dans les muscles creux sont leurs antagonistes. — Remarques. 454-456

§ II. Propriétés vitales.

Sensibilité. — De la lassitude des muscles organiques. — Remarques sur la faim. 456-458

Contractilité animale. — Elle est nulle dans ces muscles. — Expériences diverses. — Observations. — Des muscles en partie volontaires, en partie organiques. — Expériences. — Remarques sur la vessie, le rectum, etc. — Absence de l'influence nerveuse sur les muscles organiques. 458-467

Propriétés organiques. — Remarques générales. 467-471

De la contractilité organique sensible considérée sous le rapport des excitans, etc. 472

Excitans naturels. — Observations diverses. — Remarques sur l'influence des fluides sur les solides. — Influence de la qualité et de la quantité des fluides sur les muscles creux. 473-476

Excitans artificiels. — Action de ces excitans. — Différens modes d'action. — Limites du racornissement et de la contraction vitale. 477-481

De la contractilité organique sensible considérée sous le rapport des organes. 482

1re variété. Diversité du tissu musculaire. — Chaque muscle est surtout en rapport avec telle ou telle substance déterminée. — Application de ce principe aux fluides naturels et étrangers. 483-485

2e variété. Age. — Vivacité de la contractilité dans l'enfance. — Conséquences. — Phénomène inverse dans le vieillard. 485-486

3e variété. Tempérament. — Différence des individus sous le rapport de la force musculaire organique. — Cette force n'est point toujours en rapport avec la force musculaire animale. — On ne peut l'accroître comme celle-ci par l'habitude. 486-488

4e variété. Sexe. 488-489

5e variété. Saison et climat. 489

Contractilité organique sensible, considérée relativement à l'action des stimulans sur les organes. — Existence habituelle d'un intermédiaire pour cette action. — Nature de cet intermédiaire. 490-492

Contractilité organique sensible, considérée relativement à sa permanence après la mort.—Diversité de cette permanence suivant le genre de mort. — Remarques. 492-495

Sympathies. — Sympathies du cœur. — Sympathies de l'estomac. — Remarques sur les vomissemens bilieux. — Considérations générales. — Sympathies des intestins, de la vessie, etc. 495-501

Caractère des propriétés vitales. — Energie vitale très-prononcée dans ce système. — Ses affections portent sur sa force vitale prédominante. — Rareté des affections qui supposent un trouble des propriétés organiques. 501-503

ARTICLE QUATRIÈME.

Phénomènes de l'action du Système musculaire de la vie organique.

§ Ier. Force de contraction.

Différence d'avec la force de contraction du système précédent. — Cette force est plus grande dans les phénomènes vitaux que dans les expériences.—Inexactitude des calculs. 503-506

§ II. Vitesse des contractions.

Dans les expériences. — Pendant la vie. — Comparaison avec la vitesse des muscles précédens. 507-508

§ III. Durée des contractions. 509

§ IV. Etat des muscles en contraction. 509

Différence sous ce rapport entre le cœur et les muscles gastriques. 509 511

§ V. Mouvemens imprimés par les muscles organiques. 511

§ VI. Phénomènes du relâchement des muscles organiques.

Différence de ce relâchement d'avec la dilatation active des muscles. — Preuves des phénomènes de cette dilatation. 511

ARTICLE CINQUIÈME.

Développement du Système musculaire de la vie organique.

§ Ier. Etat de ce Système chez le fœtus. 519

Prédominance du cœur. — Etat des autres muscles. — Faiblesse de la contractilité organique à cet âge.

§ II. Etat du Système musculaire organique pendant l'accroissement. 523

Augmentation générale d'action à la naissance. — De l'accroissement en épaisseur et de celui en longueur. — Leurs différences. 523-527

§ III. Etat du Système musculaire organique après l'accroissement. 527

§ IV. Etat du Système musculaire organique chez le vieillard. 529

Ce système survit pour ainsi dire au précédent.—Phénomènes résultant de son affaiblissement. 529-531

FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME.

I
Bichat
1830
v.3